

HISTORIA NATURALNA



dla
MŁODZIEŻY

Nakładem
MICHAŁA ARCTA
w Warszawie.

HISTORJA NATURALNA



HISTORJA NATURALNA

ZOOLOGJA, BOTANIKA, MINERALOGJA, GIEOLOGJA

według Bergiego, Lakowitza i innych

napisał

Wł. M. Kozłowski

z 17 tablicami kolorowemi
zawierającemi 700 okazów

oraz

z 631 rysunkami w tekście.

Wydanie II poprawione.

WARSZAWA
NAKŁADEM I DRUKIEM M. ARCTA

1906



Дозволено Цензурою.
Варшава, 22 Марта 1905 года.

TRZY KRÓLESTWA.

1. Gdy wychodzimy w pole lub na góry okryte gęstym, ciemnym lasem i rozglądając się dokoła, wciągamy powietrze nasycone przyjemną wonią, olśniewa nas rozmaitość otaczających przedmiotów.

Wchodzimy do lasu. Nad nami rozpościera się zielone sklepienie liści, szumiących za powiewem wiatru, a różnobarwne niezliczone zioła, mchy, porosty, zaścielają ziemię miękkim kobiercem.

Z pośród nich wybiegają lub wylatują różne drobne żyjątka. Po gałęziach gdzieś tam przebiega zwinna wiewiórka, hałaśliwe ptactwo wije gniazdo lub uczy swe pisklęta fruwania, dokoła zaś brzęczą roje muszek i innych owadów.

Każdy krok nasz płoszy jakąś żywą istotkę, przyniata jakieś ziółko lub porusza krzewinę.

Wychodzimy na łąkę. I tu pełno życia, tylko życie to cichsze. Trzeba się nachylić, aby je dostrzedz. Ale położmy się w upał południowy na trawie w cieniu drzewa, nad strumykiem, wśród gęstej murawy i przyjrzyjmy się drobnym istotkom, które zaludniają ten minjaturowy lasek żdźbeł. Jakież tu ruch, jaka pełnia życia! Tu pajaczek spuszcza się z listka na wysnutej z siebie nici, tam biegnie po żdziebełku trawy boża krówka, tu znowuż siada wspaniale zabarwiony motyl, a pszczołka, brzęcząc, przelatuje z kwiatka na kwiatek, spija z niego miód lub zbiera żółty pyłek.

Napatrzyliśmy się na ten mały światek; teraz idziemy dalej za biegiem strumyka: grunt obniża się coraz bardziej, woda bieży szybciej, szemrząc głośno, spadając z kamienia

na kamień. Dochodzimy wreszcie do brzegu rzeki, do której ów strumień wpada. Przed nami rozległa ławica piaskowa, dalej leży gruby żwir i okrągłe kamyki. Są to okruchy skał, które prąd rzeki w biegu swym wygładził, obtoczył i przyniósł tu zdaleka.

Na przeciwległym brzegu widzimy strome urwisko; tu są widoczne warstwy piasku, gliny i skał, leżące jedna na drugiej (fig. 1).



Fig. 1. Warstwy piasku, gliny i skał.

2. Wszystkie te przedmioty, które spotykamy podczas naszych wycieczek, naturalista dzieli na **trzy królestwa**.

Piewsze nazywa **królestwem zwierząt**; tu należą wszystkie istoty, które obdarzone są życiem, ruchem i czuciem: robaczek, wypełzający z pod kamienia, zarówno jak muszka, unosząca się w powietrzu: ptak, wzbijający się w błękitny niebieskie i zając, mknący po polu, niemniej jak i człowiek, ów król stworzenia, badający całą tę przyrodę i nad nią panujący.

Królestwo roślinne obejmuje te istoty, które żyją i rosną, lecz nie mają ani ruchów dowolnych ani czucia: trawy i zioła,

kwiaty i drzewa, mchy i grzyby, porosty, okrywające nagie skały, pleśń, rosnąca na wilgotnych przedmiotach, wodoro-
sty, pokrywające zieloną warstwą powierzchnię stawów —
wszystko to należy do królestwa roślinnego.

Trzecie **królestwo kopalne** czyli **mineralne** obejmuje wszy-
stko to, co nie weszło do dwóch poprzednich, wszystko co
nie jest obdarzone życiem: piasek i żwir, kamienie i skały,
wodę, powietrze i ziemię.

Lecz chociaż pozbawione są życia, ulegają i minerały
ustawicznym zmianom: skały kruszą się pod wpływem upa-
łów i mrozów—i te to właśnie okruchy, obtoczone wodą, sta-
nowią żwir i owe okrągłe kamyczki, któreśmy oglądali na brze-
gu rzeki. Rozkładają się one pod działaniem powietrza i wo-
dy — i w ten sposób powstaje piasek i glina.

Ale i wzrost nie jest im obcy. Przekona nas o tem
proste doświadczenie. Nalejmy stężonego roztworu soli lub
alunu do szklanki i, nakrywszy
papierem, aby osłonić od kurzu,
pozostawmy go w spokoju. Za
kilka dni zauważymy na dnie
szklanki drobne kryształki, które
będą wzrastać stopniowo, a po
upływie kilku tygodni osiągną
znaczej wielkości (fig. 2). I tu
więc możliwy jest wzrost, chociaż
niema jeszcze życia.



Fig. 2.

To też Linneusz, znakomity
naturalista szwedzki, tak określa
każde z trzech królestw przyro-
dy: *zwierzęta żyją, rosną i czują;*
rośliny—żyją i rosną; minerały
rosną ale nie żyją.

Wszystko, co tylko możemy spotkać w naturze, należy
do jednego z tych trzech królestw. Obejmują one wszystkie
bez wyjątku twory przyrody.

3. Istoty żywe, należące do pierwszych dwóch królestw,
nazywamy **organizmami**, a wszystkie należące tu twory ozna-
czamy niekiedy nazwą zbiorową *natury organicznej*. Nazwa
ta pochodzi stąd, iż ciało ich utworzone jest z odrębnych
części, które nazywamy *organami* czyli narządami.

W roślinach np. rozróżniamy *korzeń, łodygę, liście, kwia-
ty, owoce*; u zwierząt mamy *mózg, serce, żołądek, naczynia*

krwionośne, mięsne i t. d. Każda z tych części ma odrębne przeznaczenie, do którego jest przystosowana.

Do natury organicznej zaliczamy nietylko istoty żyjące, ale i pozbawione życia części lub szczątki organizmów, np. tłuszcz, wosk, kawałki skóry, drzewa i t. p.

Istoty mineralne nazywają się **nieorganicznymi**, a obejmujące je królestwo — *światem nieorganicznym*.

Tak więc wszystkie istoty widzialnego świata dzielą się na organiczne lub nieorganiczne; pierwsze zaś mogą być albo zwierzętami albo roślinami.

4. Badając poszczególne zwierzęta i rośliny, dochodzimy do wniosku, że można wykazać pomiędzy niektórymi z nich pewien stopień podobieństwa do siebie, podczas gdy inne wyróżniają się zupełnie odrębnymi cechami.

Otóż dla łatwiejszego przeglądu i poznania całego ogromu królestwa istot organicznych, naturaliści ugrupowali je w większe lub mniejsze **działy**, obejmujące istoty zbliżone do siebie cechami podobnemi.

Podstawą tego podziału jest *gatunek* czyli zbiór tych poszczególnych zwierząt lub roślin, które posiadają wiele cech podobnych.

Najpodobniejsze gatunki połączone razem stanowią obszerniejszą grupę, zwaną *rodzajem*.

Rodzaje między sobą podobne, grupujemy w *rodziny*.

Te ostatnie skupiamy w *rzędy*.

Wszystkie pokrewne rzędy tworzą *gromadę* albo *klasę*.

Zbliżone zaś gromady grupujemy w *typy*, będące najogólniejszym podziałem państwa istot organicznych.

Taki podział, zastosowany przez naturalistów przy badaniu zarówno zwierząt, jak i roślin, a ułatwiający znakomicie rozpatrzenie i poznanie świata istot organicznych, nazywa się **układem** albo **klasyfikacją**.

KRÓLESTWO ZWIERZĄT.

5. Całe tedy królestwo zwierząt dzielimy na kilka wielkich **gromad** czyli **typów**. Do jednego typu zaliczamy istoty, których kształt, a zwłaszcza wewnętrzny układ i budowa organów są podobne.

Rozróżniamy 7 typów głównych:

I. **Kręgowce**. Są to zwierzęta, mające szkielet wewnętrzny najczęściej kostny, rzadziej chrząstkowy; krew mają czerwoną i wogóle są najdoskonalej ukształtowane.

Należą tu różne istoty, a mianowicie zwierzęta ssące (zwane pospolicie „**zwierzętami**”), a także ptaki, gady, płazy i ryby.

II. Typ **stawonogich** obejmuje zwierzęta mniejsze w większej części lądowe, o organizacji mniej doskonałej, pozbawione szkieletu kostnego, a mające natomiast mniej lub więcej twarde okrywy ciała (np. skorupa raka, pokrywa żuków) oraz nogi, każda złożona z kilku stawów (raki, muchy, żuki i motyle, pająki stonóżki),

III. Typ **mięczaków**—są to zwierzęta przeważnie wodne, zupełnie pozbawione szkieletu, a nawet twardych osłon; natomiast większa część ich ukrywa się w muszli, która jest jakby domkiem, otwierającym się i zamykającym w miarę potrzeby. Nie mają też nóg złożonych ze stawów, a przesuwiają się, jeśli pełzają, za pomocą miękkiej części ciała, która nazywa się *nogą*. Za przykład służyć mogą ostrygi, ślimaki i t. p.

IV. Typ **robaków** zawiera istoty o niższej jeszcze organizacji, do których należą: *robak ziemny* czyli *dżdżownica*, *pijawka*, *glisty* i t. d.

Zwierzęta, dotąd wymienione, są tak ukształtowane, że można rozróżnić u nich przód i tył, prawą i lewą stronę.



Fig. 3.

Można je rozciąć wzdłuż na dwie zupełnie podobne połówki; ale tylko w tym jednym kierunku. Taką budowę nazywamy *obustronnie symetryczną* (fig. 3).

Zupełnie inaczej zbudowane są zwierzęta dwóch następujących typów. Ciało ich ma wygląd promienisty lub okrągły, tak, że możemy je jak krążek z papieru przecinać w kilku rozmaitych kierunkach, otrzymując zawsze jednakowe połówki. Taką budowę nazywamy *promienistą* lub *wielostronnie symetryczną* (fig. 4).



Fig. 4.

V. **Szkarłupnie.** Są to zwierzęta morskie, mające budowę promienistą; za przykład służyć może *gwiazda morska*.

VI. **Jamochłonne,** również przeważnie morskie; tu należą *gąbki* i *polipy* (korale).

VII. Wreszcie najniższą organizację spotykamy u **pierwotniaków.** Należą tu istoty tak drobne, że nie mogą być najczęściej wcale widziane gołym okiem i wymagające powiększenia przy pomocy mikroskopu. Tu należą *wymoczki* i *ameby*.

I. Typ zwierząt kręgowych.

6. Cały ten typ podzielony jest na pięć klas: 1) Ryby, 2) Ziemnowodne czyli gady, 3) Płazy, 4) Ptaki, 5) Ssące.

KLASA I. SSĄCE.

7. Zwierzęta do tej klasy należące mają mocny szkielet kostny, krew czerwoną, ciepłą; oddychają płucami, rodzą się żywe i w dzieciństwie ssą pierś matczyną. Skóra ich jest zwykle okryta włosiem.

Rzęd I. Dwurękie (Bimana).

CZŁOWIEK.

8. **Człowiek** stanowi **jedyny** rodzaj i gatunek tego rzędu. Zajmuje on pierwsze miejsce w klasie ssących. Miejsce to nadajemy mu jednak nie dlatego, że przewyższa zwierzęta doskonałością całej swej organizacji. Przeciwnie, pod niektórymi względami stoi od nich niżej, zmysły jego są tępe w porównaniu ze zmysłami zwierząt; oto sokoł góruje nad nim bystrością swego wzroku, zając—delikatnością słuchu, pies—subtelnym węchem, nietoperz—niezmierną wrażliwością skóry. Podobnież i ruchy człowieka nie odznaczają się wyższością: tysiące zwierząt biega od niego prędzej, małpa drapie się na drzewa z większą zręcznością, w pływaniu przewyższa go łada ryba, w skokach—kangur, a także miliony mniejszych i większych zwierząt, które się swobodnie w powietrzu unoszą. Pod

względem siły ustępuje człowiek wielu zwierzętom; czyż potrafi on tak, jak lew, miażdżyć bez wysiłku jednym uderzeniem kłów najgrubsze kości, albo, jak wół, karkiem ciągnąć centnarowe ciężary? Nawet mała mrówka, która ciągnie trzy lub cztery razy cięższą od siebie gąsienicę, daje dowód większej siły, niż najsilniejszy człowiek. Ale właśnie ta okoliczność, że u człowieka żaden organ w rozwoju swoim nie otrzymał przewagi nad innymi, zapewnia człowiekowi tak cudownie proporcjonalną i harmonijną organizację ciała.

Pod względem cech i czynności czysto fizycznej natury, nie odróżnia się człowiek niczem od zwierzęcia. Je i pije, trawi i oddycha, jak zwierzę, czuje i porusza się, jak zwierzę.

Ale co go zasadniczo od zwierząt wyróżnia, co go ponad nie wynosi, to wysoki rozwój umysłu, który uczynił go panem wszelkiego stworzenia, którego wyrazem jest mowa — najwspanialsze narzędzie jego sił duchowych, którego dźwignią jest popęd do ciągłego doskonalenia się.

Pszczoła jest nieporównaną mistrzynią w swej sztuce, człowiek trudem zdobywać musi biegłość w każdej najprostszej nawet umiejętności. Pszczoła rodzi się ze swoją sztuką; bez przygotowania zabiera się do budowy symetrycznych woskowych komórek i do spełniania licznych a złożonych swych obowiązków. Ale przed tysiącem pokoleń ta biegłość pszczoły była taka sama, i przejdą tysiące nowych pokoleń, a ona pozostanie bez zmiany.

Jakże innym jest człowiek! Czegoż to nie dokonał on siłą swego rozumu; jakichże przeobrażeń w gatunku swoim stał się sprawcą w ciągu tych niewielu stuleci, które my z historii jego znamy—od człowieka jaskiniowego kamiennej epoki, aż do dziecka naszego wieku! I dzisiaj jeszcze górują nad nim niektóre zwierzęta w zręczności; dzisiaj jeszcze nie umie on snuć takiej niteczki, jak pajak lub jedwabnik—ale zato ani jedno z tysięcy zwierząt nie nauczyło się posługiwać żadnym narzędziem; ani jedno nie zdołało zmusić siły natury do służenia sobie.

A ileż-to w tym zakresie zdziałał człowiek od pierwszego kamiennego odłamu, którym odskrobywał mięso od kości upolowanego zwierzęcia—aż do złożonej budowy dzisiejszych maszyn,—od pierwszej skóry zwierzęcej, którą pod wiatr nastawiał, aby popchnąć swoje pierwotne czółno — aż do dzisiejszych lokomotyw, które olbrzymie ciężary z błyskawiczną szybkością na wszystkie strony świata rozwożą.

Ta wyższość człowieka ujawnia się w odrębnej od innych, najbardziej z nim zbliżonych zwierząt budowie pewnych części ciała. Budowa czaszki i budowa ręki szczególnie wyróżniają go od najbardziej nawet zbliżonych do niego budową małp. Czaszka jest siedliskiem mózgu, organu władz umysłowych, które tak go wynoszą ponad całe królestwo zwierzęce. Ręka zaś obdarzona jest tak wielokrotnymi i rozmaitemi ruchami, dzięki budowie palców i przeciwstawności wielkiego palca innym, że słusznie anatomowie nazywają ją najdoskonalszem z narzędzi. Jest ona, jako wykonawczyni, koniecznem uzupełnieniem wydającego rozkazy umysłu.

Wybitną cechą człowieka jest postawa stojąca na wyprostowanych w kolanach nogach, co powoduje, iż wzrok jego skierowany jest wprost przed siebie, nie zaś ku ziemi, jak u innych zwierząt.

9. Człowiek pod względem zoologicznym stanowi jeden gatunek, pomimo mnogości i różnorodności typów, które w rozmaitych częściach świata spotykamy.

Różnice w obrębie gatunku nazywamy odmianami, są to tak zwane **rasy** ludzkie.

Rozróżniają **trzy typy** czyli *rasy* główne ludzi.

1. **Murzyńska** czyli **Negroidów**.

Należą tu:

a) *Negrowie* właściwi, mający skórę czarną, włosy krótkie, kędzierzawe i wełniste, wargi grube, wywinięte, nos krótki, spłaszczony. Czaszka ich jest wązka, czoło spłaszczone (fig. 5 i 6). Zamieszkują przeważnie Afrykę środkową.

b) *Hotentoci*, mieszkający w Afryce południowej, wyróżniają się jaśniejszą, brunatno-żółtawą barwą ciała; są szczupli, o szerokiej twarzy i mocno wystających szczękach; skóra ich jest sucha, pomarszczona, włosy poskręcane w kosmyki, nos płaski (fig. 7).

c) *Melanezyjczycy* albo *Papuasi* zamieszkują wyspy Oceanu (wyspy Salomona, Fidżi, Nowe Hebrydy), wyróżniają się bujnym porostem włosów na głowie w kształcie olbrzymiej peruki (fig. 8), a jako *Negritosi* o skórze ciemnej, prawie czarnej, znajdują się na wyspach Filipińskich, Borneo i Timor (fig. 9).

d) *Australijscy negrowie* czyli *Tasmańczycy* zamieszkują ląd Australji. Odznaczają się ciemno-brunatną skórą, chudymi rękami i nogami; włosy mają kędzierzawe, lecz nie wełniste, jak u Negrów afrykańskich. Jest to najniższe z ple-



Fig. 5. Murzyn sudański.



Fig. 6. Kafr Zulus.



Fig. 7. Hotentot.



Fig. 8. Papuas.

mion ludzkich (fig. 10). Pędzą życie wędrowne; nie mają ani namiotów, ani odzienia, ani zwierząt domowych.



Fig. 9. Negritos.



Fig. 10. Negr australijski.

10. II. **Rasa Mongolska** stanowi prawie połowę rodzaju ludzkiego. Należą tu:



Fig. 11. Mongoł.



Fig. 12. Eskimos.

a) *Mongołowie* typowi (fig. 11), mający czaszkę zlekka czworoboczną, twarz płaską i szeroką, wydatne, zaokrąglone szczęki i skośne, ku wnętrzu na dół skierowane oczy, uszy

odstające, ostrą brodę i skórę żółtawą, włosy czarne, proste i sztywne. Należą tu Chińczycy, Finowie, Mongołowie właściwi i t. d.

b) *Eskimosi* (fig. 12) mieszkają w lodowatych krajach północy.

c) *Malajczycy* (fig. 13) mają cerę jasno brunatną, budowę czaszki zbliżają się do rasy kaukazkiej, zamieszkują półwysep Malakke i wyspy południowej Azji.



Fig. 13. Malajczyk.



Fig 14. Maoris.

d) *Polinezyjczycy* dzielą się na Polinezyjczyków właściwych, Mikronezyjczyków i Maorisów, mają zwyczaj tatuowania się, to jest nakłówania i namalowywania ciała w celu ozdoby (fig. 14), zamieszkują wyspy oceanu Spokojnego, Marjańskie, Karoliny, Tongo, Samoa, Nową Zelandję.

e) *Amerykanie* mają skórę miedziano-smagłej barwy, czaszkę z tyłu ku przodowi wydłużoną, szczęki wydatne, wargi pełne, włosy czarne, długie i grube (fig. 15). Plemiona *północno-amerykańskie* różnią się znacznie od *południowo-amerykańskich* mniej rozwiniętych.

11. III. **Rasa Kaukazka** czyli **Śródładowa**, rozpostarta po wszystkich częściach świata, ma czaszkę silnie rozwiniętą, czoło proste, wyniosłe, rysy twarzy delikatne, nos wąski, lekko wygięty, usta małe, zęby pionowo ustawione, cerę białą

z rumieńcem na policzkach, u mieszkańców południowych nieco ciemniejszą, włosy miękkie, delikatne, jasne lub ciemne (fig. 16). Podziały tej rasy są następujące:

a) *Ludy Indo-europejskie* zamieszkują Europę, Azję środkową i Indje (Indusi, fig. 17); należą tu plemiona: słowiańskie, litewskie, germańskie, celtyckie, grecko-italskie, albańskie, irańskie, indyjskie.

b) *Semici* z plemionami: Syryjczyków i Chaldejczyków, Arabów (fig. 18), Hebrajczyków, Asyryjczyków, Fenicjan (starożytnych) i t. d.



Fig. 15. Indianin Ameryki północnej.



Fig. 16. Europejczyk.



Fig. 17. Indus.



Fig. 18. Arab.



Fig. 19. Nubijczyk.

c) *Hamici*—tu należą Berberowie z Afryki północnej, Felahowie w Egipcie i ciemno-zabarwieni Nubijczycy (fig. 19).

12. Ponieważ umysłowość jest najwybitniejszą cechą człowieka, więc przy porównaniu ras, przedewszystkiem bierze się pod uwagę budowę czaszki, siedlisko mózgu, który jest organem czynności umysłowych.

Tu szczególnie zwracamy uwagę na względny rozwój *czaszki właściwej* w stosunku do *twarży*. Im wyższa jest organizacja zwierzęcia, tem większa jest stosunkowo czaszka, tem mniejsza twarz, czyli tem mniej wydatne szczęki, które stanowią główną część twarzy.

13. Wyższość rasy ludzkiej określa się również tą przewagą myślenia nad żuciem, mózgu nad szczękami. Dla dokładnego oznaczenia

tęgo stosunku, Campère proponował mierzyć kąt, który tworzą dwie linje: jedna, przeprowadzona od otworu usznego ku nasadzie zębów przednich górnych; druga, idąca od czoła ku końcowi brody (fig. 20).




Fig. 20. A — kąt twarzowy goryla,
B—człowieka.

Kąt ten jest bardzo mały (ostry) u zwierząt, mających wydane szczęki (np. u psa, konia i t. d.). Jest on także ostry u małp, u człowieka zaś zbliża się do prostego, a staje się najbardziej rozwartym u rasy kaukazkiej, powodując ten typ piękny, jaki spotykamy na posągach greckich.

Drugi kąt, który wprowadził Broca, oznacza inny stosunek: mianowicie stopień wzniesienia głowy w stosunku do poziomu, czyli innemi słowy określa, jak dalece prosto trzyma się człowiek.

Kąt ten wyróżnia stanowczo człowieka od zwierząt: gdy bowiem u najwyżej organizowanych małp jest on rozwarty ku dołowi, u ludzi nawet najniższej rasy jest rozwarty ku górze; innemi słowy budowa czaszki ludzkiej przystosowana jest do prostego chodu i obejmowania okiem całego widnokręgu.

Wielkość tych dwóch kątów służy także za miarę oceny stopnia wyższości rozmaitych ras.

Prócz tego, niezależnie od wyższej lub niższej organizacji, rozróżniają dwa główne typy w budowie czaszki u rozmaitych ras. Jedne z nich mają głowę wydłużoną z przodu w tył; to jest średnica podłużna jest znacznie większa od poprzecznej (fig. 21a). U drugiej obie te średnice mało się różnią i czaszka zbliża się do kształtu kołowego (fig. 21c). Pierwsze nazywamy *długogłowemi*; drugie — *krótkogłowemi*. Wskutek pomieszania ras między sobą powstały typy pośrednie.

Blizszem badaniem różnic w budowie ciała u rozmaitych ras ludzkich zajmuje się osobna umiejętność — *antropologja*.




Fig. 21. a—czaszka długogłowych,
c—krótkogłowych.

Rząd II. Małpy czyli czwororękie.

14. Małpy wyróżniają się wśród innych zwierząt doskonałością budowy ciała, wielką zręcznością i szybkością ruchów. Są one najbardziej ze wszystkich zwierząt zbliżone

do człowieka, o czym świadczy już ich wygląd zewnętrzny. Wśród mieszkańców Jawy istnieje przekonanie, że orangutangi stanowią pozostałość dawnej ludności tej wyspy, że umieją mówić, ale nie czynią tego, aby nie popaść w niewolę ludzką.

Małpy mają po dwie długie ręce o długich palcach i po dwie nogi podobne do rąk. Te cztery kończyny pozwalają im z łatwością wchodzić na najwyższe drzewa, z których wierzchołków zrywają owoce. Przerzucają się też małpy bardzo zręcznie z gałęzi na gałąź i z drzewa na drzewo. Jakkolwiek pomocne im w łażeniu po drzewach, ręce ich są jednak dalekie od tej gibkości i subtelności ruchów, którą posiada ręka ludzka (fig. 22).



Fig. 22. a—ręka człowieka; b—ręka, c—noga orangutana.

Już wygląd zewnętrzny wyróżnia bardzo znacznie małpę od człowieka. Małpa ma czoło niskie, znikające pod zwieszającym się włosiem, uszy bardzo wydatne, nos spłaszczony i ledwie wystający. Zęby bardzo silne, wydatne, szczęka dolna znacznie wysunięta naprzód. Cała prawie powierzchnia skóry okryta jest włosiem. Chód bardzo niepewny; niektóre gatunki mogą chodzić jedynie przy pomocy długich rąk.

Zdolności umysłowe małp nie są tak rozwinięte, jak u innych zwierząt, np. u słonia, psa, konia.

Liczą przeszło 100 gatunków małp, z tych niektóre poznamy bliżej.

15. **Goryl** (*Gorilla gina*) (fig. 23) jest największą z małp i najbardziej zbliżoną do człowieka.

Dotręga wysokości 2 metrów. Szaro połyskujące oczy są głęboko osadzone pod gęstymi, zwieszonymi brwiami, czoło płaskie, twarz na przód podana. Usta ma szerokie, zarys

warg wyraźny, bez żadnej różowości na brzegu. Szczęki zaopatrzone w potężne kły, niezwykle są mocne. Oczy bardzo oddalone od siebie; nos wydatny; ręka ukształtowana regu-larniej, niż u innych małp.

Podobieństwo do człowieka byłoby nierównie większe, gdyby nie szerokie plecy i okrągła, prawie pozbawiona szyi głowa, a zwłaszcza wielki brzuch, mówiący wyraźnie o żarłoczności zwierzęcia. Goryl obdarzony jest ogromną siłą i od-wagą, nie napada jednak na zwierzęta ani na ludzi w ce-lach innych; jak tylko o-brony własnej; żywi się wyłącznie pokarmem ro-slinnym. Odbywa on cią-głe wędrówki, wyszukując pożywienia po lasach za-chodniego wybrzeża Afry-ki, gdzie go pierwszy raz zobaczył w roku 1847 misjonarz francuski Sa-vage.

Du Chaillu tak opisu-je spotkanie z gorylem:

„Dał się słyszeć szyb-ki ruch w zaroślach i na-gle stanął przede mną go-ryl. Przez gęstwinę szedł on na czworakach, lecz ujrzawszy nas, podniósł się i spojrzał nam śmiało w oczy. Stał tak w odle-



Fig. 23. Goryl.

głości 12 kroków od nas; widoku tego nigdy nie zapomnę! Król afrykańskich lasów wydał mi się okropnem zjawiskiem; wyprostowany mógł mieć do 6 stóp wysokości. Dokładnie można było widzieć jego pierś potężną, silne, muskularne ra-miona, dzikie, błyszczące, ciemno-szare oczy i twarz pełną piekielnego wyrazu.

„Wcale nie okazywał bojaźni; potężnymi pięściami swe-mi bił się w piersi, aż słyszać było huk, jakby od uderze-nia w metalowy kocioł. Takie jest wyzwanie do walki i wy-raz gniewu goryla! Przytem wydawał ryk tak straszny, że się z niczem innem nie da porównać; jest to najokropniejszy

głos, jaki tylko może budzić echo afrykańskich lasów. Rozpoczyna się jakby głośnem szczekaniem wielkiego brytana, potem przechodzi w głuche warczenie, podobne do huk dalekiego grzmotu. Nieraz już ryk taki brałem za huk grzmotu, kiedym nie wiedział, że to głos goryla. Staliśmy nieruchomo w obronnej postawie. Oczy zwierzęcia pały wściekłością; grzywka z krótkich włosów na czole jeżyła się i opadała; ścisnął potężne swe pięści i ryczał nieustannie. Nagle




Fig. 24. Szkielet człowieka.




Fig. 25. Szkielet goryla.

podszedł parę kroków naprzód, tłukąc się pięściami w piersi i rycząc z wściekłości; był już tylko na 6 kroków odległości od nas. Wtenczas dałem ognia i położyłem go trupem.

„Nie mogę sobie wyobrazić żadnego innego zwierzęcia, umiającego wykonywać takie nieodparte napady na człowieka, — powiada ten sam podróżnik, — a to dlatego, że goryl staje do walki twarzą w twarz i używa tylko rąk jako oręża, tak samo, jak zapaśnik na pięści, tylko, że długie ręce i niesłychana ich siła zapewniają gorylowi stanowczą przewagę.

„Czasem jaki murzyn w zapamiętałym szale trwogi, zmuszony, mocuje się z gorylem, broniąc się przytem wystrzeloną bronią, ale w mgnieniu oka pochwyci go straszliwa pięść i jednym uderzeniem zgruchocze broń i czaszkę.”

16. **Szympanś** (*Troglodytes niger*), dosięga tej samej wielkości, co orangutan; skórę ma okrytą ciemnym włosem, a twarz naga jest żółtawej barwy. Żyje gromadnie w lasach Afryki zachodniej. Nierównie żywszy od goryla, jest od niego łagodniejszy; napałdnięty staje się niebezpiecznym przeciwnikiem. Buduje sobie na drzewach prawdziwe domki. W naszym klimacie nie może żyć dłużej nad kilka lat.

17. **Orangutan** (*Pithecus satyrus*) (Tab. I, fig. 1), znajduje się na wyspach Borneo i Sumatra. Dosięga wysokości 1 metra 35 cm. ($2\frac{1}{2}$ łokcia). Twarz i wewnętrzną powierzchnię dłoni ma wolne od włosów, skóra w tych miejscach jest szaro-niebiesko zabarwiona. Pozostałe części ciała okryte są włosem brunatnawym, w jednych miejscach gęstszym, w innych rzadszym; ręce sięgają prawie do ziemi.

Żywi się wyłącznie strawą roślinną, mianowicie owocami. Rękami rozłupuje orzechy wielkości głowy ludzkiej, które człowiek tylko toporem otworzyć może. Orangutany nie są tak ruchliwe, jak te małpy, które oglądamy w menażeryjach. Chód mają niezgrabny i ociężały; wogóle chodzenie po ziemi jest dla nich trudne. Zwykle przesiadują całemi godzinami w gniazdach, t. j. w szalaszach, urządzonych wśród gałęzi na drzewach. Starsze osobniki rzadziej włączają na drzewa.

W młodym wieku orangutan żyje gromadnie, w starszym odosabnia się częściej, zwłaszcza zaś samice; zaczepiony broni się z wielką siłą i zręcznością. Przywiązanie orangutanów do dzieci jest niepospolite.

O jednej pojmanej samiczce orangutana opowiadają następujące szczegóły:

„Była zawsze łagodna i nie okazywała ani przebiegłości, ani złośliwości. Można było śmiało kłaść jej rękę do ust. Wyglądała zawsze smutno i była przygnębiona. Jadła wszystko, co jej dawano, przekładała jednak nad inne rzeczy



Fig. 26. Szympanś.

owoce i rośliny korzenne, jadła również chętnie mięso gotowane lub pieczone i ryby. Jaja surowe wypijała z widoczną przyjemnością. Największym przysmakiem były dla niej poziomki, a zwykłym napojem—woda; pijała jednak chętnie wszelkie rodzaje wina, zwłaszcza malagę. Po wypiciu ocierała sobie usta dłonią, jak to czynią niekiedy ludzie; również posługiwała się czasami wykałaczką do zębów.

„Zabierając się do snu, robiła wielkie przygotowania. Najpierwej rozkładała równo siano na swoim legowisku, przetrząsała je, kładła osobny pęczek pod głowę i okrywała się kołdrą. Gdy otwierano raz kluczykiem kłódkę jej łańcucha, przyglądała się uważnie tej czynności, a następnie wzięła kawałeczek drzewa, włożyła go do otworu kłódki i obracała na wszystkie strony, próbując otworzyć.”

Podajemy tu jeszcze ustęp z opisu Abla, który obserwował orangutana podczas podróży morskiej:

„Nasz orangutan nie lubił wykrzywiań się i skoków innych małp i nie robił szkód tak, jak one. Był zawsze poważny, melancholijny i smutny, co się wyraźnie na jego twarzy malowało. Skoro po raz pierwszy znajdował się w towarzystwie obcych osób, przesiadywał całymi godzinami z głową opartą na ręku i w milczeniu przypatrywał się otaczającym, albo starał się ukryć pod znajdującą się w pobliżu kołdrę lub serwetę, kiedy mu ciekawość obcych osób stawała się natrętną. Łagodność jego okazywała się w tem, że długo znosił wyrządzane sobie przykrości, zanim się wreszcie rozgniewał; zwykle unikał osób lubiących go drażnić, a przeciwnie bardzo był przywiązany do tych, które przyjaźnie z nim się obchodziły; chętnie obok nich siadywał, przytulając się do nich, jak mógł najbliżej, ręce ich wkładał sobie pomiędzy wargi, jakby tym sposobem prosząc o obronę. Zawsze łąził za mną do bocianiego gniazda*), gdzie często przebywałem, aby zdala od hałasu okrętowego czytać w spokoju. Przekonawszy się, że w moich kieszeniach nie było nic do jedzenia, układał się koło mnie, okrywał się żaglowem płótnem i śledził moje poruszenia. Na Jawie najmilszą jego zabawą było przeskakiwanie z drzewa na drzewo po gałęziach, albo łażenie po dachach domów; na okręcie zaś lubił kołysać się na linach, albo mocować się z chłop-

*) Rodzaj kosza u szczytu masztu.

cami okrętowymi. Zaczepiał ich sam, udzielając przechodzącym obfitych szturchańców i uciekając niby ze strachu, prędko jednak dawał się doścignąć i ochoczo stawał do walki, w której używał wszystkich czterech rąk i zębów.

„Chociaż ten orangutan był bardzo łagodny, jednak nieogłędnie drażniony wpadał we wściekłość nie do opisania; złość swoją okazywał szczerzeniem zębów, osoby zaś znajdujące w pobliżu chwytął, przytrzymywał i kąsał. Kilka razy zdawał się wpadać w rozpacz i w tym stanie posuwał się do takich czynności, które w istotach obdarzonych rozumem należałoby poczytywać za zamachy samobójcze. Gdy mu nie dano pomarańczy, której żądał, zaczął wydawać dzikie wrzaski i latać jak opętany po linach; potem powrócił i znowu domagał się pomarańczy; gdy mu jej i tym razem odmówiono, zaczął się tarzać po pokładzie, jak małe dziecko w przystępie złości; nagle wydał przeraźliwy wrzask i jak szalony wyskoczył przez burtę okrętu. Widząc to po raz pierwszy, sądziliśmy, że wskoczył w morze, lecz później przekonaliśmy się, że się uczepił lin na zewnętrznej stronie okrętu, po których wdrapał się znów na pokład.

18. Od tych małp, najbardziej zbliżonych do człowieka, przejście do innych, mniej do niego podobnych stworzeń, stanowią małpy *długorekie*, mieszkające w Indiach wschodnich i na pobliskich wyspach. Do nich należą **Gibbony** (fig. 27), nie przechodzące wzrostem jednego metra, bezogoniaste, o twarzy także bardzo podobnej do ludzkiej.

Dalej idą małpy, mające wspólną nazwę **Kotowców** (*Cercopithecus*). Do tejże rodziny należy jedyna małpa europejska, mieszkająca na Gibraltarze — **Magot** (*Insus ecaudatus*) (fig. 28).

Małpy te są bardzo wrażliwe na chłody i zmieniają miejsce pobytu za każdą zmianą kierunku wiatru.



Fig. 27. Gibbon.

Do Kotowców należy także **Koczkodan** (*Simia nemeus*) (Tab. I, fig. 2), pochodzący z Kochinchiny. Ma ogon prawie równie długi, jak i tułów: zabarwienie różnych części ciała nie-



Fig. 28. Magot.

jednakowe: grzbiet szary, nogi w górnej części czarne, w dolnej brunatne; ręce czarne i takież pasek na czole; ramiona białe, również jak broda, krzyż i ogon; twarz żółta, szyja brunatna. Jest to małpa bardzo bojaźliwa; przed człowiekiem ucieka w głąb lasu; w niewoli nie żyje długo.

19. Trzecią gromadę stanowią **Pawiany** (*Cynocephalus*) (fig. 29).

Jest to nazwa grecka, oznaczająca psią głowę, bardzo trafna, gdyż nie tylko kształt głowy i układ sierści, ale i głos pawianów przypomina szczekanie psa. Są to zwierzęta bardzo silne, z pyskiem zaostrozonym ku przodowi. Zęby mają



Fig. 29. Pawian.

bardzo mocne, zwłaszcza kły. Budowa ciała i obyczaje zbliżają je więcej do czworonożnych. W przeciwieństwie do wyżej opisanych gatunków, pawiany mają ręce bardzo krótkie. Żyją w Afryce i na wyspach Indyj Wschodnich, przeważnie w miejscowościach skalistych i wysoko położonych; unikają równin i lasów, gdyż budowa ciała nie pozwala im chodzić prosto i utrudnia pobyt na drzewach. Żywią się wszelkim pokarmem

roślinnym, owocami, ziołami, trawą, bulwami i t. d.; pożywają też i mniejsze zwierzątka, zwłaszcza ślimaki, owady i pająki. Sposób ich żywienia się czyni je szkodliwymi w miejscowościach zaludnionych, tembardziej, że żyją gromadnie, a siła i dzikość czyni je niebezpiecznymi dla człowieka.

Pawiany nie są z natury łagodne. Silne i przebiegłe, zuchowały i chciwe rabunku, zrządzają one wielkie szkody osad-

dnikom, i zdarza się, że banda pawianów napada na robotników w polu, spędza ich i wtedy bez przeszkody niszczy i rabuje plony.

Samuel Baker tak opisuje te małpy: „Zabawnem jest widzieć wielkie samce, przechadzające się poważnie po brzegu w towarzystwie całej bandy, liczącej przedstawicieli każdego wieku. Samice noszą na grzbiecie małe, które siedzą, jak na koniu, albo też wyciągają się jak długie, trzymając się matek za kudły. Jedna z młodszych małp znalazła krzak okryty jagodami; wszystkie rzucają się tłumnie na zdobycz, przyczem zaczyna się walka o lepsze miejsca, kończąca się ogólną bójką. Wtedy wpada stary pawian, jednemu daje parę szturchańców, drugiego wytarga za czuprynę, trzeciego kłapnie zębami, czwartego, który się chciał ratować ucieczką, chwyta za ogon i mocno nim wstrząsa. Porządek zostaje przywrócony, a dalszym sporom zapobiega samiec, obejmując krzak w wyłączne posiadanie.

Istnieje kilka gatunków pawianów:

Pawian czarny (*C. niger*), żyje na wyspach archipelagu Indyjskiego.

Mandryl (*C. Mormon*) (Tab. I, fig. 3), należy do najdziwniej zabarwionych: kości policzkowe, rozrosłe do niezwykłych rozmiarów, tworzą po obu stronach nosa wypukłości, zabarwione na niebiesko z czerwonymi pręgami; także zabarwienie mają pośladki. Włos na górnej powierzchni ciała szaro-zielony, pod spodem srebrzysto-siny, bokobrody cytrynowo-żółte. Dochodzi wysokości $1\frac{1}{2}$ metra.

Zamieszkuje pustynie Afryki; jest równie chytry, jak złośliwy, a niebezpieczny z powodu znacznej siły. Żywi się pokarmem roślinnym, bywa często szkodliwy; całe gromady mandryłów nawiedzają niekiedy osady krajowców.

Mandryl nie obawia się człowieka; nie daje się przestraszyć strzałem karabinowym, a każda małostka doprowadza go do wściekłości. Dlatego też negrowie obawiają się nawet wstąpić do lasu zaludnionego przez mandryle.

Niewolę znosi mandryl z łatwością; nie jest wszakże nigdzie pożądanym z powodu swej dzikości. Stare mandryle nie dają się ani schwytać, ani oswoić.

Dryl (*C. leucophaeus*), podobny jest do mandryla pod względem zwyczajów; twarz ma zupełnie czarną, a sierść bardziej zielonkawą. Mieszka w tych samych krajach Afryki, co i mandryl.

20. Odrębne są małpy Nowego Świata. Wśród nich szczególnie zasługują na uwagę:

Wyjce (*Mycetes*) (*Tab. I, fig. 4*), o sierści: u samców czarnej, u samic brunatnej. Mają ogon czepny, oddający im wielkie usługi przy włożeniu na drzewa. Zamieszkują Amerykę południową; trzymają się przeważnie gęstych, wilgotnych lasów i brzegów rzek.

Zrana i wieczór napełniają puszcę niemiłym głosem. Chętnie spędzają czas gromadnie, przesiadując lub leżąc na drzewach, niekiedy zawieszone ogonem na gałęzi. Twarz, otoczona długą brodą, nadaje im wygląd poważny. Gdy jedna ze starych małp rozpoczyna okropny śpiew, niebawem przyłącza się do niej całe towarzystwo, i ten przeraźliwy koncert trwa nieraz całe godziny.

„Gdy raz wstąpiłem do lasu — pisze Schomburgh — usłyszałem z jego głębi wycie wyjców. Pośpieszyłem w kierunku głosów i po długich poszukiwaniach udało mi się zbliżyć niepostrzeżenie tak, iż mogłem widzieć całe ich towarzystwo. Małpy siedziały na wysokiem drzewie i wydawały tak przeraźliwe wycie, jak gdyby wszystkie dzikie zwierzęta puszczy staczały między sobą śmiertelną walkę. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w koncercie tym panowała pewna zgodność. Na dany znak cała gromada rozrzucona na drzewie, to umilkła, to jedna z małp niespodziewanie rozpoczynała śpiew, a wycie wszystkich zaraz jej wtórowało. Głosy te przypominały chrząkanie wieprza, to ryk jaguara, rzucającego się na zdobycz, to znów naśladowały straszliwe wycie tego zwierzęcia, gdy otoczone ze wszech stron, poznaje grożące mu niebezpieczeństwo.

Indjanie polują na wyjce i jedzą je. Lecz niekiedy nawet śmiertelnie raniona małpa zawiesza się ogonem na gałęzi i w tej pozycji zostaje, zawodząc nadzieje myśliwego.

Głównemi gatunkami są:

Wyjec czerwony (*Mycetes seniculus*) czyli Aluat (*Tab. I, fig. 4*) i **wyjec czarny** czyli Caraga (*M. niger*).

Rzęd III. Małpozwierze.

21. **Małpozwierze** czyli małpiatki stanowią ogniwo pośrednie między małpami a innymi ssakami.

Mają one, jak pierwsze, cztery ręce, lecz palec wskazujący uzbrojony jest zakrzywionym pazurem. Budowa głowy przypomina lisa. Są to niewielkie zwierzątka, przeważnie nocne; oczy mają duże, również jak uszy. Znajdują się na Madagaskarze i na pobliskim lądzie Afryki, także na wyspach Sundzkich.

Najbardziej znanymi z tych zwierząt są **Lemur** i **Makako** (fig. 30). Żyją na Madagaskarze; po nocach snują się całymi stadami.



Fig. 30. Maki Makako.

Lori czyli **Leniuchy** (fig. 31)

żyją na wyspach Oceanu Indyjskiego. O jednym z nich, trzymanym w niewoli, opowiadają: „W pół godziny po wschodzie słońca zasypiał, skręcając się w kłębek, jak jeź, i spał do zachodu słońca. Na pół godziny przedtem budził się, mył się, jak kot, przyjmował odrobinę pokarmu, aby znów nieco się zdrzemnąć, i dopiero przy zupełnym zmroku rozpoczynał nocne swe życie. Jeśli jaki owad usiadł w pobliżu, Lori wytężał na niego wzrok, cofał się nieco, potem rzucał się jednym susem naprzód i chwycił zdobycz obiema rękami.”



Fig. 31. Lori.



Fig. 32. Maki latający.

Galeopiteki czyli **Maki latające** (fig. 32) mają błony, ułatwiające im skakanie z drzew, a nawet przelatywanie z gałęzi na gałąź.

Rząd IV. Nietoperze.

22. Zwierzęta te niezwykłym kształtem przypominają mysz i ptaka. Palce ich przednich kończyn są bardzo wydłużone, a pomiędzy nimi rozciągnięta jest błona, która tworzy jakby skrzydła (fig. 33 i 34), przedłuża się zaś do nóg tylnych, a zwykle i do ogona. Oczy ma nietoperz małe, uszy wydłatne, zęby ostre. Lot ich jest pewny i cichy, lecz nie wytrwały.



Fig. 33. Skrzydło nietoperza.



Fig. 34. Nietoperz w śnie zimowym.

Zimę spędzają, chowając się w szpary i szczeliny, gdzie zawieszają się pazurami tylnych nóg i zostają tak pograżone w śnie aż do wiosny.

Krajowe gatunki nietoperzy żywią się owadami, należą więc do zwierząt użytecznych. W ciepłe noce letnie latają często dokoła kwitnących lip, aby łowić ćmy, żywiące się miodem kwiatów. Dla dzieci swych nietoperze nie sporządzają żadnych gniazd; młode czepiają się zwykle błony lotnej matki i unoszone są przez nią podczas jej lotu. Z krajowych gatunków największy jest **Nocek myszaty** (*Tab. I, fig. 5*) o długich uszach, zamieszkujący górzyste okolice jak np. Ojców. Ma on 7 cm. długości, a sięg skrzydeł 37 cm. Gnieździ się w jaskiniach i zwaliskach.



Fig. 35. Wampir.

Z gatunków amerykańskich nietoperzy znany jest **Wampir** (*Phyllosoma spectrum*) (fig. 35), żywiący się zwykle owadami, ale przy sposobności wysy-

sający krew uśpionym zwierzętom jucznym. Ranki, sprawione przez wampira, nie są niebezpieczne; gdy jednak większa ilość wampirów napada na zwierzę, utrata krwi może je osłabić.

Rząd V. Owadożerne (Ryjkonosy).

23. Należą tu drobne zwierzątka, żywiące się owadami i odbywające przeważnie nocą swoje wyprawy myśliwskie. Zęby mają drobne, ale zupełnie zastosowane do pokarmu mięsnego. Owadożerne są użyteczne dla człowieka, gdyż niszczą jego wrogów—szkodniki pól, lasów i ogrodów.

24. **Kret** (*Talpa europaea*) (fig. 36) mieszka na łąkach i polach, w ogrodach i lasach, gdzie znajduje dla siebie pożywienie. Siedzibę ma pod ziemią. Żywi się robakami ziemnymi, gąsienicami, poczwarkami, jaszczurkami, węzami, żabami, łowi myszy i szczury; nie oszczędza też i podobnych sobie. Ma 44 zęby. Ciało jego doskonale jest przystosowane do polowania na te istoty; tułów ma walcowaty, ryjek zaostroszony, głowę ukrytą w ramionach, szyi prawie niema. Oczy są bardzo małe, ukryte w sierści; uszu wcale niema; powonienie zato ma niezwykle delikatne. Sierść ma miękką, krótką, jedwabistą; ogon krótki. Łapki przednie są bardzo silne, krótkie i obrócone na zewnątrz; mają one kształt dłoni o 5 ostro zakończonych palcach, z których środkowy najdłuższy. Łapki tylne są cokolwiek dłuższe, lecz słabe. Kret ma zdolność tak szybkiego rycia ziemi, że wyrzucony na powierzchnię, w jednej chwili znów znika pod ziemią.

Kret żyje samotnie; jest złośliwy i krwiożerczy. Ma licznych nieprzyjaciół wśród zwierząt, jak np. lisa, jeża, łasicę,



Fig. 36. Kret.



Fig. 37. Mieszkanie kreta.

kunę; czyhają nań także sowy, sokoły i kruki, prześladowe go człowiek. Od tych wrogów ratuje kreta ciemna sierść, ostry słuch, bystrość ruchów i sztuczna budowa legowiska.

Legowisko kreta składa się z właściwego gniazda (fig. 37), umieszczonego na głębokości 3 stóp pod ziemią—zwykle pod korzeniem drzewa, lub pod murem —i z idących od kotliny gniazda promienisto kanałów, ciągnących się na 30—40 metrów pod ziemią i otwierających się w miejscach, gdzie zwierzę odbywa polowanie. Pomiedzy połową kwietnia a czerwca rodzi się 4 — 6 małych, które kret troskliwie pielęgnuje w swojej norze; skoro jednak urosną, wypędza je od siebie i zostaje znowu samotny. Kret jest pożyteczny, gdyż niszczy wiele szkodliwych owadów. Wprawdzie niemiłe są często dla ogrodników jego podziemne roboty i ziemia, którą na wierzch wyrzuca, korzyści wszakże przewyższają szkody, jakie poczynić może. Należy więc go oszczędzać.



Fig. 38. Jeż.

25. Jeż (*Erinaceus europaeus*) mieszka również głównie pod ziemią, w jamach, pod korzeniami drzew i w kupach kamieni. Całe ciało, prócz brzucha, okryte jest ostrymi, mocnymi igłami; nogi ma krótkie, ale silne. Wychodzi po zdobycz tylko

w nocy; gdy go niepokoją, zwija się natychmiast w kłębek, wystawiając ze wszech stron swe ostre igły.



Fig. 39. Jeż napadnięty przez psa.

W takim położeniu żaden pies go ruszyć nie może. Igły są mu i pod innym względem użyteczne: zwinięty w kłębek stacza się po stromych urwiskach lub rzuca się z wysokości kilku metrów bez najmniejszej szkody. Zwiniętego w kłębek można zmusić do rozkręcenia się, polewając go wodą.

Jeża zaliczamy również do zwierząt użytecznych; pożera on myszy, szczury i inne zwierzęta szkodliwe, nawet gadziny zjada bez żadnej obawy, nie jest bowiem wrażliwy na ich jad.

26. **Kretomyszy** (*Sorex*), są to małe zwierzątka o wydłużonym ryjku; umieszczone po obu stronach ciała gruczołki, wydzielające piżmo, chronią je od kotów, które nie znoszą tej woni. Żywią się owadami. Przedstawicielami tu są: **Sorek**, **Kretomysz** czyli **ryjówka domowa** (*S. araneus*) (fig. 40), **K. Zębiełek** (*S. pigmaeus*) (Tab. I, fig. 7). Ostatni jest najmniejszym ze zwierząt ssących; nie większy od chrząszcza, ale są to zwierzęta tak żarłoczne, że głodne pożerają się nawzajem.



Fig. 40. Sorek.

Rząd VI. Drapieżne.

27. Są to zwierzęta przeważnie wielkie, o ruchach szybkich i zręcznych; łapy mają zakończone ostre pazurami; zęby wielkie i ostre, zwłaszcza zaś kły wydätne (fig. 41 i 42). Wszystko w nich przystosowane do napaści na żywą




Fig. 41 i 42. Uzębienie drapieżnych:

psa: A, D—zęby przodowe, B, C—kły.
E—trące.

kota: A, D—kły, B, C—zęby trące.

zdobycz i do pożywienia mięsnego. Są to prawdziwi władcy w królestwie zwierzęcem, a panowanie ich daje się uczuć wszędzie: na drzewach, u ich stóp, w ich wnętrzu, w górach i na równinach, na łądzie i w wodzie, w lesie i w polu, wśród lodów północy i na spalonym od słońca południu. Na-

leżą tu najpiękniejsze zwierzęta, ale też i najniebezpieczniejsze, z któremi człowiek ciągle toczy wojnę.

Rozróżniamy kilka rodzin w tym rzędzie:

1. Koty (*Felidae*); **2. Hieny** (*Hyaenidae*); **3. Psy** (*Canidae*); **4. Łasze** (*Viverridae*); **5. Kuny** (*Mustellidae*); **6. Niedźwiedzie** (*Ursidae*).

28. 1. Koty.

Lew (*Felis leo*) (Tab. I, fig. 8) sierść ma gładką, przylegającą i krótką, najczęściej jednobarwną, żółtą; pazury ruchome, dające się wciągnąć zupełnie. Ogon zakończony jest rogowym ostrzem, otoczonym kiścią włosów. Samiec ma na szyi i piersiach długą, gęstą grzywę.

Lew jest królem wśród zwierząt. Otacza go jakby majestat grozy i potęgi. Charakter jego nacechowany dumą, odwagą i roztropnością.

Mieszka w starym świecie, mianowicie w Azji i Afryce; za siedzibę swoją obiera samotne puszcze, pełne skał i jaskiń. Tu spędza dzień śpiąc. O zmierzchu podnosi się z legowiska swego, wyciąga się i, prostując członki, wydaje ryk, na którego głos w całej okolicy drżą ludzie i zwierzęta. Biada temu z nich, kto się znajdzie w pobliżu potężnego króla puszczy! Rzuca się on skokiem, sięgającym na 9 metrów, a skutki tego rzutu są straszliwe: jednym ciosem może zabić konia razem z jeźdźcem. Na człowieka jednak rzuca się rzadko. Pewien kolonista afrykański spotkał podczas przechadzki lwa. Strzelił do niego, lecz widząc, że chybił, wskoczył na kupę kamieni i podniósł w górę kolbę karabinu. Lew zatrzymał się i położył się o kilkanaście kroków od niego; po upływie pół godziny jednak wstał i zaczął z wolna cofać się, jakby usiłując usunąć się nieznacznie; dopiero gdy znalazł się w dość znacznej odległości, począł uciekać ze wszystkich sił.

Polowanie na lwy jest bardzo niebezpieczne.

Wiele ciekawych opowiadań o zwyczajach lwów zebrał nieustraszony ich pogromca, Juliusz Gérard, który całe życie poświęcił łepieniu tych zwierząt.

Powiada on, że każde spotkanie ze lwem w nocy, grozi zagładą człowiekowi, jeśli się nie potrafi obronić. W dzień, gdy lew jest nasycony i ociężały, często mija człowieka bez napaści, lub nawet ucieka. Sam Gérard nieraz czatował w pustyni w nocy, wśród takiego zmroku, że, czekając na

potężnego przeciwnika, zmuszony był obwijać białym papierem cel swego karabinu, ażeby go dostrzedz, i staczał z nim walkę sam na sam.

Najbardziej zbliżony do lwa jest **Kuguar** (fig. 43) czyli **puma**, zwany także **lwem amerykańskim** (*Felis concolor*), takiegoż koloru jak lew, lecz bez grzywy i bez kiści na końcu ogona. Jest on znacznie mniejszy od lwa afrykańskiego. Znajduje się na całym lądzie amerykańskim, od Patagonji do Kanady. Niszczy stada i dlatego zawzięcie jest prześladowany. Nie ma też odwagi lwa afrykańskiego.

Pewien podróżny, polujący w pampasach amerykańskich na kaczki, skradał się do nich owinięty w „ponczo” czyli lekki płaszcz wełniany. Nagle usłyszał krótki ryk i uczuł dotknięcie. Zrzucił okrycie i ujrzał przed sobą kuguar, który był również zdziwiony niespodzianką, spoglądał przez kilka chwil na myśliwego, później cofnął się zwolna o kilka kroków i nagle umknął w bystrych skokach.




Fig. 43. Kuguar.

29. **Tygrys** (*Felis tigris*) (Tab. I, fig. 9), barwy żółto-brunatnej lub rdzawo-czerwonej, czarno pręgowany. Nie ma ani grzywy, ani kiści na ogonie. Długość jego wynosi prawie $2\frac{1}{2}$ metra, z których przeszło $\frac{3}{4}$ metra przypada na ogon. Najstraszliwsze to ze zwierząt drapieżnych zamieszkuje przeważnie południowo-wschodnią Azyę. Nie ma on ani dumy, ani odwagi lwa, lecz chytryść i tchórzliwą srogość. Siła i szybkość jego są zadziwiające. Raz skoczył tygrys jednym straszliwym susem na grzbiet słonia, porwał anglika z siodła, skoczył z nim na ziemię i chciał go powlec. Towarzysze nieszczęśliwego jeźdźca skierowali broń na tygrysa, lecz bali się strzelać, aby nie trafić do człowieka, zamiast do zwierzęcia; pozostawili go więc własnemu losowi. I dobrze się stało, gdyż oszołomiony wskutek spadnięcia ze słonia i przerażenia, gdy ciernie poczęły drapać mu twarz, myśliwy odzyskał niebawem przytomność. Rozpoznawszy w okamgnieniu swoje położenie, wyjął pistolet z za pasa i wystrzelił do tygrysa. Strzał jednak chybił, a tygrys mocniej tylko ujął go zębami. Nie tracąc przytomności, anglik wydobyl

z za pasa drugi pistolet i tym razem był tak szczęśliwy, że trafił w samo serce zwierzęcia, które natychmiast padło martwe.

Trapiiony głodem tygrys wpada niekiedy do wsi, sięgając postrach wśród jej mieszkańców. Lubi on szczególnie mięso ludzkie. Gdy leży na czatach, oczy jego świecą się w ciemności. Konie czują go z bardzo daleka; strach przed nim paraliżuje je zwykle. Polowanie na tygrysy bywa rozmaite. Koń tak się boi tygrysa, że niepodobna go zmusić, aby postąpił ku zwierzęciu. Słoń, przeciwnie, stoi spokojnie, dając możność siedzącemu na nim myśliwemu wymierzyć strzał, uprzedzający skok tygrysa. Jeśli chybi, grozi obojgu wielkie niebezpieczeństwo, tygrys skacze na głowę słonia, a siła tego skoku jest tak wielka, że może wywrócić słonia wraz z jeźdźcem. Często się wszakże zdarza, iż słoń zrzuca tygrysa trąbą na ziemię i depta nogami. Tygrys lubi prześiadywać w zaroślach, na wilgotnych gruntach, i niezbyt łatwo go stamtąd wypłoszyć. Polowanie na tygrysy stanowi ulubioną rozrywkę książąt indyjskich; pamiętają oni jednak o zabezpieczeniu własnych osób, mniej dbając o los tych, których używają do pomocy. Oto jak się to odbywa.

Na drzewach, na takiej wysokości, do której nie może sięgnąć żaden największy nawet skok tygrysa, budują wygodne rusztowanie dla księcia; na niem zasiada on wraz z licznem otoczeniem. Rozpoczyna się obława, do której naganają biednych wyrobników. Ci, rozciągnięci w szereg, wyruszają z wrzaskiem, biciem w bębny, trąbieniem, strzelaniem z pistoletów. Zbudzone nagle z dziennego snu tygrysy ustępują z początku przed naganką, lecz wkrótce domyślają się zasadzki i zwracają się na obławę. Rzucają się wstecz i nieraz w kilku skokach przebywają łańcuch myśliwych, z których niejeden przypłaca życiem odwrót zwierza. Inaczej, ale nie mniej hałaśliwie, polują na tygrysa Europejczycy: obok dobrze uzbrojonych strzelców i psów idą ludzie z bębnami, trąbami i dzwonkami, a za niemi inni, którzy rzucają kamienie w gęstwinę, aby z niej zwierzę wypłoszyć.

30. **Jaguar** (*Felis onca*) (Tab. I, fig. 10) ma żółto-czerwonawą skórę w cętki czarne. Mieszka w Ameryce południowej, od Paragwaju do Meksyku, i jest największym i najniebezpieczniejszym z drapieżników tego kraju. Jaguar poluje na najrozmaitsze zwierzęta, głównie jednak rzuca się na bydło. Nie oszczędza też człowieka, a głodny nie gardzi i ry-

bami. Nazywają go „lwem amerykańskim.” Na byki i woły napada rzadko, gdyż te stawiają mu energiczny opór. Człowieka unika, ale gdy jest bliżej osad ludzkich, przyzwyczajają się do jego widoku i napada nań. Polują na niego zwykle we dwóch: jeden z myśliwych uzbrojony jest dwoma długimi oszczepami z twardego drzewa, drugi łukiem lub strzelbą. Gdy jaguar zwraca się ku myśliwym, aby skoczyć, pierwszy nadstawia mu razem złożone oszczepy, drugi zaś strzela do niego. Jeżeli strzał nie zabije jaguara, to on przebija się, wpadając na oszczepy; czasem jednak łamie je lub odtrąca łapą i wtedy myśliwi zmuszeni są walczyć ręczną bronią.

31. **Lampart** (*Felis leopardus*) (fig. 44) i **Pantera** (*Felis pardus*) (fig. 45) są bardzo do siebie zbliżone, a może nawet



Fig. 44. Lampart.



Fig. 45. Pantera.

stanowią jeden gatunek. Pierwszy mieszka w Afryce, drugi w Azji. Lampart ma skórę pięknie cętkowaną. Jest to zwierzę bardzo zęczne i odważne; rozdrażnione napada nawet na człowieka.

32. **Kot domowy** (*Felis domestica*) jest powszechnie znany. Wśród odmian kota domowego—**angorski** (fig. 47) odznacza się ładną i długą sierścią.

Najbliższym krewniakiem kota jest **kot dziki** (*F. catus*) czyli **żbik** (fig. 46), bardzo szkodliwy dla zwierzyny; spotyka się zwłaszcza w Karpatach.



Fig. 46. Kot dziki.

33. **Ryś** (*Felis Lynx*) czyli **ostrowidz** (Tab. I, fig. 11), grzbiet ma czerwono-szary z ciemniejszymi plamami, brzuch

biały; spotyka się jeszcze w Alpach i Karpatach, również w Europie północnej i w Azji; w środkowej Europie już go niema. Jest bardzo drapieżny. Szkodliwy zwłaszcza dla zwierzyny; ukryty w gałęziach niewysokich drzew, czatuje na przechodzące zwierzęta; rzuca się nawet na konie i jelenie. Prześladowa go myśliwi tak gorliwie, że corocznie znajduje się w handlu do 50,000 skór rozmaitych odmian rysia.



Fig. 47. Kot angorski.

ścicie od kotów do psów. Ma on sierść jasno-żółtawo-szarą, usianą cętkami brudnymi i czarnymi; długość ciała około 1 metra. Zamieszkuje Indie wschodnie, a pokrewny mu gatunek znajduje się w Afryce. Daje się oswoić i władcy indyjscy używają go do polowania.



Fig. 48. Gepard.

35. 2. Hijeny.

Hijena cętkowana (*Hyena crocuta*) (fig. 49), szaro-biała, brunatno cętkowana, dosięga długości $1\frac{1}{4}$ metra. Wygląd ma niemiły i wydaje wstrętną woń. W ciągu dnia ukrywa się, w nocy wychodzi na łup. Zbliżona do niej jest **hijena pręgowana** (*H. striata*) (Tab. I, fig. 17). Zwierzęta te są bardzo tchórzliwe; krążą tłumnie dokoła osad ludzkich, napadając na zdobycz śpiącą.



Nieraz zachodzą i do wsi, a na cmentarzach wygrzebują i pożerają trupy nie głęboko zakopane. Dają się oswoić i wtedy żyją, jak koty, posłuszne rozkazom człowieka.

36. 3. Psy.

Pies domowy (*Canis familiaris*) spotyka się w wielu odmianach, tak pod względem kształtu i barwy, jako też uzdolnień. Łatwo przyjmuje wszelką naukę, posiadając zadziwia-

jący zmysł i pamięć miejsca i czasu. Pies jest towarzyszem i stróżem człowieka, jego pomocnikiem w walce i w polowaniu. Odnacza się szczególnie wiernością i wdzięcznością. Żadne zwierzę nie przywiązuje się tak do człowieka jak pies. Przyjaźń ta psa z człowiekiem datuje się od bardzo dawnych



Fig. 50. Psy dzikie: pies afrykański, pies himalański, Dingo czyli pies australski, pies amerykański.

czasów, bo przedhistorycznych, jak dowodzą tego kości jego, znajdujące w budowlach nawodnych. Bardzo liczne odmiany powstały pod wpływem oswojenia i służą najrozmaitszym celom człowieka. Psy Eskimosów dźwigają nawet ciężary, a wprężone do sań, ciągną je szybko po śnieżnych pustyniach Ameryki północnej i Syberji. Zaprzęga się zwykle




Fig. 51. Charty, brytan, buldog dog duński.

kilkanaście psów, każdy przywiązany jest rzemieniem do głównego lejca, na przodzie zaś biegnie najsilniejszy i doświadczony, jako przewodnik. Sanie pędzą równo, z szybkością, dochodzącą dwóch mil na godzinę. Niekiedy bieg przerywa kłótnia, wszczynająca się pomiędzy zaprzęgiem, a przecho-

dzająca w czynną walkę. Wtedy gospodarz wyczerpawszy daremnie środki swego długiego bata, zmuszony bywa wdać się bliżej w sprawę, poodciągać bijące się psy i uporządkować splątaną uprząż. Te same psy pomagają Eskimosom w polowaniu na foki, niedźwiedzie i wydry, pełnią rolę stróżów



Fig. 52. Wyżły, pies króla Karola, pies Newfoundlandzki, wyżeł, ogar, jamnik, pudel.

i wogóle oddają tysiące usług, bez których życie w tych strefach byłoby niemożliwe dla człowieka.

Podobne usługi oddają mieszkańcom krańców północno-wschodniej Syberji psy Kameczadalów. Są one bardzo silne, tak, iż pięć psów wystarcza do ciągnięcia sanek, w których siedzi dwoje ludzi i leżą pakunki. Przeczuwają one zamieć śnieżną i objawiają to kopaniem dołów w śniegu; gdy za-



Fig. 53. Pies Eskimosów, szpic, pies z góry św. Bernarda, psy owczarskie.

mieć nastąpi, otaczają człowieka, którego grzeją swem ciepłem. Psy te łowią także ryby, na które czatują, siedząc całymi dniami na brzegu rzeki.

Psy z góry św. Bernarda, utrzymywane przez zakonników klasztoru na tej górze, przyzwyczajone są do odszukiwania zbłąkanych i osłabionych lub zasypanych śniegiem podróż-

ników, których cuca i służą im za przewodników. Psy te (fig. 54) należą do brytanów, potężnej psiej rasy, wśród których zresztą odznaczają się łagodnością, rozumem i przywiązaniem do człowieka.

Wodołazy czyli psy Newfoundladzkie, również duże, inteligentne i bardzo przywiązane do człowieka, mają płetwy między palcami, ułatwiające im pływanie. Ratują one z własnego popędu ludzi i zwierzęta tonące.



Fig. 54. Psy z góry św. Bernarda.

Z psów używanych do łowów, wymieniamy:

Charty o wysmukłym kształcie, brzuchu wciągniętym i długich, cienkich nogach.

Są to psy biegające najszybciej, używane do ścigania zwierzyny (lisów, zajęcy i t. d.).

Wyżły, których istnieje bardzo wiele odmian, mają bardzo rozwinięte powonienie i używane są do tropienia zwierzyny, wypłaszania i przynoszenia zabitej.

Brytany, do których należą buldogi (pijawki), są to psy bardzo śmiałe i złe, używane do polowania na wilki, niedźwiedzie, dziki, pantery i tygrysy.

Wśród stróżów domu i mienia człowieka na szczególną uwagę zasługują **psy pasterskie**, czujne, sprytne i odważne, staczające walkę z nieprzyjaciółmi stad.

Różne formy zwyczajnie spotykamy wśród bezużytecznych i brzydkich **psów pokojowych**.

I dziś jeszcze znajdują się gatunki **psów** zupełnie **dzikich**, najczęściej żyjących gromadnie i polujących całymi stadami. Do takich należą:

Kaberu, zdarzający się w Afryce, kształtu wilka, lecz nieco mniejszy od niego; napada na stada i niszczy bydło.

Dingo czyli **pies Australijski**, podobny do lisa, lecz większy od niego, jest również niebezpieczny dla trzód. Wszakże szczenięta ich dają się oswoić i zastosować do polowania.

Pies Indjan Ameryki Południowej używany bywa przez nich do polowania. **Buansu** czyli pies pierwotny, znajdujący się w górach Himalajskich, żyje tam stadami i odbywa swe polowania w dzień dość hałaśliwie.

Likaon (*Lycaon pictus*), (Tab. I, fig. 12), zwany **hijaną stepową** lub **psem malowanym**, na skórze ma łaty plamiaste, białe, czarne i żółte, mieszka w środkowej i południowej Afryce, żyje w gromadach do 40 sztuk liczących, rzuca się na antylopy i owce, niekiedy nawet na woły i zebry.

37. Wilk (*Canis lupus*) (fig. 55). Drapieżca ten jest bardzo szkodliwy, sierść ma żółtawo-szarą, z miejscami ciemniejszymi,



Fig. 55. Wilk.

na brzuchu jaśniejszą, dosięga wielkości dużego psa owczarskiego. Wygląd ma złowrogi, wejrzenie chytre, uszy wzniesione. Usposobienie ma dzikie, i oswojony za młodu, wraca potem do swych drapieżnych obyczajów. Gdy nie może dostać swego ulubionego pożywienia, owcy lub jagnięcia, pożera myszy, żaby

i padlinę. Tchórzliwy jest, jak hijena, lecz skoro czuje głód, zapomina o strachu; porywa wtedy owcę w oczach pasterza, wdziera się nawet do obory, rzuca się na ludzi, a także na konie i bydło, usiłując uchwycić je za gardło i powalić na ziemię, a wystrzegając się kopyt konia, również jak rogów wołu. Jest bardzo przebiegły i wytrwały: może biedz bardzo długo, niosąc zdobycz w zębach.

Wilk jest dość rozpowszechniony w Europie, na Węgrzech, w Galicji, w Rosji i Skandynawji, w Alpach i Pirenejach, w górach Ardeńskich i Wogezach, w północnej Ameryce, północnej Afryce, Azji środkowej i północnej. W stepach odbywają swoje łowy gromadnie. Wilki podlegają wściekliwości, narówni z psami.

38. **Szakal** (*Canis aureus*), (Tab. I, fig. 14), pod względem budowy ciała bardzo jest zbliżony do lisa. Sierść ma ciemno-czerwonawo-żółtą, na brzuchu białawą.

Mieszka w Azji i Afryce północnej, spotyka się wszakże w Europie południowo-wschodniej: w Grecji i Turcji. Wycieczki po zdobycz rozpoczyna w nocy; jak hijena krąży dookoła stad i mieszkań ludzkich, a w braku żywej zdobyczy zadawalnia się padliną. Szakal nie poprzestaje na własnej zdobyczy: czuje on, gdzie może być sposobność pożywienia się resztkami cudzej uczty i idzie w ślad, czy to za myśliwym, czy za większym drapieżnikiem lub rabusiem stad, czekając cierpliwie na swoje okruchy. Gérard podczas swoich polowań na lwy często widywał szakala, który przez całą noc za nim się włóczył. „Szedł za mną, gdy ja szedłem, zatrzymał się, gdym stanął, w odległości nie większej nad dwadzieścia kroków i wydawał charakterystyczny swój głos. Przy polowaniu na lwy szakal był mi bardzo pożyteczny, zwłaszcza jeżeli śledziłem lwa, który nie ryczy, gdyż skomlenie szakala niejednokrotnie pozwalało mi bez opuszczania wierzchołka pagórka przez całą noc rozpoznawać kierunek drogi lwa i dowiadywać się, jakie wioski oszczędzał, w jakich się obłowił i dokąd rankiem się udał.

39. **Lis** (*Canis vulpes*), (Tab. I, fig. 15), ma gęstą, miękką sierść, na grzbiecie czerwonawą, na brzuchu białawą. Ciało jego dosięga długości 70 cm. Ogon jest puszysty, zakończony biało. Lis jest pospolity w całej Europie, w północnej Ameryce, oraz w północnej Azji i Afryce. Jest on mieszkańcem lasów, gdzie parami zamieszkuje nory. Legowisko jego ma zawsze kilka wyjść; często korzysta on z wykopanej przez borsuka nory, wypędziwszy go z niej.

Cała okolica: pole, łąka, zarośla, mokrzary, jest miejscem jego łowów. W drapieżności nie ustępuje wilkowi. Poluje na zające, kury, gęsi i kaczki, nawet na ryby, niszczy też sporą ilość myszy.

Lis występuje w najrozmaitszych bajkach i opowieściach, jako pierwowzór chytryści. Umie bo też w każdym położe-

niu znaleźć nowe sposoby i powściągnąć dawne przyzwyczajenia dla zadowolenia apetytu. Zawsze wietrzy, zna wszystkie kąty, płoty i drożyny, a każde przebyte niebezpieczeństwo przechowuje w pamięci. Do nieznanych przedmiotów zbliża się z największą ostrożnością. Daje się schwytać tylko w nieznaną sobie pułapkę: skoro raz już jej doświadczył, umie zwęszyć żelazo i wyciągnąć przynętę, nie narażając się na niebezpieczeństwo. Jest przytem niezwykle wytrwały; obsaczony w swoim legowisku, znosi chętnie najsurowszy głód, zanim wyjdzie z nory. A trudno go nawet zabić: często umyka wtedy, gdy jako nieżywego pozostawia na miejscu, nie traci bowiem nigdy przytomności umysłu. Gdy go ścigają zbyt natęczywie, porzuca legowisko i przenosi się w inne miejsce. W najtrudniejszym położeniu umie wymknąć się myśliwym; przeskakuje mury wysokie na 2 $\frac{1}{2}$ metra. Jest bardzo przywiązany do swych małych i dla nich naraża się na niebezpieczeństwa, zapominając o zwykłej przeczności. Tschudi tak opisuje wychowanie młodych lisiąt.

„W początkach maja można znaleźć w norze od pięciu do dziewięciu małych, wielkości małego szczura, jeszcze ślepych, czarnych z grubemi pyszczkami lisiąt, które matka starannie pielęgnuje. Po kilku tygodniach wyprowadza ona z nory żółte już teraz szczenięta, bawi się z nimi, przynosi im ptaszki, jaszczurki, żaby, koniki polne, myszy, młode zajączki i uczy je tę zdobycz łowić i pożerać; samiec zaś wcale rodziną się nie zajmuje. Gdy małe dorosną do połowy wielkości kota, lubią z rana i wieczorem bawić się przy wejściu do nory, oczekując powrotu rodziców. Nie tak łatwo udaje się podpatrzeć igraszki lisiej rodziny. Samica jest nadzwyczajnie czujna i za najmniejszym podejrzanym szelestem kryje się do nory, znosząc szczenięta w pysku, albo zwołując je cichem skomleniem. Już w lipcu młode lisięta odważają się na samodzielne wyprawy i starają się o zmroku schwytać zajączka lub wiewiórkę, napaść w gnieździe na jarzabka, kuropatkę lub przepiórkę, a przynajmniej mysz; najmniejsze poprzestają na robakach i świerszczach. Zachowują się wtedy zupełnie na podobieństwo starych: długi śpiczasty pyszczek pilnie wietrzy po tropie; delikatne uszki podniesione są do góry, małe, szaro-zielone ukośne oczki bystro patrzą dokoła; miękka, puszysta kita wlece się po śladach cicho stąpających łapek. Czasem młode zwierzątko staje przednimi łapkami na kamieniu i rozgląda

się dokoła, czasem przypadnie w krzaku, oczekując powrotu gnieźdzących się tu ptaków, lub podstępnie udając obojętność, pilnuje krzątania się myszy. W jesieni młode opuszczają macierzystą norę i pędzą życie pojedynczo we własnych jamach.”

40. **Piesiec** (*Canis lagopus*) (fig. 56), bardzo zbliżony do lisa, zamieszkuje najzimniejsze kraje północy. W lecie ma sierść szarą, w zimie białą z niebieskawym odcieniem, stanowiącą bardzo cenne futro. Kopie długie na 10 metrów nory w śniegu, które wewnątrz wyścieła mchem. Jeden z uczestników wyprawy biegunowej, opowiada o nich:




Fig. 56. Piesiec.

„Pieśce wdzierały się do naszych mieszkań we dnie i w nocy i kradły wszystko, co tylko mogły pochwycić, a tak zręcznie umiały wydobyć nieraz nawet kilkadziesiąt funtów mięsa z naszych beczek, że trudno było uwierzyć, iż zrobiły to zwierzęta. Gdyśmy byli zajęci zdejmowaniem skóry z jakiego zabitego zwierzęcia, zdarzało się, żeśmy zakłuwali nożami kilka z tych lisów, wrywały nam bowiem mięso z rąk. Gdyśmy zakopali cokolwiek w ziemi i założyli kamieniem, nie tylko znalazły to miejsce, ale odwalały kamienie, popychając je łapkami, zupełnie jak ludzie, i pomagając sobie wzajemnie. Jeśli umieszczano jakiś przedmiot na słupie, wtedy podkopywały słup, dopóki nie upadł, albo jeden z nich wdrapywał się ze zręcznością małpy na szczyt i zrzucał znajdujące się tam przedmioty... Gdyśmy się pokładli, udając śpiących, wtedy obwąchiwały nas dla przekonania się, czy żyjemy, a gdyśmy zatrzymali oddech, gotowały się do odgryzania nam nosów lub uszu. Każdego rana można było widzieć te bezczelne zwierzęta, uwijające się między lwami i niedźwiedziami morskimi i węszące, czy niema między śpiącymi nieżywych. Znalazłszy trupa, brały się natychmiast do płatania go i do unoszenia kawałków. Ponieważ lwy morskie często we śnie przygniatają swoje potomstwo na śmierć, więc lisy co rano pilnie przeglądają ich stada i unosiły nieżywe małe.”

41. 4. Łasze czyli Wiwery.

Do tej nielicznej gromady należy **Wiwera Zybeta** (*Viverra zibetha*) (fig. 57), ciałem podobna do kota, a z pyska do kuny; w Indiach utrzymują ją jako zwierzę domowe, aby parę razy tygodniowo wyciskać z gruczołków jego wonną wydzielinę, której używają do fabrykacji perfum.



Fig. 57. Wiwera.

Ichneumon czyli **szczur faraona** (*Herpestes ichneumon*), (Tab. I, fig. 16), mieszka w Afryce. Sierść ma zielonawo-szarą, na głowie i grzbiecie nieco ciemniejszą; ryjek krótki, ogon zakończony czarną kitką. Czczony był przez Egipcjan starożytnych.

Żywi się szczurami, myszami, kretami, żabami i węzami; również jajami ptasiemi. Jest bardzo drapieżny.

42. 5. **Kuny**. Należą tu przeważnie zwierzęta, dające cenne futra. Są dzikie, złośliwe i krwiożercze, chociaż nie duże.

Głównym ich przedstawicielem jest **Tumak** czyli **kuna leśna** (*Mustella martes*), o ciele jak wszystkie kuny gibkiem, zręcznym, krótkich nóżkach i ogonie puszystym. Futro ma gęste, sierść żółto-brunatną, na szyi białą lub żółto-czerwonawą plamę. Zamieszkuje Europę i Azję zachodnią; trzyma się lasów, za legowisko obierając dziuple drzew.



Fig. 58. Kuna domowa.

Wyrządza w zwierzynie znaczne szkody, bo żywi się użytecznym ptactwem, prześladuje też często wiewiórkę, która, dostrzegłszy wroga, szybko umyka na drzewo; tumak biegnie za nią, lecz skoro już ma ją pochwycić, wiewiórka rzuca się z wielkiej wysokości na ziemię, rozstawiając swoje cztery łapki i ogon. Na skok taki nie może się zdecydować prześladowca, a zanim zbiegnie na dół, wiewiórka już zdążyła ukryć się w gąszczu lasu.

Kuna kanadyjska (*Mustella canadensis*) mieszka w Ameryce północnej; jest największa ze wszystkich kun.

Kuna domowa (*Mustella foina*) (fig. 58), gnieździ się w pobliżu mieszkań ludzkich; niebezpieczna jest zarówno dla drobiu, jak i dla jaj. Również szkodliwy jest **Tchórz** (*Mustella Putorius*) (fig. 59), który żyje w podobnych miejscach i w ten sam sposób się żywi. Niszczy wszelkie ptactwo.



Fig. 59. Tchórz.

Łaska (*Mustella vulgaris*), jest czerwono-brunatna na grzbiecie, z białawym brzuszkiem, nie większa nad 16 centymetrów. Żywi się przeważnie szczurami i myszami, jaja bardzo lubi i unosi je pod brodą.

Gronostaj (*M. erminea*) (fig. 60), skórę ma w zimie białą, bardzo cenioną na futra; stanowi on klimatyczną odmianę łasicy. Najcenniejsze futro daje **Soból** (*M. zibellina*) (fig. 61), mieszkający w północnej Azji.



Fig. 60. Gronostaj.

Kuny należą do najmniejbezpieczniejszych wrogów drobiu; są one nadzwyczajnie ściśliwe i mogą przedostać się przez najwęższy otwór, aby tylko zdołały przecisnąć głowę. Skoro zaś tchórz lub kuna wręci się do kurnika, nie zazna spoczynku, dopóki nie zadusi wszystkich kur lub gołębi. Opiwszy się cieplej krwi, unosi tylko jedną sztukę z sobą.

43. Wydra pospolita (*Lutra vulgaris*) (fig. 62) sierść ma krótką, na grzbiecie ciemno-brunatną, na brzuchu jaśniejszą. Głowa płaska, oczy i uszy małe. Ciało ma 80 cent. długości, ogon 40; pomiędzy palcami ma płetwy.



Fig. 61. Sobol.

Jestto stworzenie zręczne i mądre. Żyje przeważnie w wodzie; na lądzie jest niepewna siebie i niezaradna, w wodzie przeciwnie—zwinna i wytrwała.

Żywi się przeważnie rybami i rakami, a ostrość zmysłów wiele jej w tem dopomaga. Trudno ją widzieć, gdyż wy-

cieczki swe wykonywa przeważnie w nocy; w zimie wszakże można ją wytropić po śladach, prowadzących do zamarzniętych miejsc rzeki lub jeziora.




Fig. 62. Wydra.

Polują na nią tak z powodu znacznych szkód, jakie w stawach i rzekach wyrządza, jak i dla cennego futra.

Następujące zwierzęta zajmują stanowisko pośrednie między kunami a niedźwiedziami:

44. Borsuk czyli jaźwiec (*Meles tarus*), posiada futer-

ko szaro-brunatne z dwiema białymi pręgami wzdłuż głowy i szyi (fig. 63), postawy niezgrabnej, na krótkich nogach, żyje sobie spokojnie w lasach, w pobliżu pól lub winnic, w no-



Fig. 63. Borsuk.

rach, które sobie sam ryje; do legowiska, leżącego $1\frac{1}{2}$ metra pod ziemią, prowadzi 6—8 kurytarzy. W dzień zwykle śpi, w nocy idzie na polowanie. Pożywienie jego stanowią owady, robaki, ślimaki, zaby, węże, jaja ptasie i pisklęta, również ma-

łe zające, króliki, także jagody, owoce, korzenie i miód. Jest on bardzo dbały o czystość swego legowiska. Czasami musi je dzielić z lisem, albo mu je zupełnie odstąpić.

Borsuk jest przezorny i broni się odważnie w swojej norze. Polują na niego głównie dla skóry; z sierści robią pędzle. Na zimę borsuk kryje się w norze, gdzie odbywa drzemkę, przerywaną od czasu do czasu.



Fig. 64. Śmierzdiel.

45. W Ameryce północnej znajduje się zwierzątko, zwane Śmierzdzielem czyli skunksem (*Mephitis Chinga*) (fig. 64), o sierści puszystej, czarnej z białym pasem na grzbiecie. Jest to zwierzę nocne, zbliżone do borsuka sposobem życia i budową

ciała. Oryginalny jest sposób jego obrony: śmierzdel ma dwa gruczołki przy nasadzie ogona, wytryskujące ciecz tak straszliwej woni, że niema człowieka, ani zwierzęcia, któreby mogło je znieść. To też śmierzdel nie ucieka, tylko spokojnie oczekuje zbliżenia się wroga, pewny swego środka obronnego.

Futro jego jest cenione, a Indianie polują na śmierzdiele w ten sposób: długimi prętami drażnią zwierzę, dopóki nie wyrzuci całego zapasu cieczy, potem chwytają je za ogon i zabijają uderzeniem w głowę.

46. Na północy Europy, Azji i Ameryki mieszka **Rosomak** (*Gulo borealis*) (fig. 65), zwierzę nie dłuższe nad 75 cm., ale dzikie i zuchwałe. Czatuje on na renifery i rzuca się na nie znienacka; w ciągu jednej nocy dusi czasem kilka reniferów, aby opić się ich gorącej krwi. Skóra jego służy na futra.



Fig. 65. Rosomak.

47. 6. Niedźwiedzie.

Szop (*Procyon lotor*) (fig. 66), długość ciała wynosi 95 cm., ogona—25. Futro szaro-czarniawe, na grzbiecie ciemniejsze; mieszka w Ameryce północnej, żywi się owocami, jajami ptasiemi i t. d. Ma zwyczaj płókania w wodzie i wycierania przednimi łapkami pokarmu przed jego spożyciem. Mięso jego jest



Fig. 66. Szop.

jadalne; skóry stanowią przedmiot handlu, tak, że corocznie przywożą ich do $1\frac{1}{2}$ miliona; sierść idzie na pędzelki. Łatwo oswaja się, trzymają go też po domach, figluje bowiem jak mały kotek. Jest ciekawy i wesoły; włączając na drzewa lubi się bawić, huścić i t. p. Gnieździ się w spróchniałych drzewach. Polowanie na szopa tak opisują: „Skorośmy go wysłedzili, wtedy w krótkim czasie stawał się naszą zdobyczą. Za pomocą małego topora robiliśmy dziurę w drzewie, dosyć dużą, aby przez nią wetknąć pęczek zapalonej suchej trawy.

potem dokładaliśmy suchych liści i badyli w celu podsyce-
nia ognia, wydającego gęsty obłok dymu. Jeśli w drzewie
znajdował się szop albo inny jaki zwierz, to już po kilku
minutach wytykał głowę przez otwór pnia w górze, aby za-
czerpnąć świeżego powietrza; duszący dym jednak nie usta-
wał i biedne zwierzę chroniło się na gałąź, gdzie je dosię-
gały kule lub strzały z łuków.”

48. Największym zwierzęciem mięsożernem jest **Niedź-
wiedź biały** (*Ursus maritimus*) (Tab. II, fig. 2), o głowie
podługowatej; futro kudłate, zupełnie białe. Długością do-
sięga 2½ metra, a wagą 15—16 centnarów. Mieszka w pół-
nocnych stronach Europy, Azji i Ameryki. Jest zarówno
zwinny na lądzie, jak i na morzu. Straszny to drapieżnik,
napadający nawet na człowieka. Odbywa on wycieczki po
niezliczonych wyspach lodowych oceanu Północnego. Głównie
pożywienie jego stanowią ryby i foki, dla złowienia któ-
rych potrzeba zręczności i wy-
trwałości. Gdy się przypadko-
wo posunie dalej na południe,
napada i na zwierzęta lądowe.



Fig. 67. Niedźwiedź biały, napa-
dający na łódkę.

Niedźwiedź biały żyje wśród
wiecznych śniegów i tylko nie-
zmordowaną pracą zdobywa so-
bie pożywienie, wypływa na
krach na otwarte morze, w któ-
rem szuka zdobyczy. Mięso je-
go jest jadalne; tłuszcz służy
za pożywienie i jako materiał
opałowy; skóra daje posłanie
pod nogi i pokrycie do sani.

49. **Niedźwiedź brunatny** (*Ursus arctos*) (Tab. II, fig. 1),
jest głównym przedstawicielem wielkich niedźwiedzi. Długi
na 2 metry, pokryty kudłatą brunatną sierścią, wśród któ-
rej ginie krótki, kosmaty jego ogonek, niedźwiedź ten odznacza
się niezgrabnymi ruchami i ciężką napozór postacią. Dawniej
zamieszkiwał całą Europę, ale wraz ze zniszczeniem lasów
znikł i niedźwiedź; dziś znajduje się tylko w górach Europy
i na północnym lądzie Azji, także w Himalajach. Żywi się
jagodami, korzonkami, orzechami, miodem i mięsem. Zimą
spędza w śnie, który zresztą bywa niekiedy przerywany, a na-
gromadzony w lecie tłuszcz służy do częściowego odżyw-
iania organizmu. Pomimo pozornej niezgrabności, niedźwiedź

szybko zrywa się na nogi i z łatwością dościga człowieka, a nawet konia. Niedźwiedź zwykle unika człowieka, ale napastowany broni się odważnie i jest niebezpiecznym przeciwnikiem. Staje wtedy na tylnych łapach, a jednym uderzeniem przedniej łapy zabić może człowieka na miejscu. Wśród plemion syberyjskich niedźwiedź budzi strach połączony z czcią. Nie nazywają go nigdy po imieniu, a gdy zabiją, spełniają pewne obrządki ku przebłaganiu jego cienia.

„Gdy mężczyźni są na łowach, kobiety zbierają się w jurcie jednego z myśliwych, a skoro spostrzegą wracających ze zdobyczą, rozpoczynają pieśń o niedźwiedziu. Gdy ten śpiew się skończy, i myśliwi są już ze zdobyczą u progu, kobiety zamykają drzwi przed nimi i osypują ich obelgami na cześć zabitego niedźwiedzia. Myśliwym nie zostaje nic innego, jak przebić nowy otwór i tamtędy wdrzeć się do jurty. W ten sposób cienie ofiary zostają przebłagane.”

Po odjęciu mięsa, kości niedźwiedzia starannie składają i zakopują.

50. **Niedźwiedź szary** (*Ursus ferox*) jest mieszkańcem Ameryki północnej, mianowicie gór Skalistych. Straszne to zwierzę niebezpieczne jest dla człowieka; ogromnego wzrostu, gdyż dochodzi do 2½ metra długości, posiada niezwykłą siłę i potężną broń w postaci ostrych, zakrzywionych pazurów, mających około 13 cm. długości. Futro jego siwo-brunatne nie ma wielkiej wartości.

51. Mniejszy i mniej drapieżny jest **czarny amerykański niedźwiedź** (*Ursus americanus*) (fig. 68) zamieszkujący te same miejscowości, co i poprzedni. Żywi się przeważnie korzonkami, owocami, jagodami i miodem pszczoł leśnych; także mniejszymi zwierzątkami, ptakami i ich jajami. Bardzo jest zręczny i ostrożny i to go nieraz gubi; chcąc bowiem rozejrzeć się po okolicy, wspina się na tylne łapy i wystawia z krzaków głowę, którą właśnie wtedy myśliwy bierze na cel. Indianie nazywają go „babcią” i czczą go tak, jak Laponczycy niedźwiedzia brunatnego, a zabiwszy, tysiąckrotnie go przepraszają.





Fig. 68. Niedźwiedź czarny amerykański.

Rząd VI. Workowate.

52. Zwierzęta, należące do tego rzędu, mają cechę wspólną: posiadają pod brzuchem fałdy skóry w kształcie worka, w którym przez pewien czas noszą swoje młode; żywią się w najrozmaitszy sposób, a stosownie do tego mają rozmaite uzębienie. Są między nimi mięsożerne, owadożerne, trawożerne i korzeniożerne. Zwierzęta te żyją przeważnie w Australji, niektóre w Ameryce; na starym lądzie wcale ich niema.

53. Największem zwierzęciem tego rzędu jest **Kangur olbrzymi** (*Macropus giganteus*), długi na $1\frac{1}{2}$ metra, z ogonem, wynoszącym 70 cm. (Tab. II, fig. 3). Mieszka w Australji, na równinach i w rzadkich zaroślach. Sierść jego miękka i kędzierzawa jest z wierzchu brunatna, pod spodem siwa. Tylnie nogi 5 razy dłuższe od przednich, pozwalają mu wykonywać olbrzymie skoki, przyczem pomaga sobie długim, silnym ogonem, który w spokoju służy mu jak trzecia noga. Cała rodzina trzyma się zwykle razem. Żywi się trawą i liśćmi drzew. Kangur nie ma nieprzyjaciół wśród zwierząt, oprócz psa dzikiego, Dinga; za to człowiek tępi go dla mięsa. Polowanie odbywa się w taki sposób: Bystre oko Australczyka przegląda całą okolicę, i nic nie ujdzie jego uwagi. Nagle dziki człowiek staje nieruchomo i wszystko w nim skupia się we wzroku i słuchu. Żony jego, idące za nim w pewnej odległości, wiedzą, że kangur jest w pobliżu i natychmiast padają na ziemię. W odległości jakich stu kroków, siedzi kangur na tylnych nogach i na ogonie, z krótkimi przednimi łapkami zwisłemi na dół, z uszami nastawionemi, któremi strzyże jak nasze zwierzęta. Śledzi on i wypatruje, podobnie jak Australczyk. Ten jednak wcale się nie rusza; nie można rozróżnić, czy to jest istota ludzka, czy pień drzewa: łowiec i zwierzę pozostają przez kilka minut w takiej nieruchomej postawie. Kangur wreszcie się uspakaja, opuszcza przednie łapki, robi kilka niezgrabnych skoków i pasie się dalej. Lecz Australczyk nie porzuca nieruchomej swej postawy, dopóki zwierzę, powtórzywszy parę razy objawy czujności, nie ubezpieczy się zupełnie. Wtedy dopiero dziki bierze oszczep do ręki i podnosi ramię w kierunku zwierzęcia, zbliżając się powoli i ostrożnie ku niemu. Spostrzegłszy, że kangur się ogląda, znowu staje nieruchomy,



dopóki zwierzę znowu paść się nie zacznie, i to powtarza się po kilka razy, dopóki świszczący oszczep nie uwięźnie w boku zwierzęcia. Wtedy w zaroślach rozlega się wrzask kobiet i dzieci, biorących udział w polowaniu. Kangur osłabiony wpływem krwi i nie mogąc się pozbyć długiego oszczepu, który mu w ucieczce zawadza, usiłuje nareszcie bronić się, oparty grzbietem o drzewo i wysuwając przednie łapy, aby nimi pochwycić wroga, a potężnymi pazurami tylnych nóg zadać mu niebezpieczny cios. Ostrożny Australczyk nie naraża się wszakże na to niebezpieczeństwo, ale dobija zwierzę zdaleka, ciskając w nie ponownie oszczepem...

Biali polują na kangura z silnymi psami, umyślnie do tego celu układanemi; osadzony przez psy kangur bywa dla nich niebezpieczny, zwłaszcza, gdy schroni się do wody: wysokość jego, gdy stanie na tylnych łapach, pozwala mu stać na dnie wtedy, gdy pies już musi płynąć; pochwyciwszy więc psa przednimi łapami, zanurza go w wodę i topi.

54. Do drapieżnych workowatych należą **Dydelfy**, wśród których **Opossum** (*Didelphis virginiana*) znajduje się w Ameryce; żywi się ptactwem i niszczy drób kolonistom; w braku pożywienia mięsnego zadawalnia się i roślinnym. Dydelf, nie mając należycie rozwiniętej torby, nosi swoje małe na grzbiecie, uczepione ogonami do ogona matki (fig. 69).



Fig. 69. Dydelf.

Największym z workowatych drapieżnych jest **Wilk torbac** (fig. 70), żyjący w Australji; wielkością dorównywa szakalowi, żywi się małemi zwierzętami. **Wombat** (*Phascodomys fossor*) przypomina małego niedźwiedzia; ma wielkość borsuka. Wombat jest niezgrabnym, ponurem, na wszystko obojętnym zwierzęciem. Okryty gęstą brunatną, czasem żółtawą lub siwą sierścią, biega na swych szerokich, nagich podszewkach, zawsze w prostym kierunku, z którego nie zbacza nigdy, pomimo napotykaných przeszkód. Daje się łatwo złapać i oswoić.



Fig. 70. Wilk torbac.

Rząd VII. Gryzonie.

55. Są to małe zwierzątka, ale za to bardzo liczne. Odznacza je szczególniejsza budowa zębów: dwa przednie, zwane gryzącymi, są tak długie, że wargi często ich nie zakrywają; rosną one ciągle od korzenia, tak, że odnawiają się w miarę zużycia; kłów gryznie wcale nie mają, a trzonowe oddzielone są od przednich wielką przerwą (fig. 71). Żywią się przeważnie pokarmem roślinnym, niektóre składają zapasy na zimę.



Fig. 71. Zęby gryzonia.

56. **Wiewiórka** (*Sciurus vulgaris*) (fig. 72), jest powszechnie znanym miłym zwierzątkiem, zamieszkującym lasy nasze, zwłaszcza iglaste. Wiewiórka jest wszędzie rozpowszechniona, prócz okolic podbiegunowych i Australji. W lecie jest z wierzchu rudobrunatna, pod spodem biała. W zimie zmienia swoje czerwono-brunatne futerko na popielate; skórki zabitych w zimie wiewiórek syberyjskich są to znane **Po-**



Fig. 72. Wiewiórka.

pielice. Rzadsze są wiewiórki zupełnie ciemne lub całkiem białe. Ogon zwierzątka jest długi, puszysty, uszki zaś ozdobione pędzelkami dłuższych włosów.

Wiewiórka jest w ciągłym ruchu: od samego rana plądruje po lesie, to wdrapując się na drzewa, przeskakując z gałęzi na gałąź, lub schodząc na ziemię; a gdy ostreimi ząbkami gryzie orzeszki,—uszki jej strzygą i czujne oczy rozglądają się dokoła,

aby przy najmniejszym niebezpieczeństwie zwierzątko zdążyło wdrapać się na wierzchołek drzewa. Gniazdo urządza sobie najczęściej z opuszczonego gniazda wrony lub innego ptaka, lecz dodaje do niego sklepienie i zostawia otwór do wejścia z boku. Tu spędza godziny największego upału; podczas zaś stałej słoty zatyka otwór gniazda i wychodzi do-

piero, gdy głód ją zmusi do tego. Przez całe lato zbiera zapasy orzechów, buczyny i t. p., które składa w dziuplach drzew, pod korzeniami nieopodal od gniazda. W zimie nie zasypia, lecz pędzi życie nieczynne, żywiąc się zebranymi zapasami. Prócz orzechów i nasion żywią się wiewiórki drobnymi ptaszkami i jajami.

Wiewiórka latająca czyli **Polatucha** (*Pteromys volans*), jest bardzo podobna do wiewiórki, ale ma między przednimi a tylnymi łapkami skórę rozpostartą, która służy jej za spadochron i ułatwia bardzo dalekie skoki.



Fig. 73. Bobak.

57. Do grupy gryzących należy **Bobak** czyli **Świstak** (*Arctomys marmota*) (fig. 73). Jest to zwierzątko dosięgające $\frac{1}{2}$ metra długości i zamieszkujące Alpy, Karpaty i Pireneje, trzymając się przeważnie słonecznych skłonów gór, pomiędzy granicą lasów, a linią wiecznych śniegów. Bobak ma gęstą, grubą sierść, barwy z wierzchu ciemno-brunatnej, z boku żółtawo-szarej, pod spodem zaś czerwono-brunatnej. Zwierzątka te mieszkają gromadnie w zagłębieniach skał i żywią się ziołami alpejskimi. Są bardzo ostrożne i, dostrzegłszy niebezpieczeństwo, umykają śpiesznie do swych nor. Myśliwy, który poluje na nie dla skórki, mięsa i tłuszczu, musi długo czatować, nim je dostrzeże. W dzień wyłazą zwykle z nory, a najadłszy się, udają się na obrane miejsce, dla wygrzewania się na słońcu, do czego im służy szeroki, płaski kamień. Miejsce to spoczynku znajduje się zawsze w pobliżu nory, i łatwe jest do rozpoznania, ponieważ i kamień i droga do niego wiodąca, od ciągłego używania są wygładzone. Czas im schodzi na spoczynku i igraszkach. Co chwila stają na łapkach, oglądają się na wszystkie strony, gładzą sierść swoją, wesoło igrając z sobą. Starsze tymczasem pilnie przeglądają okolicę. Skoro tylko ujrzą coś podejrzanego, lisa, drapieżnego ptaka, człowieka, chociażby nawet w wielkiej odległości, pierwszy bobak, który je zobaczył, wydaje głośne, przeciągłe gwizdnięcie przez zęby. Dopóki nieprzyjaciel znajduje się daleko, gwizdanie to powtarza się ciągle. Wszystkie świstaki w okolicy ostrzeżone tem hasłem mają się na baczności i wydają podobne gwizdanie. Gdy

przedmiot przyczyniający obawę wykonywa jaki gwałtowny ruch, świstaki chowają się do nory.

Zimą bobaki spędzają w głębszych norach; cała rodzina, złożona z kilkunastu sztuk, zapada w letarg, w którym zwinęte w kłębki, z nosami ukrytymi w ogonach, śpią aż do wiosny. Przytem oddychanie jest tak osłabione, że nawet niewiele tracą ze swego tłuszczu przez zimę.

58. Do rodziny świstaków należy i **Suseł** (*Spermophilus citillus*) (fig. 74); małe to zwierzątko z wierzchu żółtawo-



Fig. 74. Suseł.

szare z ciemniejszymi falistemi pręgami, ze spodu jaśniejsze, żywi się latem trawami, korzonkami i zielonym zbożem. Żyje gromadnie w norach, które mu służą i za spiżarnię. Schwytyany łatwo się oswaja. Na swobodzie wzbudza ciekawość swoim zachowaniem się. Nagle ukazuje się z pod ziemi, staje na tylnych łapkach, rozgląda się i równie nagle szybko znika. Gdy sądzi, że niebezpieczeństwo już minęło, ukazuje się

znowu, staje na łapkach i znów szybko znika, albo bieży ubitą ścieżką do innej nory. Posiada przytem oddzielne mieszkanie na zimę, w którym znaleźć można około 20 zwierzątek, skupionych razem i ogrzewających się wzajemnie. Podobnie jak bobaki alpejskie, susły ostrzegają się o niebezpieczeństwie donośnem gwizdaniem.

59. Do innej gromadki należy **Bóbr** (*Castor fiber*) (fig.



Fig. 75. Bóbr.

75), 80 cm. długi; głowę ma płaską, nogi krótkie; w Europie jest on prawie zupełnie wytępiony, chociaż dawniej żył tu w obfitości, jak świadczą nazwy rozmaitych miejsc; w Ameryce jeszcze dość obfity; futro jego z wierzchu brązowe, ze spodu nieco jaśniejsze, bardzo jest cenione. Ogon ma nagi, płaski i łuskowaty; posługuje się nim przy swoich budowlach wodnych. Palce tylnych nóg złączone są błoną. Mistrz

w sztuce budownictwa, „zamki” swoje, nieraz do 15 metrów

długie i do 3 metrów wysokie, buduje bóbr w wodzie. Składają się one z piętra wznoszącego się nad wodą i zbudowanego z gałązek i pni drzew, ogryzionych z kory i spojonych gliną; dół znajduje się pod wodą i tamtędy wchodzi się do mieszkania. Bobry żyją gromadnie, a mieszkania ich tworzą prawdziwe wioski. Ażeby poziom wody utrzymać przez całe lato na takiej wysokości, iżby wejścia do mieszkań zostawały pod wodą, budują one poniżej swej wioski tamę, wysoką na 1—2 metrów, a długą nieraz na paręset metrów, tworzącą z rzeki rodzaj stawu. Przytem groble te są tak zastosowane do siły i kierunku prądów rzeki, jak gdyby były obliczone przez inżynierów. Za narzędzie do budowania służą bobrom przednie łapy i zęby, które podcinają pnie grube na stopę. Prace około grobli wykonywają gromadnie; bierze w nich udział cała wioska.

„Nadbrzeżne drzewa, mające więcej niż stopę średnicy, podgryzają tak umiejętnie, że spadają one do wody. Inni robotnicy są już w pogotowiu do oddzielenia od pnia gałęzi i odgryzienia części pnia trzymającej się brzegu, aby potem całe drzewo bez przeszkody spławić na odpowiednie miejsce. Tam znajdują się już inni robotnicy, których zadaniem jest spławiony kłoc utwierdzić na miejscu kołkami z gałęzi i szlammem. Ciągłe przybywa materiał umiejętnie gromadzony i układany, aż wreszcie grobla jak mur wznosi się nad poziom wody; na nią włączają robotnicy i szerokiemi ogonami, jakby murarskimi kielniami gładzą i ubijają dla nadania jej większej mocy. Dopiero po ukończeniu tych publicznych robót, biorą się pojedyncze rodziny do budowania własnych chat. Ponad wodą znajduje się obszerna komora dla wypoczynku, z której, w razie niebezpieczeństwa, przez dolne piętro uciekają, szukają schronienia w wodzie. Mądre te zwierzęta, siedząc w swych chatach, rozpoznają wysokość poziomu wody: skoro nastąpi przybór wskutek ulewnych deszczów lub z innej jakiej przyczyny, wówczas kilka bobrów udaje się na groblę w celu rozszerzenia otworu, dającego odpływ wodzie, lub przeciwnie, gdy wskutek długotrwałej suszy stan wody się obniży, wówczas otwór zmniejszają albo też całkiem zatykają. W ten sposób przedstawiają bobry obraz społeczeństwa, żyjącego w zupełnej harmonji. Wszakże objawy tej wysokiej zmyślności znikają, skoro zwierzę zostaje osamotnione; mieszka wtedy na brzegu rzeki, w norze, którą sobie wykopuje. Tylko bowiem połączone usiłowania

wielu mogą wytworzyć te zadziwiające budowle. Bóbr pojmany za młodu, łatwo się oswaja i przyzwyczaja do człowieka. Woda jest jego żywiołem; na lądzie jest bezbronny. Jest on bojaźliwy, z domu wychodzi dopiero wieczorem; żywi się korą i różnemi roślinami. Na zimę robi wielkie zapasy z młodych topoli, wierzbi i innych drzewek, które podgryza, ściaga do wody i na dnie przymocowuje. Cennym był *strój bobrowy*—ciecz, którą bóbr wydziela z osobnych gruczołów, używana jako lekarstwo.”



Fig. 76. Nornica polna.

60. Osobliwą gromadę wśród gryzoniów stanowią **Nornice** czyli **Polniki** (*Arvicola*).

Do nich należy **Leming** (*Myodes lemmus*) (fig. 77), mieszkający na dalekiej północy, w Skandynawji, i żywiący się mchem reniferów, który wygrzebuje z pod śniegu. Gdy następują suche lata, brak pożywienia zmusza lemingów do wędrówek, które odbywają ogromnemi masami i podczas takiej wędrówki niszczone bywają przez ptaactwo drapieżne, lisy, niedźwiedzie, kuny i t. d.



Fig. 77. Leming.

61. Do tej samej gromadki należą także myszy i szczury.

Mysz domowa (*Mus musculus*) (Tab. I, fig. 13), zgrabne zwierzątko, jest stałym towarzyszem człowieka, żywi się jego zapasami i urządza swoje mieszkania w domach ludzkich.

Mysz polna (*Mus agrarius*) (fig. 78)), z powodu, że jest nadzwyczajnie mnożną (jedna para miewa w ciągu roku do 40 młodych), czyni ogromne spustoszenia w polach i śpichrzach. Co prawda, gdyby nie ta mnożność, to mysz rodzaj jużby dawno wyginął, bo prawie niema zwierzęcia, któreby tak jak one służyło za pokarm innym. Lis i łaska, tchórz i kuna, gronostaj, sowy, sokoły, wrony, węże i wiele innych drapieżców, codziennie polują na myszy i temi łowami przysługują się rolnikowi.




Fig. 78. Mysz polna.

Podobnie żywi się i wśród pól zbożowych mieszka **Mysz drobna** (fig. 79), najmniejsza ze wszystkich. Ładne to zwierzątko, długie na 4 cm., nie żyje w norach, lecz, jedyne z pomiędzy zwierząt ssących, buduje sobie bardzo kunsztow-

ne kuliste gniazdko, wśród traw i ziół, miętko puchem traw wysłane. Biega ona po źdźbłach z wielką zręcznością, dopomagając sobie ogonkiem, którym się o nie okręca. Pływa doskonale. Na zimę zasypia.



Fig. 79. Mysz drobna.

62. Najgorszym wszakże szkodnikiem jest **Szczur domowy** (*Mus rattus*), również wszędzie ciągnący za człowiekiem. Ukazał się on w Europie w większej liczbie około XII stulecia, a następnie zawędrował na okrętach do innych części świata, gdzie się nadzwyczajnie szybko rozmnożył. Żywi się wszystkim i gryzie wszystko; przegryza grube belki, a nawet wgrzyza się żywym zwierzętom w ciało. Dziś jest on już w Europie rzadszy, gdyż wyrugował go i miejsce jego zajął silniejszy i większy **Szczur wędrowny** (fig. 80). Wyszedł on w ogromnej ilości z Azji, po wielkiem trzęsieniu ziemi w r. 1727, mianowicie z krajów leżących nad morzem Kaspijskiem, a przepłynąwszy Wołgę, szerzył się stopniowo po całej Europie, wszędzie wypierając szczura domowego; z Europy zaś jak i jego poprzednik, rozpowszechnił się po całym świecie. Zwierzę to mądre, odważne i wytrwałe, nieznające przeszkód; wszędzie potrafi się dostać, z głodu wszystko zje, nawet drugiego szczura. Jak wielką jest ilość szczurów w wielkich miastach, np. w kanałach Paryża, możemy mieć wyobrażenie z tego, że tam umyślni łapacze szczurów zabijają ich jednej nocy do 10,000 sztuk.



Fig. 80. Szczur wędrowny.

63. Do tej gromady należy jeszcze **Chomik** czyli **Skrzeczek** (*Cricetus frumentarius*) (fig. 81), zwierzątko z krótkim ogonkiem, mające długości 30 cm., barwy brunatno-żółtej; pyszczek, około oczu i pasek na szyi są koloru rdzawego, spód czarny, nogi białe. Mieszka on w norach, które sam kopie. Nory te są o kilku wyjściach i zawierają



Fig. 81. Chomik.

komory mieszkalne i składy zapasów. W ostatnich gromadzi chomik ogromną ilość zboża, wybierając najlepsze ziarna, które znosi w torbach policzkowych. Przy rozkopywaniu nor znajdują nieraz po kilkadziesiąt funtów ziarna, którego i małej części nawet on nie zjada, gdyż w zimie śpi. Robi wielkie szkody rolnikowi; to też starają się go tępić, w czym dopomaga człowiekowi drapieżne ptactwo: sowy, jastrzębie, kruki. Jako prawdziwy sknera jest chomik nietowarzystki, gdy spotka innego chomika, rzuca się na niego, i dopóty walczą te złośliwe zwierzęta, dopóki jedno nie padnie nieżywe, wtedy pozostałe pożera je.

64. Osobną gromadę stanowią **Jeżozwierze** (*Hystrix cristata*), wielkości borsuka (*Tab. II, fig. 9*).

Ciało jeżozwierza uzbrojone jest kolcami długimi na 20—30 cm., które on podnosi działaniem mięśni skóry; służą mu one za obronę przeciwko szakalom i lisom, lecz wcale nie są straszne, robią więcej hałasu; łatwo też wychodzą. Jeżozwierz żywi się korzonkami, trawami, owocami, zjada i owady. Znajduje się w Europie poł. i półn. Afryce; gatunki amerykańskie zaopatrzone są w ogon czepny i żyją na drzewach. Dzień spędza zwykle w norze, którą kopie mocnymi pazurami; w nocy wychodzi na poszukiwanie pokarmu. Mięso jego bardzo smaczne. Polują na niego, posyłając do nory małych chłopców, ubranych w skórzaną odzież i uzbrojonych długimi oszczepami, którymi przebijają zwierzę i wyciągają je z nory.



Fig. 82. Świnka morska.

65. Najspokojniejszym, ale też i głupiuchnym zwierzątkiem między gryzoniami jest **Świnka morska** (*Cavia cobaya*), (fig. 82), 20 cm. długa, o krótkich nóżkach, sierść ma zabarwioną plamami żółtymi, czarnymi i białymi. Często bywa trzymana w niewoli i służy dzieciom do zabawy.

66. Ostatnią gromadę gryzoniów, z których człowiek ma korzyść, reprezentują: zając i królik.




Fig. 83. Zając szarak.

Zając szarak (*Lepus timidus*), (fig. 83), szary lub brunatny, o długich uszach i skokach, a małym ogonku czarnym i białym, znany jest powszechnie. Jest zwierzęciem więcej nocnym, aniżeli dziennym, w spokojnych jednak miej-

scach pokazuje się i w dzień. Zamieszkuje całą Europę; w krajach północnych i wschodnich miejsce jego zastępuje **Bielak** (*Lepus variabilis*), który letnią sierść szarą zmienia w zimie na białą. Zając jest bardzo płochliwy i bezbronny, w bystrości nóg ma jedyną ucieczkę od nieprzyjaciół, których ma mnóstwo nie tylko w człowieku, ale i między różnymi zwierzętami. Żywi się trawą, źdźbłami zbóż, koniczyną, rzepą, a w zimie i korą drzew, jednak szkody, które robi, wynagradza korzyścią, jaką człowiek ma z jego mięsa i skóry. Jest bardzo mnożny i robi dla swych małych rodzaj gniazda.

Królik (*Lepus cuniculus*) (fig. 84), spokrewniony z zającem, ale mniejszy od niego, barwy rozmaitej; do najpowszechniejszych domowych należą **albinosy**, białe z czerw-



Fig. 84. Królik domowy.



Fig. 85. Królik angorski.

nemi oczami; pochodzi z Hiszpanji i Afryki północnej, mieszka w norach; łatwo się oswaja i hodowany bywa dla mięsa. Przewieziony do Australji, zdziczał tam i rozmnożył się w takiej ilości, że stał się plagą rolnika, niszcząc zasiewy w całej okolicy.

Z odmian zasługuje na uwagę **Królik angorski** (fig. 85), odznaczający się pięknym, długim, jedwabistym włosiem.

Rząd VIII. Bezzębne czyli szczerbate.

67. Zwierzęta, należące do tego rzędu, mają budowę i sposób życia bardzo niejednakowe; cechą zaś wspólną wszystkich jest nieobecność przednich, lub brak wszystkich zębów. Większa część ich mieszka w Brazylii, prawie wszystkie mają długie pazury. Niektóre żyją na drzewach, inne w jaskiniach i norach.

68. **Leniwiec** czyli **Ai**, (fig. 86), długi jest na 50 cm., ma małą głowę, o małych, wystraszonych oczach, sierść czerwono-szarą, na brzuchu jaśniejszą; na każdej łapie ma po 3 długie pazury. Jest w ruchach bardzo powolny, ale członki ma bardzo giętkie i ruchliwe; żyje na drzewach i żywi się ich liśćmi, a dzień zwykle spędza śpiąc, zawieszony u najwyższych gałęzi drzewa, za pomocą długich pazurów. W taki sam sposób łązi po gałęziach i schodzi z drzewa, gdy już całe objadł; na ziemię nie schodzi. Włosy futerka leniwca idą



Fig. 86. Leniwiec.

wszystkie do góry, tym sposobem, gdy on wisi na gałęzi, woda wygodnie po nich spływa. Młode czepiają się futerka matki i bywają przez nią długi czas w ten sposób noszone. Głos, który wydaje, przypomina głoski *ai*, co posłużyło za przyczynę nazwy miejscowej. Zamieszkuje gęste lasy Brazylii.

69. **Pancernik** (*Dasypus peba*) (fig. 87), ma grzbiet pokryty twardym pancerzem, utworzonym ze skostniałych łuszek



Fig. 87. Pancernik.

skóry; grzbiet ten ma w środku 9 pasów kostnych ruchomych. Dosięga wielkości 35 cm.; mieszka w norach, które sam kopie. O zmierzchu wychodzi szukać pożywienia, które stanowią owady, korzonki i padlina. Indianie polują na niego dla smacznego mięsa, pancerza używają jako koszyka.

Kopie szybko i zręcznie i tym sposobem chowa się przed nieprzyjacielem. Gdy się wkopał w ziemię, to da sobie prędzej ogon urwać, aniżeli wyciągnąć z nory.

70. **Mrówkojad** (*Myrmecophaga jubata*) (Tab. II, fig. 6), dosięga długości metra i więcej. Głowę ma małą, wydłużoną w ryj, na końcu którego zamiast ust jest okrągły otwór, ciało pokryte ciemno-brunatnym włosem, który na grzbiecie wyrasta w grzywę, przechodzącą w puszysty ogon, długi na 70—80 cm. Wzdłuż głowy i łopatek ma pasy kolorowe. Język długi, przynajmniej na pół metra, okrągły i cienki, pokryty lepłą śliną. Język ten zapuszcza w rozkopane moc-

nemi pazurami przednich łap gniazda termitów, a wypuszczając go i wciągając napowrót ze 30 razy na minutę, pochłania ogromną ilość tych szkodliwych owadów. Niema on wcale zębów i nie kopie nory, tylko zasypia tam, gdzie go noc zastanie. Mieszka również w Brazylii.

71. **Łuskowiec** (*Manis*) (fig. 88), pokryty jest dachówkowato ułożonemi brunatnemi łuskami, które najeżają się i nadstawiają ostre kolce, gdy zwierzę zwinie się w kłębek. Żywi się mrówkami, które chwyta na język tak samo jak mrówkojad. Łuskowce znajdują się w Indjach Wschodnich i w Afryce; polują na nie zawzięcie dla ich mięsa.



Fig. 88. Łuskowiec.

72. Do tegoż rzędu zaliczają **Kaczkonosa** czyli **Dziobaka** (*Ornithorhynchus paradoxus*) (fig. 89), zwierzątko nie dłuższe nad 40 cm., znajdujące się w Australji. Ciało dziobaka pokryte jest sierścią brunatną; palce ma połączone płetwą i szeroki ogon, służący jako ster podczas pływania. Pysk ma zakończony szerokim, płaskim dziobem, jak u kaczki. Podobieństwo jego do ptaków zwiększa ta okoliczność, odkryta dopiero przed kilku laty, że dziobak znosi jaja, z których wylęgają się małe.



Fig. 89. Kaczkonos.

Żywi się roślinami wodnemi, żyjąc zwykle w stojących lub cichych wodach, na których brzegu kopie sobie nory w piasku.

ZWIERZĘTA KOPYTOWE.

Rząd IX. Jednokopytowe.

73. Cecha zwierząt jednokopytowych jest ta, że mają *jeden* tylko rozwinięty palec środkowy, zakończony **kopytem**

(fig. 90). Nogi jednakowo wysokie i wysmukłe, głowa średnio duża o szyi wysmukłej. Mają grzywę na grzbiecie i ogon o długich włosach. Są to zwierzęta trawożerne.



Fig. 90. Kopyto konia.

74. Głównym przedstawicielem jednokopytowych jest **Koń** (*Equus caballus*), piękne zwierzę, najcenniejsze i najszlachetniejsze ze zwierząt domowych. Istnieją bardzo liczne odmiany tego zwierzęcia; które na równi z psem jest od niepamiętnych czasów sta-

łym towarzyszem człowieka; tylko służba jego i pomoc jest rozmaita. „Koń jest nie tylko ognistym biegunem, lecz okazuje wszystkie cechy wierności, wdzięczności, posłuszeństwa i współczucia, jak również odznacza się zastanowieniem, rozumem, nieomylną pamięcią i rzadką pojętnością. Ciągnie ciężary i pług, statek wodny i armaty, rozwesela ludzi w cyrku i obraca z całym zaparciem się własnej woli, wały i koła machin. Najpiękniejszą zaś służbę pełni, nosząc człowieka na swym grzbiecie, okazując mu na każdym kroku swoją wierność, czy to w spokojnem zajęciu, czy wśród huku armat i wiru walki, przeczuwając niebezpieczeństwo i unosząc od niego swego pana.”

Przypuszczają, że pierwotną ojczyzną konia jest Azja środkowa. Na jej płaskowzgórzach znajduje się i dziś dzika




Fig. 91. Tarpan.

rasa koni t. zw. **tarpany** (fig. 91), żyjące gromadnie, czujne i płochliwe.

W Ameryce znajdują się również dzikie konie, zwane **mustangami**, są to jednak potomkowie zdziczałych europejskich. Na lądzie Ameryki w chwili jej odkrycia, nie było wcale koni. Gdy takie zdziczałe konie zbliżą się do obozu podróżników, po-

rywają zwykle z sobą wszystkie ich własne konie i muły. Czasem jakiś szal przestachu ogarnia takie olbrzymie stado i wtedy pędzą niczem nie powstrzymane na ogromne odległości.

Pewien podróżny tak opisał podobne zjawisko:

„Głuchy z początku odgłos. lecz wzrastający z każdą chwilą, wreszcie podobny do huku bałwanów wzburzonego morza, zapowiedział zbliżanie się wielotysięcznego tabunu koni, który w szalonym pędzie przewracał namioty, nie zważając na płonące ogniska obozowe, i z równą szybkością znikł w cieniach nocy, pędząc dalej w pustynię. Konie podróżnych, uwiązane do kołków, pozrywały cugle i ogarnięte takimże szaleństwem, podążyły za dzikiem stadem, którego nagłe pojawienie się nawet odznaczających się zimną krwią Indian przejęło zgrozą.”




Fig. 92. Koń arabski.

Do najcelniejszych koni należą **arabskie** (fig. 92).

75. Najbliższym konia gatunkiem jest **Osiół** (*Equus asinus*) (fig. 93), znacznie mniejszy od niego, nieraz bardzo zgrabny i z cierpliwością znoszący twardy los pracy i złego obchodzenia się. W Europie południowej osioł często bywa używany jako zwierzę domowe do pociągu i do jazdy wierzchem, a w Arabji i Persji staje się niezbędnym dla człowieka, jako zwierzę juczne, zadawalniające się byle jakim pokarmem i znoszące ciężary i trudy podróży, a pracujące często nad siły. Osioł przyswojony został prawdopodobnie jeszcze dawniej niż koń; dzikie osły znajdują się w Azji środkowej i w Atryce północnej.




Fig. 93. Osiół.

Z pomieszczenia konia z osłem pochodzą **muły**, cokolwiek większe od osła, łączące bystry chód konia z wytrzymałością osła.

76. **Zebra** (*Equus zebra*) (Tab. II, fig. 7), piękne, dzikie zwierzę, podobne do konia, nie dające się oswoić, znajduje

się w Afryce południowej i odznacza się czarnymi na płowym



Fig. 94. Kwagga.

tle, poprzecznymi pręgami, idącymi od podłużnej pręgi grzbietowej. Zbliżona do niej jest **Kwagga** (*Equus quagga*) (fig. 94). Kwaggi towarzyszą często stadom antylop. Prawie zawsze znajdują się obok nich strusie, które pełnią niejako obowiązki straży, przeglądając okolice i ostrzegając kwaggi o niebezpieczeństwie.

Rząd X. Dwukopytowe czyli przeżuwające.

77. Zwierzęta te mają po *dwa* rozwinięte palce, z których każdy zaopatrzony jest w kopyto (racice) (fig. 95). Wiele z nich posiada ozdobę głowy w kształcie rogów. Charakterystyczną ich cechą stanowi to, że raz połknięty pokarm zwracają z żołądka do pyska i przeżuwają go powtórnie. Żołądek ich składa się z kilku części i jest bardzo duży (fig. 96). Pokarm przeżuwających jest wyłącznie roślinny. Zęby ich są odpowiednio do tego ukształtowane (fig. 97):



Fig. 95. Racica.

prawie żadne z nich nie ma zębów siecznych w górnej szczęce, a tylko w dolnej (wyjątek stanowią wielbłąd i żyrafa); trawy więc nie odgryzają ale odrywają, przyciskając ją dolnymi zębami do okrytej grubą skórą szczęki górnej. Z gruba pożuty pokarm dostaje się najprzód przez przełyk do pierwszego oddziału żołądka, zwanego *żwaczem* (fig. 96 (A), tu się rozmięcza i przechodzi do *czepca* (D); stąd podzielony na kęsy, powraca do pyska i dokładnie przeżuty wraca do *księgi* (C), a z tej części przechodzi do *trawieńca* (E), gdzie odbywa się już właściwe jego trawienie. Podczas paszy zwierzę tylko napełnia





Fig. 96. Żołądek przeżuwających.

ogromny żwacz naprędcie pożytym pokarmem, a podczas od poczynku dopiero odbywa się przeżuwanie. Przeżuwające są bardzo ważne dla człowieka, który żywi się ich mięsem i mlekiem, ich wełnę i skórę bierze na odzienie, używa ich do pociągu i do dźwigania ciężarów.



78. Pierwszą rodzinę przeżuwających stanowią zwierzęta *pochworogie*, do których należy *bydło rogate*. Zwierzęta tu zaliczone odznaczają się ciałem wielkim, ciężkim, okrytym krótką sierścią barwy rozmaitej, najczęściej czarnej, brązowej, pstrokatej, siwej i białej. Grzbiet mają zupełnie poziomy, pod szyją obwisłą skórę czyli t. zw. wole; głowa jest wydłużona, czoło płaskie, pysk szeroki, nieowłosiony, rogi puste, nie spadające nigdy, osadzone na kostnych wyrostkach czołowych, gładkie, ku przodowi nieco zagięte (fig. 98), nogi zakończone parą racic i parą dodatkowych kopytek z tyłu, nie dochodzących do ziemi, ogon długi, gładki, zakończony kitą włosów.




Fig. 98. Rogi wołu.

79. Głównym przedstawicielem bydła rogatego jest **Wół domowy** (*Bos taurus*) (krowa, cielę) (fig. 99), jedno z najsilniejszych i najpożyteczniejszych zwierząt domowych. Używa się do przewożenia ciężarów, uprawiania pól; dostarcza mięsa, mleka, skóry, sierści, rogów; z kopyt wyrabiają klej, a z kości wypalonych węgiel zwierzęcy do użytku cukrowni.



Fig. 99. Wół domowy (krowa).

Z odmian bydła rogatego należy zwrócić uwagę na: 1) *bydło stepowe* (fig. 100), maści przeważnie si-

wej, z nadzwyczajnie długimi rogami, znakomite do pociągowej pracy, dostarcza doskonałego mięsa i skór bardzo ce-




Fig. 100. Wół dziczaty stepowy.

Wszystkie odmiany bydła domowych pochodzą od trzech gatunków, które niegdyś zamieszkiwały Europę, a z których **Tur** (*Bos primigenius*) utrzymał się był jeszcze do XVI-go wieku.



Fig. 101. Zebu.

102), pełni czynności zwierzęcia domowego. Spotyka się też i w dzikim stanie; odznacza się długą, jedwabistą, prawie do ziemi wiszącą sierścią.



Fig. 102. Jak.

Dzikie bydlę znajduje się w wielkiej ilości w Ameryce, gdzie na nie polują zapomocą *lassa*, starając się pochwycić je żywcem. Głównem zadaniem myśliwych jest wypędzenie stada z zarośli, w których się zwykle przed człowiekiem kryje, na otwarty step, gdzie można zarzucić *lasso*. Gonitwa trwa nieraz całymi godzinami przez gąszcze, dopóki nie uda

nionych — lecz mało mleczne; 2) z *bydła nizinnego*, rasa *holenderska*, o maści czarno-pstrej, z nogami białymi, odznacza się wielką wydajnością mleka; 3) wśród *bydła górskiego*, rasy *szwajcarskie* dostarczają wołów silnych, zdatnych do pociągowej roboty i do pasienia, i krów, dających dużo i dobrego mleka. Z *krajowych* ras należy wymienić *bydlę Św.-Krzyskie* i *galicyjskie*.

Dziczające woły spotykają się stadami w stepach Europy i Azji.

80. W Indjach i Chinach znajduje się gatunek wołu z garbem, zwany **Zebu** (*Bos indicus*) (fig. 101), który tam spełnia czynności konia i wołu. Zabicia jego zakazuje religja miejscowa. Na wyżynach Azji środkowej (w Tybecie) podobnie garbaty **Jak** (*Bos grunniensis*) (fig. 102), pełni czynności zwierzęcia domowego.

Dzikie bydlę znajduje się w wielkiej ilości w Ameryce, gdzie na nie polują zapomocą *lassa*, starając się pochwycić je żywcem. Głównem zadaniem myśliwych jest wypędzenie



się skierować stado na sawannę; wtedy jeźdźcy wpadają między zmęczone byki, aby rozbić stado na sztuki, a obrawszy jedną z nich, zarzucają jej na szyję lasso; duszone zwierzę pada na ziemię i staje się łupem myśliwego.

81. Drugi gatunek byków stanowią **bawoły**.

Bawół piżmowy (*Bos moschatus*) porośły długim włosem, z rogami, które zaraz od czoła wygięte są na dół, a końce mają skierowane ku przodowi. Z postaci i wielkości przypomina bardziej barana niż wołu. Znajduje się w niewielkich stadach na skrajnej północy lądu amerykańskiego, wśród tundr, porośłych tylko mchem i zaledwie na parę miesięcy ożywiających się pod wpływem krótkiego lata. Mięso samców posiada zapach podobny do piżma. Wełna jest nadzwyczaj cienka i nadaje się do wyrobu delikatnych tkanin.

Bawół pospolity (*Bos bubalus*) (fig. 103) znajduje się w Azji, Afryce północnej i Europie południowej, oswojony jak nasze bydło. Jest on wielkości wołu, a sierść ma najczęściej czarną. Bardzo lubi wilgoć i nieraz, gdy w podróży przez długi czas był pozbawiony kąpeli, zobaczywszy rzekę, rzuca się w nią razem z ładunkami, które ma na grzbiecie, lub z wózkiem, do którego jest wprzężony.



Fig. 103. Bawół pospolity.

82. Trzecią gromadę byków stanowią **żubry**.

Żubr europejski (*Tab. III, fig. 1*), niegdyś rozpowszechniony w Europie, dziś przechowywany w liczbie kilkuset sztuk w puszczy Białowieskiej na Litwie. Dawni królowie Franków polowali na nie u siebie; również i Karol Wielki, w roku 807, dla uczczenia posłów Harun-al-Raszyda, urządził polowanie na żubry; goście jednak, zobaczywszy straszne zwierzęta, zaczęli uciekać coprędzej, a sam Karol W. o mało że nie przypłacił życiem to niebezpieczne polowanie.

83. Zbliżony bardzo do zubra jest **Bizon amerykański** (*Bos americanus*) (fig. 104), którego olbrzymie kilkunastomiljonowe stada zaludniały do niedawna stepy Ameryki północnej. W ciągu ostatnich lat kilkunastu zostały one doszczętnie wy-

niszczone wskutek chciwości kupców. Łatwość bowiem polowania na te zwierzęta przy udoskonalonej broni stała się przyczyną, że zabijano je tysiącami dla samych ozorów i skór, pozostawiając ogromne cielsko na pastwę zwierząt.

Jeden z podróżnych tak opisywał te zwierzęta, gdy jeszcze istniały.

„Bizony w niezliczonych stadach ożywiają prerję ciągnące się w bezbrzeżną dal na zachód od Missuri. Wędrowki




Fig. 104. Bizon amerykański.

ich odbywają się od Kanady aż do wybrzeży nad Meksykańską zatoką i od brzegów Missuri aż do gór Skalistych. Wogóle można przyjąć, że główne gromady tych zwierząt wędrują regularnie z wiosną ku północy, a w późnej jesieni na powrót ku cieplejszym stronom południa.

„W sierpniu i wrześniu, wypasione przez wiosnę i lato na soczystych trawach, bizony ciągną zbite w taką gromadę, że równina czerni się od nich jak daleko okiem sięgnąć, na mile kwadratowe, a obliczyć ich mnogość można tylko w przybliżeniu, obrachowując miejsca zajmowane przez pojedyncze sztuki. Po kilku tygodniach następuje nagła zmiana: wielkie gromady rozbijają się na mniejsze stada, rozsypują się po okolicy i w tej, do niedawna przerażającej pustynnej głuszy na nowo wrę życie. Wkrótce napotykamy pojedyncze bizony, pasące się spokojnie i zamiatające ziemię długimi swemi brodami, to znowu małe stadka, spoczywające w trawie i przeżuujące pokarm, albo igrające z sobą i wyprawiające najpocieszniesze skoki; lub też widzimy całe ich szeregi, kroczące poważnie po wydeptanych ścieżkach, prowadzących najwygodniejszą drogą wśród gór do rzeki, albo do moczarów, gdzie się dowoli mogą w błocie wytarzać...

„W dawnych czasach, gdy bizony były niejako domowymi zwierzętami Indian, nie można było dostrzedz zmniejszenia się ich liczby; przeciwnie trzymały się dobrze i mnożyły się na bujnych pastwiskach. Lecz do krain tych przybyli biali; miękką sierścią pokryte skóry znęciły ich; tłuste mięso smakowało im; na obu zaś tych produktach obiecywali sobie znaczne zyski w cywilizowanych krajach. Najprzód pobu-

dzono w mieszkańcach stepu pożądlivość do błyskotek i upajających produktów przemysłu białych, dostarczając im tych fraszek za ich łowieckie łupy; wtedy rozpoczęło się pustoszenie...

„Łowy na bizona stanowią dla Indianina na prerjach nie tylko środek utrzymania, ale i największą rozkosz. Skoro Indianin zamierza wykonać napad na stado bizonów, przedewszystkiem ogałaca siebie i konia ze wszystkich niepotrzebnych i zawadzających przedmiotów, do takich należą: odzież jego i osiodłanie konia. Myśliwy trzyma w lewej ręce łuk i tyle strzał, ile się w dłoni zmieści, w prawej bat, którego uderzeniami popędza konia. Długi na 40 stóp sznur upleciony z surowego rzemienia przywiązany jest u szczęki konia, a przerzucony przez kark jego, luźnie wlecze się po ziemi. Służy on do kierowania koniem, a w razie spadnięcia jeźdźcy, do łatwiejszego pochwycenia konia.

„Zmyślny koń doskonale pojmuje zamiary jeźdźcy i nie potrzebując innej wskazówki, dopada do wybranej ofiary, aby dać możność jeźdźcy w najstosowniejszej chwili pogrążyć strzałę w boku bizona. Zaledwie jęknie naprężona cięciwa łuku, a żelazo strzały przeniknie do tłustego mięsa bizona, koń z własnego popędu potężnym rzutem odskakuje na bok, chroniąc się od uderzenia rogami rozwścieczonego bólem zwierzęcia i wraz z jeźdźcą goni za nową ofiarą. Tak pędzi zapamiętały łowiec po równinie, dopóki zmęczenie konia nie nakaże mu zaprzestać pogoni. Tymczasem ranione bizony oddzieliły się od stada i martwe lub z sił wyczerpane leżą na równinie, ciałami swemi znacząc drogę, po której odbywały się dzikie te łowy. Kobiety pośpieszyły za śladem łowcy i niezwłocznie zajęły się rozbieraniem zabitych bizonów, zdejmowaniem skór i przenoszeniem zdobyczy do swoich wigwamów, gdzie mięso krają w cienkie paski i suszą, a skórę garbują za pomocą bardzo prostych sposobów. Znaczna jednak część łupu staje się udziałem wilków, których liczne gromady nieodstępnie towarzyszą bizonom.”

Młode cielątka bizonów przypominają kształtem i barwą sierści cielę domowe.

84. **Owca** (*Ovis aries*) (fig. 105), której samiec z rogami wygiętymi w tył i na boki, nazywa się **Baranem** (Tab. III, fig. 2), należy do pospolitych zwierząt domowych. Jest to słabe, niezgrabne i nie bardzo mądre zwierzę, które pod opieką ludzką utraciło prawie zdolność prowadzenia życia

samoistnie. Tylko tam jest mądrzejsze, gdzie jest zostawione samo sobie, np. w Alpach; wtedy przewyższa nawet kozę w zręczności i wspinaniu się po górach. Łatwo gromadzi się w ogromne stada, które ślepo idą za baranem; dość jest wrzucić barana do wody — a cała gromada bez przymusu popłynie za nim; jeśli przez nieostrożność prowodyr stada spadnie ze skały, wszystkie owce podążają za



Fig. 105. Owca.

nim na oczywistą zgubę. Owce trzymają głównie dla wełny, którą corocznie strzygą. Istnieje wiele odmian, wśród których do najlepszych należą




Fig. 106. Merynos.

Merynosy (fig. 106).

85. **Koza domowa** (*Capra hircus*) (fig. 107), należy również do pospolitych zwierząt; utrzymywana zwłaszcza przez ludność ubogą, zadawalnia się byle jaką paszą i staje się nieraz żywicielką całej rodziny. Żywiona starannie daje dużo

dobrego mleka, z którego wyrabiają dobre sery; mięso jadalne, ale gorsze od baraniego. Ma długą brodę na podbródku i rogi kanciaste, silnie w tył wygięte; zręcznie wchodzi



Fig. 107. Koza domowa.

na wyniosłości i skacze z nich. Samiec nazywa się **kozłem**. Skórę kozią używają na rękawiczki, na oprawy książek i inne wyroby.

Kozy angorskie (fig. 108) i **kaszmirskie** (fig. 109), hodowane w Azji środkowej, gdzie prawie wyłącznie żyją w górach, dają doskonałą, długą i cieką wełnę, z której wyrabiają znakomite kaszmirskie szale.

Koziół skalny (*Capra ibex*) (Tab. III, fig. 4), zbliżony jest do domowego, dosyć duży (wagi do 100 kilg.), o potężnych czworograniastych rogach i mocnych chropawych racicach, przy pomocy których z łatwością biega po niedostępnych lodowcach i skałach alpejskich. Mieszka na szczytach

gór; nadzwyczaj zręcznie przeskakuje przepaście. Mądre to zwierzę dziś jest prawie przez myśliwych wytępione.



Fig. 108. Koza angorska.




Fig. 109. Koza kaszmirska.

Kozica czyli **gemza** (*Antilope rupicapra*) (Tab. III, fig. 5), wielkości kozy, ma małe rogi, proste, u góry w tył zagięte, od oka do pyska ciemną pręgę, w lecie jasno, w zimie ciemno-brunatną; mieszka stadkami w górach: w Alpach, w Tyrolu, w Karpatach i Tatrach, Pirenejach i na Kaukazie, żywi się ziołami górskimi. Są to bardzo wesole zwierzęta i czujne; przy zbliżeniu się człowieka uciekają na wysokie szczyty gór. Przy wycieczkach tatrzańskich można często widzieć je zdaleka w postaci czarnych punkcików przesuwających się po śnieżnych polach.

Mięso młodych gemz jest smaczne, skóra idzie na wyroby delikatne, a rogi na rączki do lasek. Prowodyrem stada (które górale nasi nazywają *kierdelą*), jest zwykle najstarsza koza (nie kozioł): gdy inne spoczywają, ona pasie się i czuwa nad całym stadem; co chwila podnosi głowę, wietrzy, wskakuje na szczyty i przegląda okolicę. Przerażliwe gwizdnięcie jej oznajmia o niebezpieczeństwie; wtedy cały kierdel zrywa się i pędzi za nią. Przeskakują zręcznie rozpadliny do 6 metrów szerokie, wskakują na złomy skał wysokie na 4 metry, pędzą po takich krawędziach, o które nie jest w stanie oprzeć się noga ludzka. Jeżeli kozica zabłąka się tak, że stanie nad przepaścią, przecinającą jej dalszą ucieczkę, wtedy zatrzymuje się na chwilę, spogląda w przepaść i po chwilowem wahaniu wraca tą samą drogą. Jeżeli myśliwy nie zdążył zająć bezpiecznego stanowiska, pozostaje mu tylko rzucić się plackiem na skałę, albo przycisnąć się do jej ściany, aby nie być strąconym w przepaść; wtedy kozica przeskakuje przez niego, nie czyniąc mu

szkody. Po stromych urwiskach zsuwa się w dół, opierając się o nie tylnymi nogami i kurcząc odpowiednio ciało.

86. Zbliżone do kozicy są rozmaite inne **Antylopy**, odznaczające się kształtnością ciała, zręcznością i szybkością ruchów. Jednym z najpiękniejszych zwierząt jest należąca do tego rodzaju **Gazella** (*Antylope dorcas*) (fig. 110), mieszkająca w pustyniach Arabji i w Afryce północnej. Mniejsza nieco od naszej sarny, jest zgrabniejsza i smuklejsza. Beduini zawzięcie polują na nią. Często używają do tego sokołów. Pewien podróżny opisuje takie polowanie:



Fig. 110. Gazella.

„Jeden z myśliwych popędził na koniu za antylopami i wypuścił na nie sokoła. Ptak wzniósł się w górę, zatoczył w powietrzu wielkie koło i spadł jak piorun na wybraną ofiarę, zatapiając szpony w policzek i w gardło gazelli. Zwierzę skoczyło na kilka stóp w górę i oswobodziło się od swego wroga, lecz ten powtórny ciosem tak się szponami wpił w jego szyję, że znużone zwierzę padło na ziemię, dając czas myśliwemu do zadania mu ciosu śmiertelnego.

Rozmaite gatunki antylopy zaludniają gorące strefy Afryki i prerje Ameryki. Są to zwierzęta szybkonogie, różnej postaci i o rogach przeróżnych fantastycznych kształtów. Na południu Afryki znajduje się **Antylopa gnu** (fig. 111), zbliża się ona kształtem ciała i zwyczajami do byków, a kadłub jej przypomina konia. Zarówno jak byków drażni ją widok czerwonego koloru.




Fig. 111. Antylopa gnu.

87. Drugą rodzinę wśród przeżuwających stanowią zwierzęta o *rogach gałęzistych*, które mają zwykle tylko samce. Rogi te nie mają pochwy rogo-

wej i co roku w jesieni bywają zrzucone; na wiosnę zaś wyrastają na nowo. Do nich należą:

Jeleń (*Cervus elaphus*) (fig. 112), którego samicę nazywają **łanią**, należy do najpiękniejszych zwierząt europejskich lasów. Jest to wielkie zwierzę łagodne i płochliwe, o sierści płowo-ciemno-brunatnej. Jest nadzwyczaj szybki w biegu; prześladowanie uczyniło go zwierzęciem nocnym z dziennego, jakiem był pierwotnie. Dzień zwykle spędza w zaroślach i dopiero w nocy wychodzi na paszę. Roczny jeleń ma rogi proste jak kijki, w drugim roku są już one widłowe, a potem co rok wyrasta mu jedna gałązka więcej, tak, że po latach 8—10 rogi jego wyglądają jak wspiane gałęzie.



Fig. 112. Jeleń.

Sarna (*Cervus capreolus*) (fig. 113), jest pospolita w całej Europie i Azji północnej; najładniejsze to zwierzę naszych lasów; nie większa od kozy, żyje rodzinami w stadach, liczących po kilka sztuk. Samiec ma rogi, które zrzuca w jesieni. Samica, którą łowcy nazywają „kozą”, nie ma rogów. W niebezpieczeństwie broni ona gorliwie swoje sarniátko: jeżeli ono nie może jeszcze uciekać, to matka każe mu się położyć i ukryć, sama zaś oddala się z początku powoli, pociągając za sobą prześladowcę; gdy zaś sądzi, że młode jest już bezpieczne, wtedy szybko ucieka, powracając następnie inną drogą. Polują na sarny zawzięcie z powodu smacznego mięsa; znajduje się jednak jeszcze dość obficie po lasach.



Fig. 113. Sarny.

Daniel (*Cervus dama*) (fig. 114), również rozpowszechniony w Europie, a w zwierzyńcach obfity; jest żółto-biało nakrapiany, również białe są piersi, brzuch i wewnętrzna strona nóg. Mniejszy jest od jelenia.

88. **Łoś** (*Alces palmatus*) (Tab. II fig. 8), jest wielkości konia. Przednia część ciała jest wyższą od tylnej. Głównie

wę ma ozdobioną wspaniałemi szerokimi rogami łopatkowemi, nozdrze spuszczone, grube, i górna warga opuszczona.



Fig. 114. Daniel.

Znajduje się przeważnie w Europie północnej i w środkowej Azji. Mieszka w bagnistych lasach i żywi się liśćmi drzew i korą. Polowanie na niego bywa nieraz niebezpieczne; rana, a nawet chybiony strzał wprawiają go w straszny gniew; rzuca się na miejsce, skąd padł strzał i depce wszystko raciami przednich nóg.

Renifer (*Rangifer tarandus*) (Tab. III, fig. 3), jest mniejszy od łosia i wygląda niezgrabnie, ale od-

znacza się niezwykle wytrzymałym i szybkim biegiem; ma, stosownie do zimnego klimatu, w którym żyje, futro gęste, nogi silne, racice szerokie, tak, że nie zapada w śnieg i bagno. Rogi duże, rozpierzchłe. Jest on żywicielem i niezbędnem zwierzęciem dla człowieka w krajach podbieguno-



Fig. 115. Piżmowiec.

wych. Zaprzężony do sanek zastępuje konia, mlekiem jego żywią się Lapończycy, również jak i mięsem. Sam zaś renifer żywi się wygrzebanymi z pod śniegu mchami i porostami. Na Syberji znajdują się stada reniferów liczące do 50,000 sztuk.

Piżmowiec (*Moschus moschiferus*) (fig. 115), wielkości sarny, nie ma wcale rogów, ale samiec ma dwa kły, sterczące z górnej szczęki. Posiada na brzuchu woreczek, zawierający piżmo, używane od bardzo dawnych czasów do wyrabiania perfum. Żyje w górach Azji środkowej i w Syberji.

89. Osobną rodzinę tworzy **Girafa** (*Camelopardalis giraffa* (Tab. II fig. 5), kształtem swoim przypomina rozmaite

zwierzęta: tułów konia, ale krótszy i bardzo spadzisty, zakończony jest ogonem osła; szyja wielbłąda, niezwykle długa, na niej zgrabna głowa, o pięknych, dużych oczach, podobna do końskiej, zaopatrzona w dwa rożki skórą pokryte. Skóra żółtawa, pokryta czworograniastymi brunatnymi cętkami. Całe zwierzę dosięga 6 metrów wysokości. Mieszka we wnętrzu Afryki; żywi się liśćmi i młodeymi gałązkami, które zrywa z drzew przy pomocy długiej szyi. Żyje w niewielkich stadach i odznacza się niezwykle szybkością biegu.

90. Do ostatniej rodziny należą zwierzęta, mające małe kopyta i stąpające całą długością palców, opatrzonych w mięsistą podeszwę. Mają długą szyję, a głowę bez rogów.

Dromader czyli **Wielbłąd jednogarbny** (*Camelus dromedarius*) (Tab. II, fig. 10), zamieszkujący równiny północnej i wschodniej Afryki, na skraju wielkiej pustyni, również jak i **Wielbłąd dwugarbny** czyli **baktryjski** (*Camelus bactrianus*) (fig. 116), zaopatrzone w dwa garby i puszyste futro, znajdujący się w stanie dzikim w środkowej Azji, są zwierzętami pustyni i nieocenionymi towarzyszami człowieka. Posłuszne i wytrzymałe te zwierzęta przenoszą ludzi i ciężary po rozżarzonych piaskach pustyni, zadawalniając się nędznym i skąpym pokarmem i wytrzymując po kilka dni bez wody. Są one rozumne i bardzo przywiązane do człowieka. Przebycie pustyń piaszczystych byłoby bez nich niemożliwe. Dobry wielbłąd przewyższa konia w szybkości i wytrzymałości, a może unieść na sobie do 4 centnarów ciężaru.

Lama (*Auchenia lama*) (Tab. II, fig. 4), znajduje się na płaskowzgórzach Andów w Ameryce południowej i jest dla górskich mieszkańców tego kraju tem, czem wielbłąd dla ludów pustyni. Lamy



Fig. 116. Wielbłąd dwugarbny.



Fig. 117. Alpaka.

służą jako zwierzęta juczne; mleko i mięso ich daje pożywienie, skóra i sierść—odzienie.

Podobniez oswojonem zwierzęciem jest **Alpaka** (*Auchenia alpaco*) (fig. 117), od niepamiętnych czasów hodowana przez Indian południowej Ameryki. Użytek ten sam jak z lamy.

Rząd XII. Wielokopytowe.

91. Zwierzęta tu należące mają po 3—5 *palców*, zakończonych kopytami; ciało ich okryte jest grubą skórą (stąd nazwa *gruboskórnych*); sierści prawie wcale nie mają. Należą tu największe ze zwierząt lądowych.

Któż bo nie zna **Słonia**, tego olbrzyma naszych zwierząt lądowych? Wprawdzie ojczyzną jego są kraje zwrotnikowe starego świata, ale widzieć można często w ogrodach zoologicznych i menażerjach te dobroduszne, mądre zwierzęta, wykonywujące rozmaite sztuki tak poważnie, zrećźnie i starannie.

Wielka niezgrabna głowa słonia zakończona jest trąbą, sięgającą aż do ziemi; jest ona dla niego wygodnem narzędziem, ułatwiającem mu przy krótkiej szyi podnoszenie przedmiotów z ziemi. Poza mądrymi oczami wiszą ogromne uszy, służące mu do odpędzania much. Paszczę ma dużą, a w niej dwa wielkie kły, wystające na zewnątrz i ważące nieraz do 150 funtów. Wielki kadłub spoczywa na grubych nogach. Słoń nie jest jednak tak niezgrabny, jak wygląda. Podróźni opowiadają, że może on chodzić z pewnością siebie po takich nawet miejscowościach, które dla człowieka są niebezpieczne.



Fig. 118. Głowa słonia indyjskiego.

92. **Słoń** istnieje w dwóch gatunkach: **słoń afrykański** (*Tab. III, fig. 9*) i **indyjski** (*Elephas africanus* i *E. indicus*).

Słonie żyją w lasach, nad brzegami wielkich rzek, które z łatwością przepływają. Żywią się liśćmi drzew, dlatego więc mieszkają w strefie bogatej w roślinność, gdzie przyroda szybko wypełnia spustoszenia przez nie poczynione. Lecz i tam muszą zmieniać miejsce i ciągle wędrować, tem bardziej, że bez wody obejść się nie mogą.

W ojczyźnie swej, słonie żyją stadami, którym przewodzi zawsze stary samiec. Słoń osiąga wieku 100—200 lat i waży 60—80 centnarów. Wysoki na 3 — 5 metrów, długi bywa na 4—5 metrów. Słoń afrykański jest większy od azjatyckiego, ma głowę większą; uszy i kły dłuższe (fig. 118).

Młody słoń osiąga dojrzałości zupełnej dopiero w 25-ym roku. Wszystkie odznaczają się wielką zmyślnością, a pojęmane nawet w wieku dojrzałym, łatwe są do oswojenia.

Kły słonia dostarczają kosztownej „słoniowej kości” i służą za powód do niszczenia tego zwierzęcia, nie czyniącego żadnej szkody człowiekowi, chyba, że wtedy gdy są napadnięte. Sama Afryka dostarcza rocznie przeszło 1,500,000 funtów kości słoniowej, tak, że ilość zabitych słoniów obliczają rocznie na 10,000.



Fig. 119. Głowa słonia afrykańskiego.

Słonie oswojone znane są od bardzo dawna; wspominają o nich najdawniejsze dzieje. Już na 2,000 lat przed nar. Chrystusa piszą o słoniach, jako należących do siły zbrojnej assyryjskiej królowej Semiramidy.

Sposób łowienia słoniów jest dziś ten sam jak i w najdawniejszych czasach. Dwóch ludzi wyszukuje śladów pojedynczo wałęsającego się słonia i podkrada się do niego tak blisko, że mogą mu założyć mocną rzemienną pętlę na nogę. Kiedy jeden wykonywa tę niezbyt bezpieczną czynność, drugi uwiązuje linę od pętli do grubego drzewa, a kolosalne zwierzę jest schwytane, zanim spostrzeże niebezpieczeństwo. Z początku słoń miota się jak wściekły; ale straszny hałas, jaki przy tem sprawiają zaczajeni ludzie, dym i ogień trwożą go; wreszcie przestraszony, głód, pragnienie i bezsenność odbierają mu siły. Tak osłabionemu podają pokarm i w krótkim czasie czynią go zupełnie posłusznym.

Na dowód wielkiej zmyślności słonia, pewien podróżnik przytacza następujące opowiadanie:

„Pewnego wieczoru jechałem konno przez las; nagle koń mój zatrzymał się na odgłos, wychodzący z gestwiny, podobny do głuchego parskania. Gdym się zbliżył, poznałem przyczynę tych niezwykłych westchnień. Był to słoń oswojony, pozostawiony sam sobie i zajęty ciężką robotą. Władowywał on sobie na kły długą belkę, lecz z powodu wąskiej ścieżki

nie mógł jej z lasu wynieść. Chcąc sobie z tem poradzić, wykręcał głowę na prawo i na lewo, i to natężenie wywoływało w nim owo głuche parskanie. Mądre zwierzę, ujrzawszy mnie i mojego konia, podniosło głowę do góry, rzuciło belkę z kłów i cofnęło się w gęstwinę, aby nam zrobić wolną drogę.

Koń mój jeszcze się wahał. Słoń to spostrzegł, cofnął się jeszcze głębiej i powtórzył swe parskanie, ale znacznie łagodniejszym tonem, wyraźnie, aby nas ośmielić. Koń mój bał się jeszcze ruszyć, słoń cofał się coraz dalej, niecierpliwie czekając, aż go minimy i nie będziemy mu przeszkadzali w robocie. Wreszcie koń odważył się postąpić dalej, ale cały drżący ze strachu. Skorośmy słońia minęli, ten natychmiast powrócił i wziął się do swej ciężkiej roboty.”

93. W czasach przedhistorycznych żył w Europie i północnej Azji **Mamut**, zwierzę podobne do słońia, ale jeszcze większe, z ogromnemi do góry zagiętymi kłami i futrem długim, gęstym, zastosowanem do zimnego klimatu. W lodach syberyjskich znajdują jeszcze czasami te wielkie kły, ale znajdowali także i ciała całych mamutów dobrze utrzymane, ze skórą i włosom.

94. W tych samych okolicach, gdzie słoń żyje, mieszkają także wielkie zwierzęta: **Nosorożec** i **Hipopotam**. Są to stworzenia roślinożerne, żyjące w bagnistych okolicach strefy gorącej.

Nosorożec znany jest w kilku gatunkach: **Nosorożec indyjski** (*Rhinoceros indicus*), (Tab. III, fig. 6) i **jawański** (*Rh. javanus*) mają po jednym rogu na nosie; **afrykański** (*Rh. africanus*) ma dwa rogi. *Nosorożec indyjski* ma do 3½ metra długości przy 2 metrach wysokości. Ciało jego pokryte tak grubą skórą, że stanowi ona prawdziwy pancerz, którego zwykła kula ołowiana przebić nie może. Nogi, stosunkowo krótkie, spoczywają na trzech palcach, zakończonych kopytkami. Na nosie ma gruby róg, nieraz dwustopowej długości, osadzony na skórze i utworzony z tkanki, podobnej do fiszbinu, bardzo ostry i mocny.

Nosorożec jest leniwy i ociężały. Zwykle zanurza się głęboko w mule rzecznym dla ochłody i ochrony od owadów. Z powodu tych owadów otoczony jest zawsze gromadkami ptaków, które go uwalniają od małych napastników, fruując nad nim i nieraz krzykiem swoim zawiadamiając go o zbliżającym się niebezpieczeństwie, jeśli go sam nie do-

strzeże. Róg służy mu do obalania drzew, rycia ziemi i jako broń w walce z innymi zwierzętami. Żywi się liśćmi i korą drzew.

Hipopotam (*Hippopotamus amphibius*) (Tab. III, fig. 7), zwany także *konielem rzeczny*, jest od nosorożca niższy, lecz dłuższy, dochodzi bowiem do 1 metra wysokości i do $4\frac{1}{2}$ metra długości. Jestto zwierzę bardzo niezgrabne: głowę ma dużą, spłaszczoną, paszczę ogromną i w niej kły przykryte mięsistymi wargami; ciało ciężkie, nogi tak krótkie, że brzuchem prawie dotyka ziemi, stopy o 4 kopytach. Skóra gruba na parę centymetrów — barwy na grzbiecie niebieskawo-brunatnej, spodem cielistej, przytem jest pokryta ciągle warstwą mułu, gdyż hipopotam większą część życia przepędza w wodzie. Na ląd wychodzi w nocy, szukając pożywienia i wtedy w plantacjach czyni wielkie spustoszenia, jest bowiem zwierzęciem wyłącznie roślinożernem: karmi się przeważnie roślinami wodnymi i trawą. Zamieszkuje wody afrykańskie. Płynąc, zanurza się prawie cały w wodzie, wystawiając tylko oczy, nos i uszy. Zaczerpnąwszy nozdrzami dużo powietrza w swe ogromne płuca, może pozostawać pod wodą do 10-u minut, poczem wychyla nozdrza, ażeby znowu nabrać powietrza.

Hipopotam jestto zwierzę łagodne, ale podrażnione staje się bardzo niebezpiecznym nie tylko dla człowieka, ale nawet dla łodzi: goni ją bowiem z okropnym rykiem i usiłuje wywrócić; tylko szybką ucieczką podróżni ratować się mogą. Hipopotam lubi wygrzewać się na słońcu nad brzegiem wody, a przestraszony zaraz do wody ucieka, skacząc nieraz z wysokości 20 stóp; młode swe unosi na grzbiecie. Kły jego używane są zamiast kości słoniowej do wyrobu zębów sztucznych, do czego nadają się dobrze, bo nie żółkną; ze skóry robią bicz, a mięso jest przez Arabów bardzo lubiane. Polowanie na hipopotamy odbywa się przy pomocy harpunów i strzelby.

Tapir indyjski (*Tapirus indicus*), (fig. 120), jest znacznie mniejszy od hipopotama, ma tylko 2 metry długości, nogi dość wysokie, głowę wydłużoną w ryj, kształtu małej trąby, zęby niewiel-



Fig. 120. Tapir indyjski.

kie, służące mu tylko do gryzienia pokarmów, nie do obrony. Żyje w południowej Azji, w gęstych lasach, ale tylko tam, gdzie jest dużo wody, bo, tak jak hipopotam, bez wody żyć nie może. Często podróżni widzą, jak starsze zwierzęta



Fig. 121. Świnia domowa.

z młodemi swemi kąpią się w wodzie lub tarzają w mule. Żywi się także roślinami, lubi owoce i soczyste liście, które wyszukuje, ryjąc ciągle ziemię, podobnie jak świnia. Tapiry są bardzo czujne i posłyszawszy szelest uciekają do wody albo do lasu w największy gęszcz,

dokąd tylko Indianie przedostać się mogą. Pomimo czujności tapirów, polowanie na nie jest nie bardzo trudne, bo zwierzęta te prędko się męczą. Mięso ich jest smaczne.



Fig. 122. Świnia angielska.

95. Ostatnią grupę zwierząt wielokopytowych stanowią **świnie**, które odznaczają się ciałem krępem i pokrytem rzadko ostrą sierścią, stojącą na grzbiecie; głowę mają zakończoną ryjem szerokim, stopy o 4 kopytach, z których tylko dwa opierają się na ziemi.

96. Znanym wszystkim przedstawicielem tej grupy jest **Świnia domowa** (*Sus scrofa domestica*) (fig. 121), zwierzę wszystkożerne, bardzo



Fig. 123. Dzik.

więc łatwe do wyhodowania; pochodzi od podobnej do niej **świni dzikiej**, żyjącej w lasach. Przez odpowiednią hodowlę otrzymano różne rasy świni domowej. Jedną z wyborowych jest **Świnia angielska** (fig. 122), odznaczająca się delikatnem mięsem.

Świnia dzika czyli **Dzik** (*Sus scrofa*) (fig. 123), jest zwierzęciem większem od świni domowej, ma wielką głowę, opatrzoną bardzo silnemi, ostremi, zagiętymi kłami,

zwanemi przez myśliwych *szablami*, które mu służą do obrony. Samica zwana *lochą* albo *samurą*, ma kły mniejsze. Dzikie mają szcecinę czarno-brunatnej barwy, z siwemi włosami wokoło pyska. Młode dziki zwane *warchlakami*,

mają skórę barwy brunatnej w płowe pasy i gęsto najeżone futro na grzbiecie; stare, zwane *pojedynkami* (dlatego, że żyją samotne) lub *odyńcami*, są jednolitego koloru. Dzikie żywią się żołędziami, buczyną, korzeniami, gąsienicami owadów, które wyszukują sobie, ryjąc ziemię.

Polowanie na dzika bywa niebezpieczne, bo jest bardzo silny, a podrażniony rzuca się na psy i ludzi, kalecząc kłami.

97. W innych częściach świata żyją także świnie pokrewne dzikiej, mianowicie na wyspach indyjskich, na Celebes i wyspach Moluckich żyje tak zwana przez krajowców **Babirusa** (fig. 124), która daje się nawet łatwo oswoić. Ciało ma wysmuklejsze niż świnia, na wysokich nogach, w pysku kły, z których górne są wzniesione do góry i na końcu zakrzywione jakby rożki, dolne zaś są proste. Mięso babirusy jest jadalne i smaczne.



Fig. 124. Babirusa.

W środkowej Ameryce żyją dwa pokrewne gatunki: **Świnia piżmowa** (*Dicotyles labiatus*), zwana „Sawalino” i **Bekari** (*Dicotyles torquatus*) (fig. 125), zwana „Jawalino.” Obydwa gatunki dochodzą do 1 metra długości. Świnia piżmowa ma na grzbiecie guz, od którego całe ciało przejmie zapach piżma, i wskutek tego jest bardzo niesmaczne. Świnie piżmowe żyją towarzysko, ale rozpierzchają się i uciekają, gdy choć jedna ze stada zostanie zabita.



Fig. 125. Pekari.

Przeciwnie zupełnie zachowują się w takich wypadkach *pekari*: te za jednego zabitego towarzysza wspólnie mszczą się na napadającym. W komicznym, a zarazem bardzo przykrem położeniu znajduje się nieraz myśliwy, gdy napadnięty przez rozjątrzone ich stado, musi się chronić na drzewo, pod którym *pekari* urządzają prawdziwe oblężenie. *Pekari* ma sierść czarną z białą obrączką na szyi, żyje w dzień (tak, jak i świnia piżmowa) w zaroślach, w spróchniałych drzewach, w nocy wychodzi szukać pożywienia.

Rząd XIII. Płetwonogie.

98. Do tego rzędu należą zwierzęta żyjące w morzu, przypominające użębieniem i sposobem życia zwierzęta drapieżne. Kształt ciała mają walcowaty, nogi o 5 palcach szerokich, połączonych błoną, tak, że tworzą płetwy, głowę okrągłą, o silnych kłach, wystających lub schowanych, wąsy długie, oczy duże, wyraziste, nozdrza i uszy mogące się zamykać za pomocą płatów skóry. Skórę mają pokrytą krótkim gęstym futrem, pod skórą grubą warstwę tłuszczu.

Wskutek swej budowy zwierzęta te są na lądzie niezgrabne i czołgają się powoli, w wodzie zaś są bardzo zwinne i uganiają się szybko za rybami i innymi stworzeniami morskimi, którymi się żywią.

Rząd ten dzieli się na dwie grupy: **foki**, bez kłów wystających i **morsy**, z dużymi na dół wystającymi kłami.

99. Z pierwszej grupy najważniejszym jest **Ciele morskie** zwane także **psem morskim** (*Phoca vitulina*) (Tab. III, fig. 8), zamieszkuje Ocean Atlantycki, spotyka się także w morzu Bałtyckim i Północnem. Ciało jego kształtu wrzecionowatego, dochodzące do 2 metrów długości, pokryte jest włosiem gładkim, barwy srebrno-szarej w cętki różnobarwne. Głowa kształtu jajowatego z krótkim pyskiem, o wierzchniej rozszczepionej wardze, z której wychodzą długie wąsy. Oczy ma duże, nozdrza przykryte płatami skóry, uszów zewnętrznych niema. Nogi przednie w bok wygięte, tylne zwrócone ku ogonowi, czynią zwierzę to znakomitym pływakiem, ale natomiast bardzo niezgrabnym na lądzie, po którym może się tylko czołgać, kurcząc i prostując grzbiet. To też na ląd foka wychodzi tylko dla snu, dla nakarmienia młodych, lub dla wygrzewania się na słońcu. Foka jest dla Eskimosa niezbędnym zwierzęciem: mięso, krew i tłuszcz jej służą mu za pożywienie, tranu z tłuszczu używa też do oświetlenia, z kości robi sprzęty domowe, z kiszek nici, z nieprzepuszczalnej skóry odzież i pokrycie na statki. Bez skóry foki nie mógłby Eskimos puścić się na morze: kajak bowiem swój osłania on skórą tak, że pozostawia sobie tylko otwór, w którym siada, wyciągnawszy nogi i tylko wierzchnia część ciała jego, obwiązana pod pachami skórą, przyszytą do brzegów otworu, wystaje po nad kajak. W ten sposób woda nawet

wśród bałwanów do środka dostać się nie może. Do większych łodzi robi Eskimos jeszcze żagle z błony, otaczającej kiszki foki. Błony tej używa także jako szyb w mieszkaniu. Polowanie na foki jest łatwe, bo zabić ją można nawet lekkim uderzeniem po nosie. Europejczycy urządzają wielkie wyprawy na północ po foki dla skór i tłuszczu. Zabijają ich takie mnóstwo, że jeden okręt zabiera po 2,000 skór na raz; to też ilość tych zwierząt szybko się zmniejsza. Foka jestto zwierzę łagodne, daje się łatwo oswoić i bardzo się do człowieka przywiązuje, ale podrażniona, gryzie mocno.

Do psów morskich podobne są tak zwane **Foki uszate**, mające uszy zewnętrzne i nogi tylne nie zwrócone ku tyłowi, tak że mogą powoli chodzić po lądzie.

100. W Oceanie Spokojnym żyje t. zw. **Lew morski** (*Otaria jubata*) (fig. 126), mający gęstą, szorstką grzywę na podgardlu—stad podobny do lwa.

W północnych okolicach Oceanu Spokojnego znajduje się **Kot morski** (**kocik**), zwany także **Niedźwiedziem morskim** (*Otaria ursina*) (fig. 127), zwierzę duże, dochodzące do 2 metrów długości. Nogi tylne są zwrócone w bok, tak, że zwierzę to może chodzić po ziemi.

Stare koty morskie mają włos nastroszony, czarny lub popielaty, młode pokryte są włosiem jedwabistym, z początku czarnym, potem brunatnym ze srebrzystymi końcami. Dostarczają one bardzo cenionych futer, zw. *kocikami* lub *kałankami*, z których wyrabiają także miękkie pędzle. Polowanie odbywa się w ten sposób, że łowcy starają się im zagrozić drogę do morza, i na lądzie zabijają kilkoletnie i kilkomiesięczne samce, stare zaś koty i samice puszczają do morza. Polowania takie na wielką skalę odbywają się na morzu Behringa.

Niedźwiedzie morskie są to zwierzęta wędrujące: około 20 kwietnia przybywają na północ, a na południe wracają w październiku. Wskutek polowań, pobyt ich na północy



Fig. 126. Lew morski.



Fig. 127. Niedźwiedź morski.

jest bardzo nieszczęśliwy. Samice przez długi czas z żałosnym bekiem szukają swych zabitych dzieci, zanim w zmniejszonym stadzie zdecydują się wracać na południe.

101. Największą ze wszystkich fok jest **Słoń morski** (*Cystophora proboscidea* (fig. 128), dochodzący od 5—8 metrów długości. Zamieszkuje morza południowej półkuli. Nazwany jest słońmi dlatego, że ma na nosie skórę, którą może wydać na stopę długości, nakształt trąby. Żywi się rybami i ptactwem morskim. Mięso jego nie jest jadalne, tylko serce i płuca. Skóra zdatna tylko na rzemień; z tłuszczu wyrabiają tran; z tego też powodu zwierzęta te są bardzo tępione i blizkie wygięcia.



Fig. 128. Słoń morski.

102. Drugą grupę płetwonogich stanowi **Mors** (*Trichechus rosmarus* (Tab. III, fig. 10), zamieszkuje tylko północne morze Lodowate w okolicy bieguna. Dosięga długości 5 metrów, ma skórę pokrytą za młodu sierścią ciemno-brunatną, w późniejszym wieku nagą. Nogi tak umieszczone, że może chodzić po ziemi, ale bardzo niezgrabnie. Wargi obrosłe wąsami na dół zwisłymi, z górnej szczęki sterczą ku dołowi potężne kły, długości od 60—80 cm., ważące do 18 funtów. Kły te służą zwierzęciu do obrony, do wspinania się na skały i góry lodowe, do obrywania mchów, porostów i muszli, którymi się żywi i do szukania pożywienia na dnie morza. Przebywają w wodzie albo leżą na krach lodowych i grzeją się; nie czują się tu jednak bezpieczni i gdy jedne śpią, inne leżą na straży. Są łagodne, ale napadnięte bronią się zawzięcie i z odwagą. Zwołują wtedy okropnym rykiem całe stado i traktując napastników po drodze, uciekają do wody, gdzie wystawiwszy tylko kły i błyszczące oczy na zewnątrz, czują się bezpieczne, a dla myśliwego groźne. Europejczycy polują na nie podobnie jak na koty morskie, a Eskimosi używają harpunów, które rzucają, stojąc na krze lodowej, w chwili, gdy mors wychyla się z wody. Najlepszym do łowów jest koniec lata, kiedy kra pływa, a woda pokryta jest cienką warstwą lodową. Głównym celem polowania europejczyków na morsy są kły, które przewyższają

twardością i białością kość słoniową; Eskimosi zaś, oprócz kłów, używają mięsa i tłuszczu na pokarm, skóry na podezwy i na liny do harpunów.

Rząd XIV. Wieloryby czyli Walenie.

103. Ostatnią grupę zwierząt ssących stanowią **Wieloryby**, największe ze wszystkich istot zwierzęcych; odznaczają się kształtem ciała zupełnie do ryby podobnym, zakończonym rozdwójonym płetwowatym ogonem; przednie odnóża mają przekształcone w płetwy, tylnych brak. Skóra naga, pod nią gruba warstwa tłuszczu, tułów zakończony wielką głową bez szyi, nozdrza na czole, służące do wyziewania powietrza i wody, która wytryska nieraz na wysokość masztów okrętowych; uszu zewnętrznych niema. Paszcza ogromna, opatrzona jest *zębami albo bezzębna*, tylko w górnej szczęce znajduje się szereg długich prętów rogowych, zw. *fiszbinem*. Oddychają, tak jak wszystkie ssące, płucami, dlatego też muszą wypływać z wody na powierzchnię dla zaczerpnięcia powietrza, chociaż mogą nawet pół godziny pod wodą pozostawać. Na ląd nigdy nie wychodzą. Żywią się rybami i innymi zwierzętami morskimi. Zamieszkują wszystkie morza.

104. Do *uzębionych wielorybów* należy **Narwal** czyli **Zęborożec** (*Monodon monoceros*) (fig. 129), którego samiec ma w górnej szczęce jeden ząb, długi do 3 metrów, spiralnie skręcony, służący mu do obrony. Zwierzę to, wielkości do 5 metrów, ma skórę połyskującą, białą lub żółtawą w ciemne podłużne cętki. Zamieszkuje północne morze Łodowate, żyje w licznych gromadach, żywi się mięczakami, rybami, wogóle istotami małemi, ma bowiem paszczę tak małą, że ledwie pięść człowieka może się w nią zmieścić.



Fig. 129. Narwal.

Łowią narwala dla jego zęba, który jest więcej ceniony niż kość słoniowa i używany bywa na ozdoby do świątyn

indyjskich. Grenlandczycy jedzą jego mięso, tłuszczu używają do lamp, ścięgna i kiszki na struny i nici. Polowanie na narwale jest trudne, bo zwierzęta te są bardzo czujne i zwinne.

Strasznym rabusiem morskim jest **Delfin** (*Delphinus*), żyjący gromadami we wszystkich europejskich morzach. Ciało ma długie na dwa metry, skórę ciemno - popielatą, spodem białawą, mieniającą się; płetwa grzbietowa bardzo wysoka. Pysk zaostrowany w kształcie dzioba, w paszczy liczne zęby, służące zwierzęciu do chwytania pokarmów. Żywi się śledziami i innymi zwierzętami morskimi; lubi także towarzyszyć okrętom i połyka resztki potraw rzucone w morze.

W północnych okolicach oceanu Atlantyckiego i Spokojnego żyje olbrzymi gatunek Delfina, zwany **D. szablógrzbiet** z powodu mieczowatej płetwy grzbietowej. Dosięga on 9 metrów długości, a jest tak żarłoczny, że rzuca się na foki, napada gromadnie nawet na bezzębnego wieloryba i szarpie mu ciało w kawałki.

Do tej samej grupy należy **Kaszalot** czyli **Pottwal** (*Physeter macrocephalus*) (fig. 130), wielkości około 20 metrów,




Fig. 130. Kaszalot.

odznaczający się wielką kwadratową głową, mającą do 5 metrów długości, w której znajduje się płynna masa, krzepnąca na powietrzu, zw. *olbrot*. Z jednej głowy pottwala można wydobyć około 20 beczek olbrotu. Masa ta

używaną jest do wyrobu świec i jako lekarstwo. Z tłuszczu robią tran. Zwierzę to wydziela z siebie także ciecz wonną, zwaną *ambra*, używaną jako lekarstwo i pachnidło. Kaszalot żyje stadami w morzach strefy gorącej; płynie, pokazując od czasu do czasu swe ogromne ciało wśród wzburzonej fali morskiej. Łodzie muszą mu się usuwać z drogi, bo uderzeniem ogona może je wyrzucić. Barwa ciała jest matowo-czarna, spodem biaława.

105. Z bezzębnych wielorybów najważniejszym jest **Wieloryb grenlandzki** (*Balaena mysticetus*) (Tab. III, fig. 11), zamieszkujący brzegi Grenlandji. Dochodzi do 20 metrów długości, a waży tyle ile 60 słońi. Barwę skóry ma czarną,

spodem białą. W paszczy, tak olbrzymiej, że może się w niej cała łódź z człowiekiem zmieścić, znajdują się w górnej szczęce długie *fiszbiny*, stanowiące jakby sito. Przez to sito przepuszcza wieloryb wodę, pozostawiając sobie pobrany z niej pokarm. Żywi się tylko drobnymi istotami morskimi, bo ma bardzo wąskie gardło; musi się więc dobrze napracować, zanim się nasyci. Jest bardzo bojaźliwy, nawet przed ptakami ucieka. Podróżni przez ocean często widują zdala fontannę wodną wyrzucaną przez nozdrza tego olbrzyma. Poławiany jest dla tranu i fiszbinu, którego jeden wieloryb dostarcza do 2,500 funtów. Łowią go za pomocą broni palnej lub harpunów, które rzucają z łodzi w chwili, gdy wieloryb wynurza się z wody dla nabrania powietrza. Zabitego wieloryba umocowują łańcuchami do statku i majtkowie obuci w trzewiki podkute gwoździami, chroniące od pośliznięcia się na gładkiej, mokrej skórze, zstępują na ciało wieloryba; za pomocą toporów i wielkich noży płatają tłuszcz w długie, szerokie pasy. Po wybraniu fiszbinu, pozostałość nie przedstawiająca już żadnej wartości, oddana zostaje na wolę fal i wiatrów, a ptactwo morskie i ryby uczują na niej dowoli.




Fig. 131. Fiszbiny.




Fig. 132. Wieloryb północny.

Olbrzym ten ma nieprzyjaciół między zwierzętami. Oprócz mnóstwa pasożytów, które zagnieżdżają się w jego skórze, języku i wogóle w częściach miękkich, prześladowuje go jeden z najodważniejszych drapieżników morskich — *szablogrzbiet*, o którym wyżej była mowa.

Największym pod względem długości zwierzęciem na świecie jest **Wieloryb północny** (*Balaenoptera borealis*) (fig. 132), dosięgający 30 metrów; jest smuklejszy od zwykłego; żyje zwykle stadami lub parami, płynąc często za olbrzymimi ławami śledzi, które w ogromnej ilości połyka. Napadnięty,

broni się odważnie, to też mniej budzi chciwość człowieka, zwłaszcza, że i fiszbin z niego jest gorszy, a tłuszcz mniej obfity.

106. Ze zwierząt ssących, żyjących w morzu, znanych



Fig. 133. Diugon.



Fig. 134. Manat (Brzegowiec).

jest jeszcze kilka gatunków podobnych do fok i do wielorybów, ale różniących się sposobem życia; karmią się bowiem tylko roślinami morskimi. Dla-

tego stanowią osobną grupę, zw.

Wielorybami roślinożernymi (*Sire-*

nia). Należy tu **Diugon** (fig. 133),

żyjący w oceanie Indyjskim, **Ma-**

nat (fig. 134), zamieszkujący mo-

rza ciepłe Ameryki i Afryki i od

stu lat już wytępiona **Krowa mor-**

ska (fig. 135), dawniej żyjąca w

morzu Behringa w wielkich sta-

dach; dostarczała bardzo smacznego mięsa i obfitość tłuszczu.




Fig. 135. Krowa morska,

KLASA II. PTAKI.

107. Ptaki również jak i zwierzęta ssące, mają szkielet kostny i krew ciepłą, czerwoną. Oddychają płucami i składają jaja o twardej skorupie, na których siedzą, póki młode z nich się nie wyklują. Ciało ich okryte pierzem, a kończyny przednie przekształcone są w skrzydła, pozwalające unosić się na znaczną wysokość i przelatywać ogromne przestrzenie; kładą one osobliwe piętno na tryb ich życia.

Wśród 120,000 znanych gatunków ptaków, niewielka tylko stosunkowo liczba należy do stałych mieszkańców pewnej miejscowości (*ptaki miejscowe*). Większa część spędza w krajach północnych lato, a zwłaszcza czas, potrzebny na zniesienie jaj i wysiedzenie piskląt. Skoro tylko dorosną one tak, iż mogą lecieć, cała gromada wraca do krajów cieplejszych (*ptaki wędrowne*). Znana jest przytem stałość, z jaką ptaki wędrowne wracają do swych dawnych miejsc pobytu, a nawet odszukują dawne swe gniazda (bociany, jaskółki).

Unosząc się tak wysoko nad ziemią, czy to dla poszukiwania pokarmu, czy dla znalezienia swego gniazda, ptak potrzebuje bystrego wzroku. Zmysł ten jest istotnie u nich nadzwyczajnie rozwinięty. Sępy, unoszące się na taką wyso-




Fig. 136. Szkielet ptaka. AK—głowa, B—szyja, C—łopatka, D—żebra, E—obojczyk (widełki), G—mostek, FHI—nogi, P—ogon, JMN—skrzydła.

kość, że oko ludzkie ich nie dojrzy, z łatwością z niej dostrzegają padłe zwierzę. Pierwszy, który je zobaczy, spada szybko w tym kierunku, a inne ptaki, bujające w pewnej odległości, widząc tak skierowany lot swego towarzysza, podążają za nim tłumnie.


Tą bystrością wzroku ptaków posługują się niektóre zwierzęta trawożerne: antylopy i zebry, pasące się na stepach Afryki, chętnie przyłączają się do strusiów; ptaki te, górując nad niemi długą szyją, bystrem swem okiem przeglądają pustynię i przy najmniejszym niebezpieczeństwie porywają się do biegu, czem dają hasło czworonożnym.

Podział ptaków.

Podstawą podziału ptaków na rzędy jest budowa ich nóg i dziobów, które zostają w ściślejszej zależności od trybu ich życia i rodzaju pożywienia. O ośmiu rzędach, na które dzieli się ta klasa, daje pojęcie następująca tablica:



1. Biegające cz. krótkoskrzydłe (przykład: struś).






2. Wodne cz. płetwonogie (przykład: kaczka).



3. Podkasałe cz. brodzące (przykład: bocian).



4. Grzebiące cz. kurowate (przykład: kura).





5. Gołębie (przykład: gołąb).



6. Drapieżne (przykład: sokół).



7. Śpiewające
(przykład: słowik).



8. Łażące cz. dwuparzystopalcowe (przykład: dzięcioł).

Rząd I. Drapieżne.

108. Ptaki drapieżne mają dziób zakrzywiony i bardzo mocny; u podstawy jego znajdują się otwory nosowe, otoczone skórą; nogi o silnych palcach, zakończonych ostre szponami. Dziób i szpony są to narządy do chwytania i rozdzierania zdobyczy, którą stanowią różne mniejsze zwierzęta o krwi ciepłej, t. j. ssące lub inne ptaki.

Gniazda wiją najczęściej na szczytach skał lub na wysokich drzewach. Szybkość ich lotu jest ogromna, również jak wysokość, na którą wzbijać się mogą.

Gdy Humboldt, wchodząc na Chimborasso (w Ameryce południowej), musiał się zatrzymać, z powodu, że zbyt rzadkie powietrze czyniło oddychanie uciążliwym, widział jeszcze nad sobą kondora na takiej wysokości, że wydawał się jako punkcik.

Ptaki drapieżne polują w ten sposób, że krążą w powietrzu (zataczają koła) i z wysokości spadają nagle na upatrzoną ofiarę.

Jest przeszło 500 gatunków ptaków drapieżnych; dzielą się one na **dzienne** i **nocne**. Pierwsze obejmują rodziny *sepów* i *sokołów*, drugie—*sów*.

a) Ptaki drapieżne dzienne.

109. Sępy odznaczają się głową nagą, albo pokrytą tylko rzadkim puchem (z wyjątkiem Orłosępa); jako tępiciele trupów pełnią ważną rolę w gospodarce natury. Dzicy wyrzucają nieżywe ciała zwierząt i rozmaite odpadki domowego gospodarstwa wprost przede drzwi, a wszystko to w krótkim czasie zostaje uprzątnięte przez sępy.

110. **Kondor** (*Sarcorhamphus gryphus*) (Tab. IV, fig. 1) żyje w Andach, w Ameryce południowej. Jest to największy z ptaków drapieżnych; rozpostarte skrzydła jego mają do 3 metrów długości, szyja naga, naokoło niej biały kołnierz, na głowie grzebień skórny. Żywi się trupami lam, wigoni i innych zwierząt; napada też i na żywe. Samica znosi jedno tylko jajo. Na człowieka nie napada. Indianie chwytają go żywcem i używają do okrutnej zabawy z bykiem, któremu sadzają na karku wygłodzonego poprzednio kondora i lubują się, jak on szarpie żywe mięso nieszczęśliwego bydłęcia.

111. Pomiędzy sępami starego ładu pierwsze miejsce zajmuje, z powodu swej użyteczności, **Ścierwnik** czyli **Ścierwojad** (*Neophron perenopterus*) (fig. 137) o upierzeniu brudno - białem, grzbiet i podbrzusze zupełnie białe; kark upierzony, policzki nagie, głowa mała. Mieszka w południowo - wschodniej Europie, oraz na całym Wschodzie. Jest to ptak brzydki, ale niesłychanie pożyteczny, zjada bowiem wszelką padlinę i wszystkie gnijące odpadki zwierzęce, których tam nie



Fig. 137. Ścierwojad.

uprzątają. Wypełnia on tam zatem obowiązki straży zdrowia,




Fig. 138. Wężojad.

w czym pomagają mu psy dzikie, szakale i hijeny.

Wybitnie wyróżniającym się tak co do kształtu, jako też i sposobu życia jest **Sekretarz-Wężojad** (*Serpentarius secretarius*) (fig. 138) wielkości żórawia, o ciele ptaka drapieżnego, koloru szaro - brunatnego, na wysokich nogach, dziób jak u ja-

strzębia; na tyle głowy ruchoma kitka z piór. Żyje w środku Afryki, gdzie biegając i skacząc, poluje na małe zwierzątka i owady, ale głównie na gady: węże, nawet najjadowitsze, stanowią jego ulubione pożywienie. Napada na nie odważnie, ale ostrożnie i potrafi zawsze je opanować; dopóty do nich przyskakuje, dopóki łapą bez szkody dla siebie nie przygniecie ich do ziemi; wtedy dopiero szarpie i pożera.

Orłosęp czyli **Sęp brodaty** (*Gypaëtus barbatus*). Jest to największy z ptaków drapieżnych europejskich. Znajduje się w Alpach i Pirenejach, ale dziś już rzadki. Ma głowę i szyję okryte pierzem, nogi są również do połowy długości pierzem porośnięte. Sięg samca mierzy dwa, samicy trzy metry. Gniazdo buduje na najniebezpieczniejszych skałach, w rozpadlinach. Jest to śmiały i niebezpieczny drapieżnik, ogromnie silny. Rzuca się na jagnięta, kozłeta, zające, spadając na nie ze zwiniętymi skrzydłami. Mniejsze unosi w powietrzu, większe pożera na miejscu. Jeśli ujrzy większe zwierzę, np. kozę lub owcę, stara się je nastraszyć i napędzić na brzeg urwiska, a wtedy strąca je skrzydłem i sam spuszcza się w przepaść, aby pożreć zgruchotane zwierzę. Orłosęp rzuca się i na dzieci: pewien chłopiec czternastoletni o mało że nie padł ofiarą tego drapieżnika, od którego uwolniła go dopiero obca pomoc.

Jastrząb Gołębiarz (*Astur palumbarius*) (Tab. IV, fig. 3), ciemno - szaro - brunatny, spód jaśniejszy, dziób czarny, nogi żółte, rozpowszechniony jest w całej Europie; bardzo szkodzi. Gniazda wije na wysokich drzewach. Jest to nienasycony, zuchwały i chytry rozbójnik. Szybki w ruchach, rzuca się na ptactwo domowe, szczególnie na gołębie, na które spada z góry i prześladowuje tak zawzięcie, że zapędza się za nimi aż do gołębnika. Czatuje zwykle na brzegu lasu i napada na wszelkie ptactwo, zające i sarenki.

Bardzo podobny do niego, ale mniejszy, jest **Krogulec** (*Accipiter nisus*) (fig. 139), rozpowszechniony w Europie; także bardzo niebezpieczny drapieżnik, krwiożerczy, zuchwały i zwinny, morduje mniejsze ptaszki.



Fig. 139. Krogulec.

Równie drapieżne są rozmaite **Kanie**, o ciemniejszym miękkim upierzeniu, niszczące wszelkie ptaki, które napadają

szczególnie w gniazdach. **Kania właściwa** (*Milvus iclinus*) (fig. 140) rzuca się na małe gęsi i kurczęta, ale niekiedy pada ofiarą odważnego gąsiora; zjada także żaby, myszy, szczury i śnięte ryby.



Fig. 140. Kania właściwa.

112. Rodzina **Myszołowów** obejmuje ptaki istotnie pożyteczne, które należy ochraniać, bo choć wprawdzie niektóre gatunki zjadają czasami jakiego drobnego ptaszka lub małego zajaczka, lecz przeważnie żywią się myszami. Należą do nich: **Węzojad** (*Circæus gallicus*), łowiący przeważnie węże, jaszczurki i żaby; **Berkut**, żyjący na stepach we wschodniej Rosji i Azji, oraz nasz miejscowy **Myszołow** (fig. 141), barwy brunatnej, polujący wyłącznie na myszy w polu i w lesie; zjada ich dziennie najmniej po 10 sztuk, jest przeto bardzo pożytecznym i zasługuje na ochronę.



Fig. 141. Myszołow.

113. Jako przejście od jastrzębi i myszołowów do **orłów**, które właściwie są tylko doskonale rozwiniętymi jastrzębiami, może być uważany **Orzeł rybołów** (*Pandion haliaëtus*) (fig. 142), mieszkający we wszystkich krajach i żywiący się wyłącznie rybami, które chwytają nie tylko na powierzchni wody, ale spadając nagle z powietrza, wyciąga z głębi.



Fig. 142. Orzeł rybołów. i padlinę.

Mniejszy nieco jest **Orzeł bielik** (*Haliaëtus albicilla*), którego sięg dochodzi do 2 m., ma ogon biały; mieszka w całej Europie. Gnieździ się na niedostępnych skałach. Posądzają go również o porwanie dzieci; w każdym razie jest bardzo silny, zuchwały i krwiożerczy. Szczególniej prześladowa kaczki, które ratują się od niego nurkowaniem lub lotem, gdyż w locie nie może ich pochwycić. Napada na zajęce, króliki, lisy, na wszelkie zwierzęta, którym może dać radę; pożera także ryby

114. Właściwym przedstawicielem orłów jest **Orzeł przedni** (*Aquila fulva*) (Tab. IV, fig. 4), ma upierzenie ciemno-brunatne, na podgardlu prawie czarne; nogi upierzone aż po palce. Po *bieliku* jest to największy z europejskich ptaków drapieżnych. Nadzwyczajna siła lotu tego orła, szybkość i zwinność jego, straszna potęga uderzenia skrzydłami i szponami, iskrzące spojrzenie dzikiego, krwią nabiegłego oka, czynią go najstraszniejszym wrogiem zwierząt i ptaków; żadne nie jest od jego szponów bezpieczne; młode sarny, zające, jagnięta, koźlęta, koty, borsuki, szczury, wszelkie ptactwo dzikie i drób domowy, łabędzie, dropie — wszystko ten zbój porywa i obżera się swojemi ofiarami do tego stopnia, że nie może się zerwać do lotu. Trapiiony głodem, staje się tak zuchwałym, że zbliża się do wiosek i porywa wszystko, co się nadarzy. Chwyta nawet małe dzieci.

115. Ostatnią grupę w rządzie dziennych ptaków drapieżnych stanowią **Sokoły**, ptaki niewielkiego wzrostu, ze ściśle



Fig. 143. Białozór. Fig. 144. Sokół wędrowny. Fig. 145. Kobuz.

przylegającym pierzem, upierzoną głową i szyją, z krótkimi nogami ale długimi, silnymi palcami i szponami. Pomiedzy wszystkimi ptakami drapieżnymi są one najzmyślniejsze, ale też i najbardziej zbójcekie. Pierwsze miejsce między nimi zajmuje **Sokół łowczy** czyli **Białozór** (*Falco gyrfalco*), (fig. 143). Żaden też inny nie dorównywa mu w bystrości lotu i w śmiałości uderzenia. Dawniej używano tych ptaków, specjalnie do tego wyuczonych, do łowów na czaple, żorawie, bażanty i t. d. Ojczyzną sokołów są kraje północne, gdzie widać gniazda na skałach. Do nich należy: **Sokół wędrowny** (fig. 144), **Sokół Rarog**, **Pustułka** i **Kobuz** (fig. 145), mający 31 centym. długości i 79 cm. sięgu.

b) Ptaki drapieżne nocne.

116. Ptaki te odznaczają się tem, że mają w grubej głowie wielkie, okrągłe, świecące, żółte oczy, zwrócone wprost ku przodowi (nie na bokach głowy, jak inne) i otoczone promienistym wieńcem wązkich piór, odmiennie zabarwionych, tworzącym t. zw. *szlarę*, nogi gęsto upierzone. Wylatują zwykle w nocy na żer, w dzień śpią; lot mają bardzo cichy, nie wydający żadnego szelestu wskutek miękkiego upierzenia, które jest rdzawe z cętkami czarnymi i białymi. Inne ptaki nie lubią sów i prześladują je, goniąc je gwarnie, skoro się ukazą.

Sowa rdzawa (*Strix flammea*), długości ma 35 centymetrów; skrzydła rozpostarte zajmują około metra. Upierzenie rdzawo-żółte, cętkowane i kropkowane szaro. Szlarka biała otacza ciemne, duże oczy. Mieszka zwykle w pobliżu siedzib ludzkich, na poddaszach kościołów, na wieżach, w zwaliskach i stodołach. Często chowa się do gołębnika, ale nigdy nie robi tam szkody; przeciwnie, przestraszone w pierwszej chwili gołębie, wkrótce się z nią oswajają i sowa zostaje ich stałą współlokatorką, składając jaja obok ich gniazd. Żywi się prawie wyłącznie myszami; pożera też i inne szkodliwe dla rolnictwa zwierzęta: szczury, polniki i chrabąszcze. Jest więc pożyteczną dla człowieka.

Puszczyk (*Syrnium aluco*) (fig. 146), znajduje się w całej Europie, gdzie tylko są lasy i drzewa; oczy ma ciemniejsze aniżeli inne sowy, prawie czarne. Jaja składa zwykle w dziupli, gdzie też spędza dzień. Za nadejściem zmroku wychodzi z ukrycia, otrząsa pierze, wyciąga się, kiwa kilkakrotnie grubą swą głową i leci szukać zdobyczy. Poluje przeważnie na myszy, krety, chrabąszcze; pisklęta innych ptaków stanowią dla niego również pożądane pożywienie.



Fig. 146. Puszczyk.

Puhacz (*Bubo maximus*) (Tab. IV, fig. 5), jest to największa z sów „uszatych,” t. j. mających po kępce piór nad uszami. Ma czarno-brunatne cętki i pręgi na jasno-brunatnem tle. Mieszka najczęściej w lasach, w górach, w okolicach skalistych, w zwaliskach starych zamków. Tam zakłada gniazdo, zwykle niedbale zbudowane,

w których już w marcu składa samiczka 3 jaja. Z nich wyłoga się zwykle tylko dwoje piskląt, podobnych do kłębków pierza.

Puhacz jest bardzo śmiały; napada na rozmaite ptaki śpiewające, oraz na kuropatwy, jarząbki, bażanty, cietrzewie, także na zajace, a nawet na małe jelenie i sarnięta; potrzebuje bowiem dużo pożywienia dla siebie i dla piskląt; tępi również myszy, szczury i węże. Głos jego jest ponury, podobny do jęku i niemile razi w ciszy nocnej.

Żaden inny ptak nie jest tak nienawistny dla ptaków dziennych, jak puhacz. Skoro go tylko zobaczą, natychmiast wszystkie w okolicy znajdujące się ptaki drapieżne, sójki, wrony, otaczają go rojem. Ostatnie mają słuszny do tego powód, gdyż wszystkie ptaki z rodzaju kruka stanowią ulubioną zdobycz puhacza. Strzegą się one jednak zbliżyć do jego szponów. Puhacz jednak woli w dzień ujść przed przemagającą siłą i chroni się do swej kryjówki przed prześladowającymi go ptakami, pewny, że z nastaniem zmroku potrafi sobie powetować hańbę poniesionej klęski.



Fig. 147. Sowa uszata leśna.

Sowa uszata leśna (*Asio otus*) (fig. 147) jest bardzo do puhacza podobna, tylko nieco mniejsza; niezmiernie użyteczna, żywi się bowiem tylko myszami.

Jeszcze mniejszą od niej jest **Sówka** (*Tab. IV, fig. 2*), gdyż siąg jej wynosi zaledwie 50 cm.: również użyteczna.

Do małych sów należy także sowa, zwana „**Pójdźką**“ (fig. 148), przebywająca w pobliżu mieszkań ludzkich. Życie pędzi samotne; wydaje tęskny głos, który przetłómaczono na wyraz „pójdź,” stąd jej nazwa.



Fig. 148. Pójdźka w gnieździe.

Rząd III. Łączące czyli dwuparzysto-palcowe.

117. Mają po dwa palce skierowane naprzód i dwa w tył; jeden tylny palec jest u niektórych tak długi, że może być łatwo naprzód obrócony. Pazury długie, mocne i haczykowate, co ułatwia im nietylko wchodzenie na drzewa i trzymanie się, ale i spuszczenie się z nich po pniach i gałęziach. Są przeważnie mieszkańcami lasów, żywiącemi się owadami i owocami. Kształty ciała ptaków łączących są bardzo rozmaite, podobnie jak sposób ich życia. Rozróżniamy w tym rzędzie dwie gromady: **papugi** i **łączące właściwe**.

Z nich **Papugi** są najładniej upierzone, najżywsze, najmądrzejsze i dla człowieka bardzo powabne; mają nogi, dozwalające im z wielką łatwością wlażyć na drzewa, chwytając pokarm i nieść go do dzioba. Dziób mają duży, zakrzywiony, przypominający dziób ptaków drapieżnych, silny; górna część jego jest półkolisto zakrzywiona z haczykowatym końcem, wystającym po za dolną część dzioba; służy on do chwytania, ogryzania, skrobania; chwytając za gałązkę posługują się nim przy łożeniu. Język mają gruby i mięsisty, co pozwala niektórym naśladować mowę ludzką, ale głos większej części papug jest chrapliwy i wrzaskliwy. Skrzydła dobrze rozwinięte, a ogon, składający się zawsze z 12-tu piór, bywa rozmaitej długości i kształtu. Papugi są bardzo liczne, różnej wielkości, zamieszkują gorące strefy Azji, Afryki, Ameryki i Australji, a najwięcej ich jest w Nowym Świecie. Wszystkich gatunków liczą około 450. Wiele z nich odznacza się pięknem jaskrawem upierzeniem; niektóre, podobne do sów, są ptakami nocnymi.



Fig. 149. Kakadu.

Papugi są towarzyskie i łączą się w liczne kolonje. Miejsce na gniazda obierają zwykle w dziuplach drzew, które dziobem rozszerzają. Pożywienie ich składa się przeważnie z ziarn i owoców, także i z owadów.

118. **Kakadu** są to duże papugi, wszystkie prawie ozdobione czubem na głowie.

Kakadu o żółtym czubie (*Plissolophus geleritus*) (fig. 149) ma upierzenie białe, dziób czarny.

Znajdują się także *kakadu różowe*; pochodzą z Australji, są ruchliwe i pojętne, często bywają trzymane w klatce. Należąca do tej gromady papuga **Ki** (*Nestor notabilis*), barwy oliwkowo-zielonej, bez czuba, o dziobie podobnym do dzioba ptaków drapieżnych, dawniej żywiła się wyłącznie owocami i owadami; od czasu zaś rozwoju na Nowej Zelandji chowu owiec, zasmakowała w ich mięsie i stała się plagą osadników. Jest to ptak dziki, rzuca się na trzody, rozpędza owce, wydziera im wełnę, robi dziury w ciele i wyrwa kawałkami mięso, tak, że owce giną. W r. 1884 w pewnej miejscowości wielkie stado tych papug napadło na trzodę młodych owiec i w ciągu jednej nocy pokaleczyło straszliwie 200 sztuk.

Papuga popielata zw. **Jako** (*Psittacus erithacus*) (Tab. IV, fig. 7), jest papugą popielatą z czerwonym ogonem; mieszka gromadnie w lasach pierwotnych Sudanu, skąd napada na pola kukurydzowe negrów. Najłatwiej znosi niewolę, jest bardzo pojętna, łatwo więc wyucza się gwizdać i powtarzać słowa lub zdania, lecz jest nadzwyczaj hałaśliwa.

Ara (*Sittace*) (fig. 150), stanowi odmianę amerykańską; odznacza się potężnym dziobem, wysmukłą postacią i długim ogonem. Ubarwiona bywa niebiesko, popielato, czerwono, żółto lub zielono. Należy do najozdobniejszych ptaków naszych ogrodów zoologicznych.

Do papug długoogonowych należy także **Papuga obroźna** (Tab. IV, fig. 6), upierzona zielono z czerwoną obrózką na szyi. Zamieszkuje Azję i Afrykę.

W rodzinie papug znajduje się wiele gatunków drobnych **Papuzek**, ładnie upierzonych, najczęściej zielonych z niebieskimi lub czerwonymi odmianami. Niektóre są wielkości kanarka.

119. *Właściwe łązące* mają nogi słabsze, niezastosowane do chwytania, i dziób odmienniejszej budowy.

Do zwrotnikowych należy **Tukan** czyli **Pieprzoad** (*Ramphastus magnirostris*) (Tab. IV, fig. 9), wielkości wrony, o długim, mocnym dziobie koloru pomarańczowego, mieszka w gęstwinach dziewiczych lasów Brazylii. Dziwaczny kształt łączy z jaskrawem upierzeniem. Indianie polują na niego



Fig. 150. Ara.

dla piór, słabo zatrutemi strzałami, odurzającemi chwilowo tukana; wtedy chwytają go i wyrwawszy pióra, puszczaają na wolność ptaka, który niebawem przychodzi do siebie i porasta w nowe pióra. Tukan żywi się owocami.

Żołna czyli **Dzięcioł czarny** (*Picus martius*) (Tab. IV, fig. 18), jest to największy z naszych dzięciołów. Głowę ma małą, dziób dłutowato zaostrzony. Upierzenie jego jest czarne, z wyjątkiem karminowej łatki na głowie. Dosięga wielkości 50 cm. Mieszka w lasach sosnowych całej Europy. Pilnie przegląda wszystkie drzewa lasu, żywi się bowiem przeważnie owadami, żyjącami pod korą drzew; siedzi zwykle na drzewie, oparty na niem ogonem i stuka w miejsca puste dziobem, którym przebija korę, a długim, wysuwalnym językiem, zaopatrzonym na końcu małym haczykiem, wydobywa z pod kory gąsienice i ich poczwarki. Stare i murszałe drzewa są koniecznym warunkiem jego istnienia: w ich bowiem dziuplach, które rozszerza, buduje sobie gniazda; wyniszczanie takich drzew nadpsutych i robaczywych w lasach wyruguje jednocześnie tego pożytecznego w gospodarce leśnej ptaka.

Dzięcioł pstry (*Picus major*), jest najbardziej pospolity; upierzenie jego czarne i białe, samczyk ma szczyt głowy czerwony.

Dzięcioł średni (*Picus medius*), mniejszy od poprzedniego, ma prawie całą głowę czerwoną.

Dzięciołek (*Picus minor*) ma tylko 16 cm. długości; podbrzusze i tylna część ciała są białe.

Dzięcioł zielony (*Picus viridis*) (fig. 151) ma do 30 cm. długości, wierzch zielony, spód szaro-żółtawy, głowę czerwoną, a koło oczu czarną; skrzydła i ogon brunatne. Lubi przeważnie rzadkie lasy i gaje.



Fig. 151. Dzięcioł zielony.

Wszystkie te gatunki dzięcioła mają budowę ciała jednakową i jednakowe prowadzą życie.

Kukułka (*Cuculus canorus* (Tab. IV, fig. 8), dosięga wielkości gołębia; jest ptakiem przelotnym; spotyka się w całej Europie, a także w Azji i Afryce. Przylatuje do nas w połowie kwietnia, a wesołe jej kukanie jest zwiastunem

wiosny. Mieszka zwykle w lasach, zarówno iglastych jak i liściowych; młodsze żywią się jagodami, starsze chwytają chrabaszczce i włochate gąsienice, których inne ptaki nie jadają; dlatego są bardzo pożyteczne.

Osobliwością kukułki jest to, że gniazda nie wije, lecz składa jaja swoje w gniazdach innych ptaków, zwłaszcza śpiewających, zostawiając im wysiadanie i opiekę nad swemi pisklętami. Wyszukuje przytem bardzo zręcznie odpowiednie gniazdo, głównie ptaków owadożernych. Jeśli otwór do gniazda jest za mały, to znosi jajo na brzeжку jego i spycha je następnie dziobem do środka. Wylęgłe w cudzem gnieździe pisklę kukułki zaczyna swój zawód od tego, że wyrzuca na zewnątrz prawe potomstwo swoich karmicieli, aby korzystać wyłącznie z troskliwości i opieki przybranych rodziców, którzy je karmią, przynosząc mu robaczki i opiekują się niem jakby własnym dzieckiem (fig. 152).



Fig. 152. Pisklę kukułki karmione przez pokrzewkę.

W gorących strefach znajduje się około 200 gatunków kukułek, które przeważnie wiją własne gniazda.

Rząd III. Śpiewające.

120. Nie wszystkie do tego rzędu należące ptaki są we właściwym znaczeniu słowa śpiewakami; wszystkie wszakże posiadają odpowiedni narząd głosowy, za pomocą którego wydawać mogą pewne tony. Najliczniejsza to gromada ptaków, zawierająca około 5,000 gatunków, przeważnie niewielkich, a w naszym klimacie skromnie zabarwionych. Są to głównie mieszkańcy stref umiarkowanych, żywiący się owadami i dlatego użyteczne człowiekowi, a przyjemne z powodu swego śpiewu, nadającego urok gajom i zarośłom.

Należy tu rodzina **Dzierzb** (*Lanideae*), licząca do 300 gatunków, z których najwięcej u nas znane są: **Srokosz** (*La-*

nus excubitor) (Tab. IV, fig. 13), żywiący się myszami, drobnymi ptakami i owadami; **Dzierzba właściwa** (*Lanius minor*) i **Gąsiorek** (*Lanius collurio*). Łowią one owady, które wbijają na ostry cierń, a potem pożerają.

„Zupełnie napozór niewinnie siedzi ptak ten (gąsiorek) na drzewie, jakby zwykły śpiewak, lecz po wciąż niespokojnie latającem jego oku uważny spostrzegacz widzi, że ta pozorną obojętność jest maską obłudy. To się wyprostowywa i głowę obraca na wszystkie strony, to przysiada; nagle spada na dół jak błyskawica i zaraz powraca na swoje miejsce, ale już z konikiem polnym w dziobie. Owad siedział spokojnie w trawie, wygładzał swoje skrzydełka i ćwierkaniem okazywał rozkosz, jaką mu sprawiały ciepłe promienie słońca, w chwilę potem jest nadziany na cierń, gdzie już znajduje się kilka innych owadów, poruszających nogami w przedśmiertnej męczarni. Morderca ich siedzi na swoim miejscu; głód dawno już zaspokoił, ale pomimo to nie przepuści żadnej ofierze i każdą, jaką tylko zdoła pochwycić, nadziewa na rożen, służący mu za spiżarnię. Znowu podnosi głowę i rozgląda się dokoła, śledząc pilnie ruchy w trawie; oczy mu błyszczą, ożywione nadzieją pochwycenia nowego smacznego kąska, a dziób to otwiera, to zamyka. Szelest skrzydełek zdradza obecność w trawie małych ptasząt, które dopiero co opuściły gniazdo. Morderczy ptak ostrzy swój dziób i nie napróżno, bo oto jedno z ptasząt wzbija się z gęstwiny i... w jednej chwili staje się łupem mordercy, który porwawszy swą zdobycz, unosi ją na dawne swe miejsce i nadziewa drgającą na nowy cierń w swojej spiżarni. Tak czynią wszystkie większe gatunki dzierzb; mniejsze muszą po-przestawać jedynie na owadach.”

121. **Pliszka siwa** (*Motacilla alba*) (Tab. IV, fig. 15), z wierzchu siwa, pod spodem biała; na podgardlu, na głowie i na karku czarna. Żadny ten, wesoły i ruchliwy ptaszek, mający 26 cm. długości, jest jednym ze zwiastunów wiosny: przylatuje w marcu, a odlatuje w październiku. Polot ma bystry, łukowaty. Spotyka się przeważnie na polach i koło wód; ciągle rusza głową i ogonem. Gniazda wije niedbale w dziuplach drzew, jak również na murach i budynkach. Pokrewna jej **żółta pliszka** jest mieszkanką łąk i błot i prawdziwym dobroczyńcą bydła i owiec, uwalnia je bowiem od dokuczliwych owadów: much, gzów i innych.

Wilga (*Oriolus galbula*) (Tab. IV, fig. 10) jest ptakiem przelotnym: przylatuje w maju, a odlatuje już w końcu lipca. Jest bardzo ostrożna i płochliwa, chociaż chętnie przebywa w sąsiedztwie mieszkań ludzkich. Skacze i fruwa wśród najgęstszych gałęzi drzew.— Śpiew jej, dźwięczny i silny, przypomina dźwięki fletu, a rozpoczyna się równo ze świtem. Jest to ptak kłótniwy. Gniazda wije bardzo sztucznie, w kształcie koszyka, na drzewach w rozwidleniu gałęzi (fig. 153). Samiec jest prawie całkiem żółty, skrzydła i ogon ma czarne; samiczka zielonawa. Żywi się przeważnie gąsienicami, także i jagodami.



Fig. 153. Gniazdo wilgi.

Szpak (*Sturnus vulgaris*) (fig. 154). Towarzyski ten ptak jest czarny, połyskujący pięknym fioletowym i złocisto-zielonym kolorem, z brzegami piór jasno-rdzawymi. Przylatuje o wczesnej wiosnie, a odlatuje późno w jesieni; zimę spędza w Afryce. Gnieździ się na drzewach i w dziuplach lub umyślnie dla niego urządzonych skrzynkach, koło których świergocze donośnie. Jest to ptaszek mądry, wesoły, zabawny i bardzo pożyteczny, gdyż niszczy ogromną ilość szkodliwych owadów, robaków i ślimaków. Skoro tylko szpak przyleci na wiosnę, skleca naprędce gniazdko, gdzie samiczka składa sześć jaj niebieskawo-zielonych. Wysiaduje je wtedy naprzemian z samcem, a gdy wylęgną się pisklęta, rodzice latają nieustannie za żywieniem. Skoro młode dorosną i mogą latać, wtedy pojedyncze rodziny gromadzą się w większe staje, co je chroni od napaści ptaków drapieżnych i odtąd pędzą żywot towarzyski. Po niejakiem czasie stare szpaki odlatują do swoich gniazd dla powtórne-go lęgu, a w końcu października wszystkie udają się na południe, lecz się tam nie gnieźdzą.



Fig. 154. Szpak.

Białorzytka (*Saxicola oenanthe*), podobna do pliszki, ale

o białem podgardlu, przebywa między skałami, w miejscowościach piaszczystych. Gniazda swe buduje w wyłomach skał. Przylatuje w kwietniu, a odlatuje we wrześniu.

Pluszcz (*Cinclus aquaticus*), mieszka nad strumykami górskimi i rozpowszechniony jest w całej Europie. Żywi się owadami wodnymi i małymi rybkami, które chwytą zręcznie, zanurzając się do wody.

122. **Słowik** (*Luscinia philomela*) (fig. 155) król wszystkich skrzydlatych śpiewaków, przylatuje w kwietniu, a odlatuje we wrześniu. Mieszka w gęstych zaroślach, trzymając się chętnie w pobliżu wody. Żywi się w ciągu lata gąsienicami i owadami, w jesieni jagodami. Gniazda buduje nie wysoko.



Fig. 155. Słowik.

„Śliczny to widok—powiada Juliusz Michelet—jak małe słowiki, siedząc dokoła ojca, pilnie wsłuchują się w jego śpiew, jak próbują swoich głosów, poprawiają popełniane

błędy i wyrabiają organa głosowe. W tem ciągłym ćwiczeniu, w wynajdywaniu coraz to nowych tematów, tkwi prawdziwie artystyczny żywioł, daleki od improwizowanego świergotu, będącego tylko echem przyrody.”

Pokrzewka czarnołbąta (*Sylvia atricapilla*) (fig. 156),



Fig. 156. Pokrzewka czarnołbąta.

brunatno - szara, pod spodem biaława, jest ładnym ptaszkiem, pomimo prostoty upierzenia. Bawi u nas od kwietnia do września; wije gniazdo w lasach i zaroślach. Należy do lepszych śpiewaków; lubi śpiewać podczas deszczu lub zaraz po deszczu. Pokrzewki są u nas pospolite i należą do najpożyteczniejszych ptaków owadożernych.

Mysikrólik zwany **Królikiem** (*Regulus cristatus*) (fig. 157), mały ptaszek zielonawo- i żółtawo - szary, z pomarańczową

łatką na głowie, nie większy nad $9\frac{1}{2}$ centymetrów. Żyje w lasach iglastych przez lato; na zimę przylatuje do ogrodów. Osobliwsze jest gniazdko królika i trudne do znalezienia; zwykle kuliste, z góry zakryte piórkami, zawieszone na końcu gałęzi jodły lub świerku, w gęstwinie igliwa, wpleczonego do gniazdka.

Strzyżyk (*Troglodytes parvulus*)

(fig. 158), zwany także **Mysikrólikiem** albo **Wołowem oczkiem**, również drobna ptaszyna o rdzawo-brunatnem upierzeniu, z ciemniejszymi pręgami, gardziel i piersi czerwono-białe, ogonek, którym ciągle kiwa, zwykle do góry zadarty. Jest to ptak miejscowy, nie przestający mile śpiewać nawet w zimie; w ciągłym jest ruchu i kryje się w najdrobniejsze dziury i szczeliny, między chróst w płoty, skąd wydobywa w zimie liszki i jaja owadów, a gdy mu zbraknie pożywienia, wówczas zalatuje do stajni lub stodół. Jest zawsze żwawy, wesoły i wydaje silny głos, lot ma krótki. Gniazdko wije z mchu i włókien; ma ono kształt kulisty, z otworem bocznym. Zwykle samiec buduje kilka gniazd, z których jedno tylko obiera za siedzibę dla przyszłej rodziny.

123. Do śpiewaków polnych należą także: **Pleszka** (*Ruticilla phoenicurus*) (fig. 159), niewielki ptaszek, mający grzbiet czarny, piersi i ogon czerwone; śpiewa przyjemnie, gnieździ się w dziuplach i tępi dużo owadów. **Kopciuszka** (*Ruticilla thytis*) ma główkę, szyję i piersi czarne, grzbiet i brzuszek popielate, ogonek rdzawy; lubi okolice górzyste; bawi u nas od marca do października.

Rudzik (*Erithacus rubecula*), niewielki ptaszek, spokrewniony ze słowikiem, ale mniejszy od niego, ciemno-szarej barwy, z czerwoną piersią i białym brzuszkiem



Fig. 157. Mysikrólik.



Fig. 158. Strzyżyk karmiący swe małe.



Fig. 159. Pleszka.

(fig. 160), pospolity u nas, czasami zimuje. Zamieszkuje gaje i zarośla; śpiewa przyjemnie; pożyteczny, gdyż tępi owady, w jesieni żywi się jagodami.



Fig. 160. Rudzik.

124. **Drozd** tworzą również liczną gromadę śpiewaków leśnych; zamieszkują umiarkowane strefy Europy, Azji i północnej Ameryki; bardzo pożyteczne, zjadają bowiem mnóstwo owadów i ich larw; w jesieni żywią się jagodami jałowcu, jarzębiny i t. p.

Do nich należy **Kwiczół** (*Turdus pilaris*), gnieźdzący się w lasach brzozowych; łowi go w siłki z włosia końskiego na przynętę z jarzębiny lub jałowcu; stanowi przysmak dla smakoszów. **Drozd śpiewak** (*Turdus musicus*) (fig. 161), rudawo - popielaty, brunatno nakrapiany, jest po słowiku najlepszym śpiewakiem. Przylatuje już w marcu; żywi się owadami i ślimakami, których skorupki rozbija o kamienie.



Fig. 161. Drozd śpiewak.

125. **Dzierlatka śmieciucha** (*Alauda v. Galerita cristata*) (fig. 162), szara, z czubkiem, zgrabna w ruchach, jest dobrze znanym ptakiem miejscowym. W zimie razem z wróblami uwija się po ulicach i śmietnikach, szukając pożywienia. Gniazdo swoje wije pod grudką ziemi, albo pod krzakiem. Kolor jej upierzenia chroni ją od nieprzyjaciół, gdyż jest zupełnie podobny do koloru ziemi, a nawet stosownie do zamieszkałej przez dzierlatkę okolicy — zmienia się od piaskowego do ciemno-brunatnego. Jest użyteczna.



Fig. 162. Dzierlatka śmieciucha.

Skowronek polny (*Alauda arvensis*) (Tab. IV, fig. 17), znany jest powszechnie jako pierwszy zwiastun wiosny; wznosząc się z ziemi ze śpiewem i wzlatując bardzo wysoko, aż pod obłoki, zjawia się już w końcu lutego lub w marcu, gdy

pola okryte są jeszcze śniegiem. Jest on stałym towarzyszem rolnika, którego zachęca do pracy śpiewem swoim serdecznym i wesołym. Śpiew ten jest pełen różnorodności, miękki, a pod względem siły i trwania tonu, żaden ptak nie może się z nim porównać; może on śpiewać całą godzinę z małymi przestankami.

Skowronek gnieździ się na ziemi, gdyż słabe i drobne pazurki nie pozwalają mu czepiać się gałęzi. Pod grudką ziemi, bez innej ochrony, musi on wychodować swoje pisklęta, ciągle zagrożany przez sokoła i inne ptaki drapieżne, zawsze jednak wesoły i towarzyski, dzieli się pożywieniem ze współtowarzyszami. Trzy razy w ciągu lata samiczka składa jaja i wychowuje potomstwo, a wesoły śpiew ptaszyny rozbrzmiewa od świtu. Odlatuje od nas w październiku.

Opowiadają, że pewnego razu, gdy Gustaw Adolf, król szwedzki, przejeżdżał przez pola w Nördlingen podczas trzydziestoletniej wojny, skowronek prześladowany przez krogulca, szukał ratunku u niego. Król wziął go do ręki i przetrzymał dopóty, dopóki krogulec nie odleciał.

Trznadel (*Emberiza citrinella*) (fig. 163), jest brunatny, z głową i piersią cytrynowo-żółtą, dziób ma krótki. Bardzo pospolity w gajach i zaroślach; w zimie szuka sobie poży-



Fig. 163. Trznadel.



Fig. 164. Sikora bogata.

wienia do spółki z wróblami około mieszkań ludzkich. Gnieździ się nisko w krzakach lub na ziemi. Żywi się owadami, lub ziarnem.

126. Rodzina **sikor**, ptaków najpożyteczniejszych, ma licznych przedstawicieli, do których należą:

Sikora bogata (*Parus major*) (fig. 164), pospolita w każdym ogrodzie; głowa jej, podgardle i pęga pod spodnią czę-

ścią ciała są czarnej barwy, skrzydła i ogon niebieskawo-siwe, grzbiet szaro-zielony. Ptasek ten jest w ciągłym ruchu: przelatuje z drzewa na drzewo i z gałęzi na gałąź, tępiąc ogromną ilość szkodliwych owadów i ich jajeczek. Mnoży się bardzo szybko, gdyż dwa razy do roku składa jaja w liczbie od 6 do 12. Sikora bywa niekiedy bardzo złośliwą, napada bowiem czasami na słabsze ptaszki, rozbija im główki i mózg ich wypija. Inne gatunki sikor, jak **S. modra**, **S. lazurowa**, **S. sosnowka**, **S. uboga** i **S. czubata** są również użyteczne. Wszystkie lęgną się w dziuplach drzew.

Sikora ogonatka (*Parus caudatus*) odznacza się sztuczną budową gniazda, które ma kształt kulisty, wysokie na 20 cm., z otworem wylotowym z boku u góry. Utkane jest z mchu, kawałeczków kory, oprzędów owadów, i tak podobne do otoczenia, że bardzo trudno je dostrzedz na gałęzi, do której jest przymocowane. Wewnątrz usłane jest miętko włosiem. Budowa gniazda zajmuje ptakom trzy tygodnie; przytem samiec tylko znosi materjały, a samiczka buduje.

127. Rodzina **Wikłaczów** zamieszkuje gorące strefy Azji i Afryki; wszystkie wikłacze odznaczają się budową swych gniazd, które gromadnie umieszczają na drzewach; gniazda ich, najczęściej uwite z roślin, są u góry szersze, z wylotem u dołu. W Europie hodują te ptaki w klatkach.

128. Bardzo liczną rodzinę stanowią **Łuszczeniaki** (*Fringillidae*), odznaczające się krótkim stożkowatym dziobem. Żywią się ziarnem wszelkiego gatunku, młode owadami i robakami.

Należy tu przedewszystkiem **Wróbel domowy** (*Passer domesticus*) (fig. 165), ten zawadzaka w szarym kubraczku z czarnym kołnierzykiem. Jest to hałaśliwy towarzysz człowieka, rozpowszechniony w całej Europie, w środkowej Azji i Afryce półn. Przewieziono go też do Ameryki i Australji, aby tam niszczył owady; rozmnożył się też szybko i stał się nawet bardzo natrętnym. Żywi się owadami, ale najwięcej lubi ziarna i owoce, dlatego też, pomimo, że jest użytecznym, sprawia często wiele



Fig. 165. Wróbel.

szkody w polach i ogrodach; za to w zimie nieraz z głodu i chłodu przymiera. Wróble gniazd budować nie lubią i w zi-

mie zamieszkują gniazda innych ptaków, przez które jednak na wiosnę są wyrzucane.

Wróbel towarzyski (*Passer socius*), żyje w Afryce wielkimi gromadami. Cała kolonja buduje wspólnymi siłami dokoła pnia drzewa i jego gałęzi jeden ogromny dach (fig. 166), który ochrania gniazda, umieszczone pod nim, od węzów i ptaków drapieżnych. Dach ten ma postać olbrzymiego grzyba. W gniazdach swych ptaszki te nie tylko wylęgają pisklęta, ale i spędzają noc.



Fig. 166. Gniazdo wróbli towarzyskich.

129. Zięba (*Fringilla coelebs*) (fig. 167), ptaszek brunatny, z czarnym łebkiem i białą przepaską na czarnych skrzydłach, zawsze wesoły i śpiewający. Żyje w bliskości mieszkań ludzkich, żywi się owadami i owocami. Dawniej zięby były bardzo poszukiwane dla ich oryginalnego śpiewu.



Fig. 167. Zięba.

Zięba alpejska (*Fringilla nivalis*) mieszka na wysokich górach alpejskich, tylko w zimie przylatuje w okolice przytułków górskich, gdzie bywa przez mieszkańców żywiona.

Dzwoniec (*Fringilla chloris*) dość duży ptak, zielono-żółty, ma szarą głowę, także lotki z żółtym brzegiem i żółty ogon, czarny na końcu. Zamieszkuje brzegi lasów, a także i ogrody.

Czyżyk (*Fringilla spinus*) (Tab. IV, fig. 12), wesoły ptaszek, ma zielono-żółty grzbiet, czarną łatkę na głowie, pod spodem żółtawy; bawi u nas ciągle; żyje stadami; przez zimę żywi się orzeszkami olszyny, a w marcu odlatuje na północ lub kryje się w lasach iglastych. Gniazdo swoje tak ukrywa, że mało co wiadomo o sposobie jego lęgu. Lud opowiada o tym ptaszku baśń, że do gniazda swego kładzie kamień, który je czyni niewidzialnem i dopiero gdy młode wyfruną, kamień ten wyrzuca.

Szczygieł (*Fringilla v. Chrysomitris carduelli*) (Tab. IV, fig. 11), barwy żółtawo-czerwonawej, mieszka na brzegach

lasów i w ogrodach, gdzie często wije gniazdo na drzewach owocowych (fig. 168). Żywi się w lecie owadami i gąsienicami, w zimie zaś nasionami ostu, z którego wełniste główki skubie. W zimie łączy się w wielkie stada. Bywa trzymany w klatkach, bo śpiewa przyjemnie i może się różnych sztuczek wyuczyć.



Fig. 168. Gniazdo szczygła.

Kanarek (*Fringilla* v. *Sesinus canarius*) (fig. 169) znany powszechnie i utrzymywany w klatkach żółty ptaszek. W ojczyźnie swojej, na wyspach Kanaryjskich, jest ciemniej zabarwiony: oliwkowo-brunatny na grzbiecie, pod spodem zielonawo-żółty. Mieszka tam na brzegach lasów w zaroślach i winnicach. Gniazda wije z włókien roślinnych na drzewach. Lęgnie się w połowie marca po raz pierwszy i jeszcze dwa razy w ciągu roku. Przez długą hodowlę w Europie (zwłaszcza we Włoszech i w Tyrolu), przybrał kanarek jaśniejszą barwę i dźwięczniejszy głos.



Fig. 169. Kanarek.

Makolągwa (*Fringilla linota*) (fig. 170), ptaszek cynamonowego koloru, z jasno-czerwoną piersią. Żywi się wyłącznie ziarnem; pozostaje u nas przez zimę, a śpiewa i w zimowe dni słoneczne.



Fig. 170. Makolągwa.

Gil (*Pyrrhula coccinea*) (fig. 171) szary, skrzydła, ogon i głowa błękitne, podgardle czerwone. Mieszka w lasach i w gęstych zaroślach, w których wije gniazdo; w zimie zbli-

ża się do mieszkań ludzkich. Młodo pojmany, łatwo naucza się gwizdać rozmaitych melodji, musi je jednak słyszeć ciągle przez kilka miesięcy. Można go także nauczyć różnych sztuczek.

130. Do łuszczyków należą **Krzyżodzioby** (*Loxia*) (Tab. IV, fig. 16), mające wierzchnią i dolną część dzioba zagięte ha-

czykowato w przeciwne strony, tak, że końce dzioba nie zamykają się, tylko krzyżują się z sobą. Dziobem tym wyłuskują nasiona z szyszek, trzymając je w łapkach. Zamieszkują lasy górskie Europy. Gniazdo wyściełają gęsto mchem, ażeby je uchronić przed zimnem, piskłeta bowiem lęgną się dopiero w końcu jesieni.

Kowalik (*Sitta caesia* v. *europaea*) (fig. 172), z wierzchu niebieskawo-siwy, pod spodem biały; zamieszkuje lasy całej Europy i północnej Azji. Mieszka w dziuplach, a obrawszy sobie jedną za gniazdo, oblepia otwór gliną, zostawiając tylko niewielkie wejście. Łazi po drzewach bardzo zręcznie i kuje dziobem w korę, dla wydobycia owadów (podobnie jak dzięcioł). Żywi się także orzechami i buczyną: kładzie ziarno w szczelinę drzewa i rozbija dziobem, aby się dostać do jądra, które zjada.

131. Z rodziny **Muchołówek** pospolita bardzo jest **Muchołówka szara** (*Muscicapa grisola*), ze spłaszczonego na końcu haczykowatym dziobem, otoczonego w nasadzie szczecinkami; mieszka w lasach, żywi się jagodami i owadami.

Jemiołuszka (Czubek) (*Ampellis garrula*) (fig. 173) mieszka na północy Europy; do środkowej zaś przybywa tylko na zimę; żywi się dzikimi owocami. Jest pięknie pstro upierzona, na głowie ma jedwabisty wysoki czubek. Jest to ptak spokojny i bardzo towarzyski, ale żarłoczny.

132. **Rajskie ptaki** stanowią rodzinę, zamieszkującą wyłącznie Nową Gwineję. Jeden z nich (*Paradisea apoda*) (fig. 174) nazwany jest



Fig. 171. Gil.



Fig. 172. Kowalik.



Fig. 173. Jemiołuszka.

beznogim dlatego, że krajowcy po zabiciu go, wyrwają mu nogi i tak go zawieszają. Upierzenie tych ptaków wprawia w zachwyt podróżnych, ale tylko samce mają taki wspaniały strój; samiczki nie równie skromniej są upierzone. Rajskie ptaki żyją w gąszczy leśnej; żywią się owadami i jagodami. Myśliwi zabijają je strzałami, zakończonemi grubemi guzikami, tem ptaka ogłuszają, a potem, ażeby piór krwią nie splamić, duszą go.



Fig. 174. Latawiec.

133. Do rodziny **Kruków** należą:

Sójka (*Garrulus glandarius*) (Tab. IV, fig. 14), jest pospolitą w Europie północnej, a w zimie i w środkowej. Należy do najszkodliw-

szych rabusiów, niszczących jaja i pisklęta rozmaitych ptaków śpiewających. Gdy zaczyna się lęg ptaków, wtedy sójka lata od gniazda do gniazda, wypija znajdujące się w nich jaja i pożera gołe jeszcze pisklęta. Ma głos przeraźliwy, krzyczący. Umie do złudzenia naśladować głosy innych ptaków. Zbiera także zapasy żołądki i orzeszków, które niekiedy jej odbiera wiewiórka.

Kruk (*Corvus corax*) (fig. 175), ptak duży, większy od wrony, o czarnem połyskującym pierzu. znany każdemu. Upierzenie dodaje mu powagi, chociaż właściwie jest wesoły i trzpiotowaty. Zamieszkuje całą Europę, jakoteż północną i środkową Azję, również i północną Amerykę, aż do Meksyku. Gnieździ się na wysokich drzewach lub na wieżach. Dawniej widywany był często po wsiach i miastach, teraz wskutek prześladowania chroni się w góry i lasy. Lęg rozpoczyna w lutym.



Fig. 175. Kruk.

Jest to ptak bardzo pojętny; łatwo się oswaja i naucza się wymawiać wyrazy. Lubi wyrządzać różne psoty innym zwierzętom i ludziom. Kradnie chętnie błyszczące przedmioty i chowa je w ukryte miejsca. Żywi się padliną, łowi też inne ptaki, oraz szczury i myszy. Często wyrządza wśród ptaków wielkie

szkody. Oswojony, je wszystko to, co człowiek. Jest złośliwy, a przy łupie napada nawet na myszołowy i inne drapieżne ptaki. Pojętnością i ostrożnością przewyższa inne, nawet większe od siebie ptaki.

Michelet tak opisuje wspólne pożycie kruka z orłosepem w ogrodzie botanicznym w Paryżu:

„Kruk, najmędrzy z ptaków mięsożernych, występuje tu w roli nauczyciela i usiłuje „wyszkolnić” nieokrzesanego swego towarzysza niewoli. Zabawnie patrzeć, jak go zachęca do igraszek i do przyzwoitego zachowania się, wbrew dziłkim jego zachciankom. Szczególnie lubi dawać takie przedstawienia, gdy się gromadzi znaczna liczba widzów. Wobec pojedynczego świadka niema ochoty występować z temi pedagogicznymi ćwiczeniami. Zwraca pilną uwagę na publiczność i umie też trzymać ją na wodzy; widziałem, jak dziobem odrzucał małe kamienie chłopakowi, który niemi ciskał w niego. Najciekawszą jego igraszką z orłosepem jest ta, że mu daje jeden koniec kija do trzymania w szponach, a sam dziobem targa za drugi. Czasem z dzioba orłosepa wyjmuję pokarm, a gdy ten się rozgniewa, kruk ucieka na drabinę i z wysoka ze śmieszoną powagą, prawi mu kazanie.”

Wrona (*Corvus cornix*) (fig. 176) ma głowę, skrzydła i ogon czarne, resztę ciała popielatą. Jest to najpospolitszy z naszych ptaków. Zamieszkuje wschodnią Europę, Azję mniejszą i północno-wschodnią Afrykę; głos ma nieprzyjemny, kraczący. Wrona i podobny gatunek **Wroniec**, całkiem czarny, żyją stadami na łąkach, a w nocy w lasach; żywią się owadami i robakami.



Fig. 176. Wrona.

Gawron (*Corvus frugilegus*) (fig. 177), cały czarny, z fioletowym połyskiem na głowie i szyi. Stare mają dziób nagi, pokryty stwardniałą skórą. Jest to ptak wędrowny. Żywi się gąsienicami i owadami, w tym celu chodzi za pługiem w polu i cią-



Fig. 177. Gawron.

gle grzebie w ziemi, poszukując pędraków, czem wyrządza wielką usługę człowiekowi.

„W lutym, skoro tylko mrozy zelżeją i śniegi topnieć poczną, gawrony powracają do nas ze swoich zimowych leży i odszukują zeszłoroczne miejsca pobytu. Małe gaje wśród pól, brzegi większych lasów liściastych lub iglastych, lecz nie położonych w górzystych albo bagnistych okolicach, są ulubionem miejscem ich lęgu. Tutaj gnieźdzą się gromadnie, tak, że na jednym drzewie znajduje się czasem czternaście, szesnaście i więcej nawet gniazd, jeśli ilość rozwidlonych gałęzi na to pozwala. Szukając miejsc na gniazda, ptaki te prowadzą ciągłą kłótnię, a skoro jaka para obierze już sobie miejsce, wtedy jedno z nich nieodstępnie go pilnuje, podczas gdy drugie znosi materiały na budowę gniazda. Samiec z samicą zastępują się naprzemian przy tej robocie; lecz częściej można widzieć samca na straży, a samicę przy budowie. Dopóki trwa budowa gniazd, dopóty nie ustaje kłótnia pomiędzy gawronami, kłóca się bowiem i o materiał na gniazdo, który nieraz zmuszone są z daleka z wielkim móżolem przynosić. Podstawę gniazda stanowi niekształtnie nagromadzony kłęb suchych gałęzi i cierni, pozbieranych z ziemi lub odłamanych od drzewa. Jeśliby jeden z ptaków nie pilnował nieodstępnie gniazda, już byłoby po nim, gdyż sąsiedzi, którym braknie materiału, niechybnieby je rozebrali na własny użytek, dopóki choć jedna gałązka pozostaje do zabrania. Prawy właściciel gniazda może uważać się za szczęśliwego, jeżeli podczas jego nieobecności inna para nie przywłaszczy sobie jego mieszkania. W przeciwnym razie nie pozostaje mu nic innego, tylko gromadzić nanowo materiały, budować nowe gniazdo i troskliwie pilnować, aby nie uległo podobnemu losowi, jak pierwsze. Gniazdo takie jest wewnątrz wysłane włosem, szczecinią, suchymi trawami, mchem i wylepione ziemią. Podczas tej roboty gawrony wrzeszczą ciągle przeraźliwie.”



Fig. 178. Kawka.

Kawka (*Corvus monedula*) (fig. 178), najmniejszy ptak z tej rodziny, ma głowę, skrzydła i ogon czarne, resztę ciała szarą lub białawą; dziób nieco zakrzywiony. Tępi wiele szkodliwych owadów. Gnieździ się gromadnie na starych wieżach lub w zaroślach wśród pola.



Sroka (*Pica rustica*) (fig. 179), duży ptak barwy czarnej z białą, jest rabusiem, niszczącym ogromną ilość drobnych ptaszków. Żywi się myszami i szczurami, niszczy także owady, ale więcej wyrządza szkody, niż przynosi korzyści. Gniazdo jej (fig. 180) ma szczególną budowę: umieszczone na wierzchołku drzewa, uwite jest z gałązek i cierni, zlepionych gliną; wewnątrz wysłane trawą i włosem, z góry zaś osłonięte sklepieniem, utworzonym z gałązek spojonych gliną; wylot znajduje się z boku.

135. Do rodziny **Zimorodków** należą liczne gatunki pięknie upierzone, zamieszkujące strefy gorące.

W Europie żyje jeden gatunek **Zimorodka** (*Alcedo hispida*) (fig. 181); głowę i skrzydła ma zielono - niebieskie, piersi i podbrzusze cynamonowego koloru; dziób długi, silny, barwy czarnej, nogi czerwone. Żywi się drobnymi rybkami, ślimakami wodnymi, pijawkami i t. d. Czatuje zwykle nad wodą, siedząc nieruchomie na gałęzi lub kamieniu, a gdy ujrzy zdobycz, rzuca się na nią, zanurzając się całkowicie. Po wydobyciu z wody, zabija zdobycz uderzeniem dzioba i wraca na dawne miejsce; połknięte łuski i ości wyrzuca w kłębkach z gardzieli. Gnieździ się w głębokich dziurach, które wygrzebuje w gliniastych brzegach rzek na długość 2—4 stóp; w głębi takiej dziury znajduje się rozszerzenie, wysłane drobnymi ościami ryb, gdzie składa jaja. Zimorodek zmienia miejsce pobytu w miarę zamarzania wód.



Fig. 179. Sroka.



Fig. 180. Gniazdo sroki.



Fig. 181. Zimorodek.

136. **Dudek** (*Upupa epops*) (fig. 182), ma na głowie wspaniały czubek, który może dowoli składać i rozkładać; jest ptakiem wędrownym; wraca w kwietniu z południowych krajów i wtedy często sły-



Fig. 182. Dudek.

szyć można w rannych godzinach krzyk jego, przypominający „hup-hup.” Chodzi zwykle po polach na brzegu lasów i wydobywa swoim długim, wązkim dziobem różne owady, a szczególnie lubi żuki, które obrawszy z twardych skrzydeł, podrzuca do góry i połyka w locie. Jest nadzwyczajnie płochliwy: słysząc szeslest, rozkłada natychmiast czubek, a gdy nadlatuje ja-

ki większy ptak, wtedy rzuca się na ziemię, rozpościera skrzydła i ogon, i zostaje w takiej nieruchomej postawie, póki strach nie minie.

Dudek żyje w lasach, gdzie mało lata, tylko więcej przeziaduje na grubych gałęziach, okrytych gęsto liśćmi. Gnieździ się w dziuplach drzew, ale gniazda nie buduje, tylko nazonosi mnóstwo korzonków, śmieci, a nawet gnoju i w to składa jajka. Gdy już latać mogą, piskłeta wyfruwają z gniazda i więcej do niego nie wracają, ale dużo czasu przejdzie, zanim dudki w powietrzu pozbędą się niemiłego zapachu. Odlatują w końcu sierpnia, w małych gromadkach.

Kraska (*Coracias garrula*), ptak dość duży, barwy niebiesko-szarej. Zamieszkuje całą Europę, jest ptakiem wędrownym; na zimę odlatuje na południe. Żyje na brzegach lasów, w których są dęby, buki, brzozy i świerki, w bliskości pól i łąk. Gniazdo, równie nieporządne jak dudka, zakłada w wypróchniałych pniach.

137. **Kolibry** są to nadzwyczaj drobne ptaszki, z których największe nie dorównywiają jaskółce, a mniejsze dosięgają wielkości większych owadów; odznaczają się wspaniałością ubarwienia i różnym kształtem ogona. Żywią się miodem kwiatów i drobnymi owadami. Ojczyzną ich jest Ameryka. Ukazują się zwykle w większej liczbie, skoro tylko drzewa zakwitną, a gdy kwiaty opadną, lecą dalek. Pomimo, że tak

drobne, nie są jednak bojaźliwe; pozwalają zbliżyć się człowiekowi, ufne w szybkość i pewność swego lotu. „Z równą odwagą zachowują się względem innych, daleko od nich większych ptaków, jeśli tamte ośmielią się zakłócić ich swobodne życie na kwiatkach, lub zbliżyć się do ich gniazdek w nieprzyjaznych zamiarach. Cała gromada obejmuje w posiadanie ukwiecone drzewo, a wtedy biada śmiałkowi, poważającemu się zbliżyć do niego; nie uniknie napaści, pomimo swego wzrostu i siły. Ostremi jak igły dziobkami godzą mu do oczu i w końcu zmuszają do ucieczki. Niepodobna opisaćżywienia, jakie ogarnia te śliczne ptaszki w uroczystej chwili troski o potomstwo. Samczyk nastrosza pierze, fruując dokoła samiczki, spada na kwiaty i z pełnym zdobyczą dziobkiem wraca do niej, karmi ją, trzepocze nad nią skrzydełkami, jakby nad żywym kwiatem, odpędza od niej inne, daleko większe od siebie ptaszki i ściga je zawzięcie aż do ich gniazda. Jak już wspomniano, ptaszki te żywią się nektarem kwiatów, zanurzając długi swój dziób i dłuższy jeszcze, wysuwalny, rozdwojony na końcu język w miódniki kwiatów, podobnie jak pszczoły i motyle.”



Fig. 183. Koliber.

Kolibry budują gniazdzka w różnych miejscach, w niezna-
cznej wysokości nad ziemią i nadają im kształt głębokiej mi-
seczki; do budowy używają pewnego gatunku bawełny.

138. Menura pyszna (*Menura
superba*) czyli **Lirogon** (fig. 184), ma
ogon w kształcie lutni, długi na $1\frac{1}{2}$
łokcia. Dwa zewnętrzne pióra ogo-
na wygięte, czarno-brunatne, tworzą
jakby oprawę lutni; inne, rozpię-
chłe, naśladują jej struny. Samica
ogona takiego nie posiada. Są to
ptaki płochliwe; mało używają skrzy-
deł, częściej biegają, jak kury. Gnia-
zda, zupełnie z góry zamknięte bu-
dują na ziemi. Żyją w Australji.



Fig. 184. Menura pyszna.

139. **Lelek** albo **Kozodój** (*Caprimulgus europaeus*) (fig. 185), jest to ptaszek nocny, z wierzchu brunatny, pod spodem jaśniejszy. Znajduje się w lasach iglastych całej Europy. Przylatuje w maju, odlatuje we wrześniu. Dzień spędza, śpiąc przytulony do gałęzi, tak, że bardzo trudno go dostrzedz; w nocy zaś wylatuje na żer; łowi nocne owady, a przede wszystkim ćmy, jest więc pożyteczny. Nie buduje wcale gniazd, lecz składa jaja wprost na ziemi, wśród wrzосу albo na ściętym pniu drzewa.



Fig. 185. Lelek.

Jaskółka dymówka (*Hirundo rustica*) (Tab. V, fig. 4), wierzch ciała i głowę ma czarno-błękitną, spód ciała i podgardle jasno-brunatne. Jest to ptaszek rozpowszechniony w całej Europie i Azji; odznacza się zwinnym i szybkim lotem. Na początku wiosny ukazuje się zwykle pojedynczo, potem znika; wkrótce przylatuje cała gromada i zajmuje swe dawne gniazda, ulepione z bryłek gliny i przyczepione do gżemsu. Samiczka podczas wysiadywania często wylatuje z gniazda za pożywieniem, gdyż samiec jej nic nie przynosi. Żywi się owadami, które chwytą w lot. Bardzo ciekawe widowisko przedstawia rodzina jaskółek, gdy pisklęta wyrosną już tak, że mogą fruwać i wychodzą z rodzicami na naukę.

Pewien spostrzegacz tak opisuje tę scenę:

„Po przedwstępnem fruwaniu tu i owdzie, nastąpiła właściwa nauka. Jedno z rodziców przyniosło w dziobku piórko krucze, pochwycone w locie gdzieś na ziemi i pokazawszy dzieciom, widocznie głodnym, tę rzekomą zdobycz, wzniosło się wysoko w górę i tam upuściło piórko, które zaraz druga stara jaskółka w lot pochwyciła. Trwało to przez czas jakiś, dopóki młode nie nabrały ochoty do tej zabawy i nie zaczęły naśladować rodziców. Wkrótce jednakże igraszka ta im się przykrzyła, widocznie głód zaczął im dokuczać. Gdy się rodzice o tem przekonali, jedno z nich pochwyciło piórko i odleciało. Po chwili wróciło z motylem. Igraszka rozpoczęła się na nowo; po długiem chwytaniu i puszczaniu go z dziobków, motyl spadł wreszcie martwy na ziemię. Nauczyciele wynaleźli inny przedmiot; obrali do tego chrząsz-

czyka, za którym młode uwijały się w zgrabnych zwrotach. Trwało to dosyć długo, dopóki nie przeprowadzono prób stopniowo z rozmaitego rodzaju zdobyczą, aż do najdrobniejszych owadów. Dopiero około wieczora ukończyły się te próby i nastąpiło rzeczywiste karmienie zmęczonych piskląt. Głośny świergot młodych świadczył o ich apetycie; wtenczas rodzice udali się z nimi nad rów, gdzie nad wodą roily się komary. Tam cała rodzina jaskółek uwijała się szybko wokoło; młode często jeszcze napróżno otwierały i zamykały w locie swe dziobki, ale w końcu nabrały wprawy i uraczyły się do syta tą drobną, ale obfitą zdobyczą.”

Jaskółki są bardzo użyteczne i uważane nawet za ptaki domowe.

Jaskółka oknówka (*Hirundo urbica*), mniejsza jest od poprzedzającej i ma białe podbrzusze. Gniazdko swoje zamknięte, z jednym tylko otworem, buduje również u gzemśów domów.



Fig. 186. Jerzyk.

Najmniejszą z jaskółek jest **Brzegówka**, przylatująca do nas dopiero w maju, żyje głównie nad brzegami urwistemi wód, gdzie też buduje sobie gniazdko w głębokiej dziurze, której dno wyścieła korzonkami.

Jerzyki (*Cypselus*) (fig. 186), ptaki podobne do jaskółek; upierzenie ich ciemno - szaro - zielone, z białem podgardlem; ogon długi, rozwidlony, w locie mają zawsze zwinięty. Nogi krótkie, palce zwrócone ku przodowi czynią, że ptaki te zupełnie nie chodzą po ziemi, tylko czepiają się murów. Żyją na wysokich budynkach, gniazda swe lepia w szczelinach muru ze słomy, piórek i śliny. Są to ptaki wędrowne.



Fig. 187. Salangana w gnieździe.

Do jerzyków należy t. zw. **Salangana** (fig. 187), której gniazda wielkości połowy jaja kurzego są jadalne; zamieszkuje wyspy wschodnio-Indyjskie.

Rząd IV. Gołębie.

140. Gołębie tworzą bardzo nieliczną gromadę. Cechą ich jest dziób prosty i miękki, tylko na końcu rogowaty, i krótkie nogi z czterema zupełnie rozdzielonemi palcami. Gniazda budują bardzo proste i składają w nich zawsze po dwa jaja.

Gołąb grzywacz (*Columba palumbus*), jest największym z dzikich gołębi; barwę ma szaro-brunatną z białemi pręgami. Znajduje się w lasach, zarówno iglastych jak i liściastych; żywi się nasionami sosen, jodeł, bukwia, pączkami drzew i jagodami. Gniazdo buduje tak niedbale, że często wiatr zrzuca je z drzewa na ziemię.



Fig. 188. Gołąb siniak.

Gołąb siniak (*Columba oenas*) (fig. 188) jest mniejszy i ma głowę czerwonawą; gnieździ się w dziuplach drzew.

Gołąb skalny (*Columba livia*) (Tab. V, fig. 6), odznacza się fioletową obrączką na szyi i czarnymi pręgami na skrzydłach. Zamieszkuje skały i skaliste wysepki nad morzem Śródziemnem. Uważają go za początkowy szczep, od którego pochodzą wszystkie nasze gołębie domowe.

Hodowla gołębi jest bardzo rozpowszechniona; utrzymują je po części dla jedzenia, głównie zaś dla przyjemności. Hodowcy budują dla nich gołębniki, gdzie ptaki te gnieźdzą się całemi stadami.



Fig. 189. Turkawka.

W Europie południowej znajduje się **Turkawka** (*Columba turtur*) (fig. 189), nazwana tak dlatego, że w głosie jej słychać zgłoski „tur-tur,” jest najmniejsza ze wszystkich gołębi, barwy niebieskiej z czerwoną i czarną. W Afryce i Azji południowej żyje **Synogarlica** (*Turtur risorius*), którą u nas czasem trzymają w klatkach; jest pło-

wa z czarną obrączką na szyi; głos jej składa się z głosek „ku-kru-mi.”

Gołąb wędrowny (*Ectopistes migratorius*), tak duży jak gołąb domowy, o upierzeniu żywo zabarwionem. Ptaki te zamieszkują Amerykę półn.; żyją gromadnie. Przelatują one, szukając pożywienia i miejsca do zagnieżdżenia się, w takich ogromnych stajach, że na kilka godzin zasłaniają słońce. „Naprzód ciągną małe stada, jakby kwatermistrze, których obowiązkiem jest wyszukać odpowiednie miejsca do gnieżdżenia się. Opadłe na ziemię żołądki i bukiw *) stanowią ich pokarm. Za tą przednią strażą ciągnie szybkim lotem główna siła. Pewien badacz próbował policzyć ptaki przelatujące w ciągu godziny, robiąc znaczki na papierze, lecz przekonał się, że tego nie dokaże, ponieważ ilość ptaków była zbyt wielka. — Powstałem—powiada—i policzyłem znaczki: w przeciągu 21 minut przeleciały 163 stada ptaków. Udałem się w dalszą drogę, ale gromady ptaków były coraz większe. Powietrze, w ścisłym tego słowa znaczeniu, było przepełnione gołębiami, a słońce po południu było zasłonięte jak podczas zaćmienia. Pomiót ptaków spadał nieustannie jak płatki śniegu, a szelest skrzydeł działał usypiająco na moje zmysły.”

Gdy taka staja spada na nocleg, olbrzymie gałęzie drzew łamią się pod ciężarem siadającego ptactwa, szum skrzydeł przypomina ryk wichru na morzu, a ludzie zbierają się gromadnie, aby tysiącami je zabijać. Mięsem ich karmią świny, a także solą je i przechowują dla siebie.

Jedną z osobliwości tych gołębi jest nadzwyczajna pamięć miejsca i łatwość orjentowania się. Gołąb wywieziony w zamkniętej klatce o dziesiątki mil od miejsca swego pobytu, skoro zostanie wypuszczony, podnosi się w górę i po krótkim wahaniu, odnalazłszy kierunek swego „domu” wraca do niego po linii prostej. Na tej właściwości polega użycie ich do przesyłania listów. Chcąc posłać list do jakiejś miejscowości, trzeba mieć przywiezionego stamtąd gołębia i trzymać go w zamknięciu aż do chwili, gdy nastąpi potrzeba wysłania. Wtedy wypuszcza się go, przywiązawszy poprzednio liścik do łapki, a ptak sam znajdzie miejsce, skąd został wzięty.

*) Orzeszki bukowe.

Rząd V. Grzebiące.

141. Ptaki te mają dziób krótki, skrzydła mało rozwinięte, wskutek czego lot ich jest ciężki. Większą część życia spędzają, chodząc i grzebiąc w ziemi, gdzie wyszukują sobie pokarm. Pisklęta ich natychmiast po wylęgnięciu opuszczają gniazdo i idą za matką dziobać pożywienie, które ona im wygrzebuje. Karmią się ziarnem i owadami.

Głuszec (*Tetrao urogallus*) (Tab. V, fig. 2), jest to ptak duży z upierzonymi nogami i czerwoną obwódką wokoło oka. Samica jest barwy rdzawej w cętki, samiec zaś czarny z granatowym grzbietem i białymi pręgami, ogon barwy czarnej, który może dowolnie rozstaczać; pod dziobem wiszą piórka sztywne, tworząc brodę; dziób haczykowaty. Samiec jest znacznie większy od samicy. Zamieszkuje lasy i puszcze Europy i Azji półn. Najczęściej przebywa w gęstych zaroślach w pobliżu wody. Gniazdo jego jest płytkim dołkiem, ukry-



Fig. 190. Cietrzew.

tym w zaroślach. Samica składa od 5—15 jaj, nie większych od kurzych, które wysiaduje sama. Później trzyma się razem z pisklętami aż do następnej wiosny. Ukrywa je troskliwie i broni nawet od człowieka. Przed lisem udaje skałeczoną i nisko podlatując, uprowadza go daleko od ukrytych piskląt, a potem wznosi się w górę i zakreślając wielki łuk, powraca do ukrytych dzieci. Jest to ptak płochliwy i ostrożny. Głos ma

donośny, charakterystyczny. Zwierzyna to bardzo poszukiwana. Polowanie na nie jest ciekawe.

Cietrzew (*Tetrao tetrix*) (fig. 190) jest mniejszy od głuszca i częściej się spotyka na brzegach lasów; samiec czarny ma w ogonie dwa długie lśniąco czarne pióra, wygięte na kształt lutni; samica jest ruda w czarne i białe cętki.

Jarząbek (*Bonasia betulina*) (fig. 191) ma upierzenie złożone z piór różnej barwy; spotyka się na całej przestrzeni ziemi od gór Pirenejskich do Kamczatki. Trzyma się w gęstych lasach, gdzie żyje parami. Samica składa w gnieździe ukrytem pod krzakami 7—12 jaj; po ich wylęgnięciu, cała rodzina trzyma się razem.

Kuropatwa (*Perdix cinerea*) (fig. 192), ptak niewielki barwy brunatnej z popielatą w pęgi, żyjący tylko na ziemi, w krzakach i zbożu; ptak miejscowy. Przez jesień i zimę trzymają się kuropatwy w stadach, w końcu lutego zaś rozbijają się na pary. Samiec jest bardzo troskliwy o pisklęta; sam naraża się chętnie na niebezpieczeństwo, aby je odwrócić od rodziny. Oboje zresztą rodzice są pod tym względem równie troskliwi.

„Trwożnie śledząc, skąd może zagrażać niebezpieczeństwo, samiec biega tu i ówdzie, matka zaś cichym głosem zgromadza pisklęta koło siebie, wskazuje im, gdzie się mają ukryć: w trawie, w zbożu, w krzakach; sama zaś łącznie z samcem stara się niebezpieczeństwo odwrócić, lecz w poczuciu swej słabości nie napada na wroga, ale stara się zwrócić na siebie jego uwagę i odprowadzić go jaknajdalej od stada. Wtedy pierwsza samica powraca do piskląt, pewna, że żadne z nich nie opuściło swego miejsca, i uprowadza je dalej. Samiec widząc, że rodzina jego jest już zabezpieczona, zwodzi swego prześladowcę i odlatuje pewnym, szybkim lotem. Skoro się wróg oddali i wszystko dokoła się uspokoi, samiec wydaje głos, na który zaraz odpowiada matka, oznajmiając mu, gdzie się z pisklętami znajduje.”

W zimie kuropatwy wygrzebują sobie pożywienie z pod śniegu. Gdy po odwilży śnieg stwardnieje i kuropatwy nie mogą go przebić, szukają miejsc rozgrzebanych przez zajacę, aby tu znaleźć pożywienie. Zmuszone głodem, nieraz zbliżają się do mieszkań ludzkich i pod stodoły.

Przepiórka (*Coturnix communis*) (Tab. V, fig. 3), różni się od kuropatwy kulistym kształtem i upierzeniem. Lato spędza wśród zboża, żywiąc się owadami i ziarnem. Głos jej „pójdźcie żać” już od maja rozlega się po polu i uprzyjemnia pracę rolnikowi. Życia rodzinnego, jak kuropatwy, nie prowadzi. Samiec nie pilnuje wysiadującej jaja samicy,



Fig. 191. Jarząbek.




Fig. 192. Kuropatwa.

ani troszczy się o pisklęta, które w drugim tygodniu swego życia nabierają takiej wprawy w poszukiwaniu pokarmu, że już nie idą za głosem nawołującej je matki, tylko same troszczą się o siebie.

Jest to ptak przelotny i na zimę odlatuje do południowej Europy, a nawet do Afryki. Większą część tej drogi odbywają przepiórki pieszo, przez morza zaś przefruwają, co je tak męczy, że masami spadają wycieńczone na statki. To też w czasie tego „ciągu” niemiłosiernie niszczą je ludzie i różni drapieżnicy.

142. Z rodziny **bażantów** przedstawiony jest na *Tab. V, fig. 1, Bażant srebrny* (*Phasianus nycthemerus*); ma on grzbiet, skrzydła i ogon białe z drobnymi czarnymi prążkami. Pochodzi z Chin, gdzie jest oddawna oswojony.

Ważniejszym jest **Bażant zwyczajny** (*Phasianus colchicus*) o bardzo pięknym, barwnym, połyskującym upierzeniu. Dawniej utrzymywano te ptaki w znacznej ilości w odpowiednio urządzonych bażantarniach; dziś bażantarnie zamknięte spotykają się rzadziej; częściej znajdują się bażantarnie na pół dzikie.

Samica ukrywa gniazdo zawsze w zaroślach i opiekuje się przez długi czas pisklętami, bo są bardzo bojaźliwe i głupie; nawet stare ptaki tracą przytomność w razie niebezpieczeństwa, wskutek tego łatwo dają się uchwycić. Mięso bażanta jest bardzo smaczne.

Ojczyzną bażanta jest Azja i południowa Europa; tam żyje jako ptak leśny w lasach mieszanych, gdzie w dzień chodzi po ziemi, a noc spędza na gałęziach.

Najwspanialsze ubarwienie, pełne purpurowej i złotawej barwy, ma **Bażant złoty** (*Phasianus pictus*), hodowany u nas tylko w zamkniętych bażantarniach.

Bażant Argus (*Argus giganteus*) (fig. 193), jest to piękny ptak jasno-brunatny z czarnymi cętkami; lotki jego skrzydeł usiane są prześlicznymi oczkami. Samiec ma prócz tego w ogonie dwa długie pióra. Za-



Fig. 193. Argus.

mieszkuje dziewicze lasy Malakki i Sumatry. Są to bardzo płochliwe ptaki i trudne do złapania.

143. **Kura domowa** (*Gallus domesticus*) (fig. 194), od bardzo dawnych czasów przyswojona, pochodzi prawdopodobnie od znajdującego się w Indjach gatunku **Bankiwy** (*Gallus ferrugineus*). Hodowla kur znana była już starożytnym Egipcjanom, którzy umieli sztucznie wylęgać jaja w specjalnie do tego urządzonych piecach.

Istnieje bardzo wiele odmian kur, z których jedne wyróżniają się obfitością i dobrocią znoszonych jaj, inne smacz-



Fig. 194. Kogut i kura z pisklętami.



Fig. 195. Kogut Kochinchina.

nem mięsem. Do takich odmian należą **kury kochinchińskie**, **brahmaputra** i inne. Wszystkie odznaczają się wielką troskliwością około swych piskląt i zapalem kogutów do walki.

Perlica (*Numida meleagris*) (fig. 196) pochodzi z Afryki; odznacza się krótkim ogonem i upierzeniem ciemno-szarem w białe kropki.

Indyk (*Meleagris gallopavo*) (fig. 197) w dzikim stanie zamieszkuje lasy Ameryki północnej, pędząc życie takie, jak u nas guszcze. Oswojony był już przed odkryciem Ameryki, a przez Hiszpanów przywieziony do

Europy. Jest to bardzo rozpowszechniony ptak, utrzymywany dla smacznego mięsa. Stare indyki są bardzo złośliwe:



Fig. 196. Perlica.

podrażnione, rozsuwają ogon, wydymają wyrostki czerwone na szyi, t. zw. *korale* i z krzykiem rzucają się na napastnika.



Fig. 197. Indyk.



Fig. 198. Paw.

Paw (*Pavo cristatus*) (fig. 198), piękny ptak, pochodzący z Indji i Cejlonu, gdzie dotąd znajduje się w dzikim stanie. Według podania, miał go Aleksander Macedoński przywieźć do Europy. Znany jest wszystkim wspaniały ten ptak ze stojącym czubkiem na głowie i pięknym długim ogonem, złożonym z piór złocisto-zielonych, usianych barwnymi oczkami. Ogon ten może paw roztoczyć w szeroki kolisty wachlarz i wtedy ma wygląd wspaniały. Jest bardzo próżny ze swego upierzenia i chętnie popisuje się na słońcu blaskiem swoich piór. Samica pozbawiona jest tej pięknej ozdoby; jest szaro-zielona z mieniącym połyskiem.

Głos ma bardzo nieprzyjemny, przeraźliwy. W „dżunglach” czyli zaroślach Indji towarzyszy paw tygrysowi, a gdy zapada zmierzch, krzyk jego ostrzega mieszkańców o tem, że drapieżnik ów porzucił swoje legowisko i udaje się na łowy.

Rząd VI. Biegające.

144. Wyróżniają się wśród innych ptaków nierozwiniętymi skrzydłami i silnymi nogami. Pióra ich mają odrębną budowę: pierze nie tworzy chorągiewek, lecz rozsypuje się luźnie nakształt włosów.

Największym z biegających, a zarazem największym ze wszystkich ptaków obecnie żyjących jest **Struś afrykański**

(*Struthio camelus*) (Tab. V, fig. 7). wysokość jego dosięga 2 metrów. Zamieszkuje pustynie Afryki, gdzie żyje gromadnie. Pierze na całym ciele ma czarne, tylko pióra na ogonie i skrzydłach śnieżno-białe, przytem długie i kręcone; pióra te, wskutek swej piękności, stanowią przedmiot pożądliwości ludzkiej od bardzo dawnych czasów. Nogi z przodu tylko okryte łuszczkami, mają po dwa palce; uda nagie. Długa szyja i głowa pokryta rzadkim puchem. Kroki jego są nadzwyczajnie szybkie i zajmują 12—14 stóp każdy, tak, że struś mógłby się ścigać z koleją żelazną. Szybkość więc jego biegu jest ogromna i na niej polegając, zwykle ucieka od niebezpieczeństwa, które bystrem okiem zdala dostrzega. W biegu rozwija skrzydła. Żywi się roślinami i owadami; połyka kamyki i inne twarde przedmioty, które mu pomagają do trawienia pokarmów. Gniazdo jego jest dołkiem, wykopanym w piasku; samica składa węń jaja, z których każde waży do 3 funtów i równe jest co do wielkości 24 jajom kurzym. Jaj tych znajduje się w gnieździe 15 — 20, a nawet i dwa razy tyle. Wysiaduje je samiec, a gdy zmuszony jest porzucić na jakiś czas guiazdo, przysypuje jaja piaskiem. Stąd powstało mniemanie, jakoby struś nie wysiadywał sam jaj, lecz pozostawiał je do wygrzewania na słońcu. Samiec też opiekuje się pisklętami. Z początku żywią się one owadami, a gdy się wzmocnią, przechodzą do pokarmu roślinnego. Dopóki pisklęta są tak małe, że nie mogą uciekać, w razie niebezpieczeństwa przysiadują na piasku, a barwa ich szara czyni je wtedy prawie niewidocznymi. Gdy dorosną do wielkości koguta, uciekają już razem z rodzicami.

Struś zwykle głupi, okazuje jednak wiele sprytu i poświęcenia, gdy idzie o ratowanie piskląt.

„Podróżnicy: Anderson i Galton, napotkali na suchej, pozbawionej roślinności równinie parę strusiów z licznem potomstwem wielkości kur domowych, i puścili się w pogoń za stadem. Cała rodzina uciekała pod wodzą matki, samiec zaś zamykał pochód. Widok to był prawdziwie wzruszający, jak te wielkie ptaki czuwały nad pisklętami. Skoro spostrzegły zbliżanie się pogoni, wtedy samiec zwolnił biegu i zmienił kierunek; zobaczywszy wszakże, że nie może zbić z tropu pogoni, zaczął z rozpostartymi skrzydłami biegać dokoła ścigających na odległość strzału pistoletowego. Nagle padł na ziemię, jak gdyby był ciężko raniony, tak, że

Anderson, który do niego strzelił, sądził, że go rzeczywiście trafił, lecz gdy się zbliżył, ptak zerwał się i puścił się dalej za stadem, które tymczasem zdołało się znacznie oddalić. Nareszcie, po całodziennej pogoni, udało się schwycić kilkoro młodych."

Ponieważ struś biegnie po linii prostej, pewny, że go żaden koń nie doścignie, więc Arabowie zwykle w kilku wybierają się na polowanie. Pozbywszy się wszelkiego niepotrzebnego ciężaru, uzbrojeni tylko w lekkie i długie kije tamaryszkowe *), stają w odległości mili jeden od drugiego na drodze, po której przypuszczalnie ma biedz struś. Skoro stado się ukaże, pierwszy jeździec ściga go aż do punktu, gdzie znajduje się drugi; ten prowadzi pościg dalej, za nim w pewnej odległości trzeci i tak trwa, dopóki wyczerpane ptaki nie zostaną zabite uderzeniem kija po głowie. Całe to barbarzyńskie polowanie odbywa się wyłącznie dla kilku-nastu piór, które mają służyć tylko do ozdoby! Mięso strusia i jaja są jadalne; ze skorup jaj robią naczynia.

Ponieważ ostatnimi czasy ptaki w znacznym stopniu wytępiono, rozpoczęto więc na południu Afryki sztuczną hodowlę, która idzie bardzo pomyślnie, a ma tę dobrą stronę, że ptaka nie zabijają dla kilku piór, lecz wyrwywają mu je żywcem, poczem odrastają one nanowo. W kolonii Kapu w roku 1875 znajdowało się 32,000 oswojonych strusi, które dały piór za 2,000,000 rubli. Cała ilość piór, przywożonych rocznie z Afryki, ma wartość 10,000,000 rubli. Tyle pieniędzy wydaje się co-rocznie na jeden taki stroik!



Fig. 199. Struś amerykański.

Do strusiów zbliżony jest **Rea** czyli **Nandu** (*Rhea americana*) (fig. 199), struś stepowy amerykański. Pióra jego są również przedmiotem handlu, nie cenią się wszakże tak wysoko jak afrykańskie. Nandu ma nogi trójpalczaste; podobnie jak struś afrykański, przebywa często ze stadami lam i wigoni. Mięso jego jest jadalne.

Australja ma strusia **Emu**, podobnie jak amerykański trójpalczasty, o piórach wązkich, wstążkowatych, barwy brunatnej.

*) Kije z gałęzi rośliny zw. Tamaryndowiec.

145. **Kazuar hełmiasty** (*Casuarius galeatus*) (fig. 200), również jak inne gatunki kazuarów, mieszka na wyspach Moluckich. Upierzenie, podobne do włosia, ma czarne, pod gardłem czerwone; boki i tył głowy zielone. Mieszka w gęstwinie lasów i żywi się pokarmem roślinnym. Nogi ma krótkie, silne, o 3 palcach, na głowie hełmiastą, rogowatą narośl.




Fig. 200. Kazuar.

Nielot czyli **Kiwi** (*Apteryx australis*) (fig. 201), mieszkający w Nowej Zelandji, jest mało co większy od koguta i pokryty jednostajnym pierzem; skrzydła bardzo mało rozwinięte; ogona brak zupełnie. Dziób długi, otoczony przy nasadzie szczeciniastym włossem, stanowi zarazem bardzo czuły organ dotyku; wtykając go w ziemię, wyciąga z niej ostrożnie liszki owadów i robaki, którymi się żywi. Palców ma cztery, z których czwarty słabo rozwinięty i w tył zwrócony. Na żer wychodzi tylko w nocy, w dzień kryje się. Światło pochodni tak go zadziwia, że można go wtedy rękami schwytać.



Fig. 201. Kiwi.

Rząd VII. Podkasałe czyli brodzące.

146. Mają najczęściej dziób długi, cienki, nogi długie, których palce są tylko zlekka otoczone błonkami lub zupełnie wolne. Żyją przeważnie w miejscach wilgotnych i na brzegach wód. Dzielą się na dwie gromady:

1) **biegające**, mające nogi przystosowane do szybkiego biegu; piskłeta ich natychmiast po wylęgnięciu porzucają gniazdo i idą szukać pożywienia;

2) **brodzące właściwe**, mające nogi zastosowane do poważnego stąpania; piskłeta zostają jakiś czas w gnieździe. Są to ptaki błotne właściwe; żywią się pokarmem zwierzęcym: rybami, żabami i t. p.

147. Do *biegających* należą:

Czajka (*Vanellus cristatus*) (fig. 202), jest pospolitym ptakiem w okolicach wód; gdzie ciągle daje się słyszeć jej głos, ostrzegający inne ptaki o niebezpieczeństwie. Głowę, podgardle, wierzch piersi i ogon ma czarne; płaszcz ciemno - zielony; spód piersi i podbrzusze białe. Na głowie ma zieloną kité. Jest to ptak przelotny, przybywający do nas jednocześnie ze szpakami i skowronkami. Gnieździ się na łąkach w pobliżu wód i czuwa nad tem, aby jaki inny ptak nie objął jej posiadłości. Jaja składa w dołku, w ziemi. Jaja te, koloru oliwkowego z ciemnymi plamkami, poszukiwane bywają jako przysmak.



Fig. 202. Czajka.

Kulig morski (*Haematopus ostralegus*) (fig. 203), mieszka nad brzegiem morza, począwszy od Północnego aż do Śródziemnego. Na morzu Północnem bawi przez lato, odlatując na zimę na południe. Ostry dziób jego służy za narzędzie obrony. Żywi się robakami, rakami i drobnymi rybkami.



Fig. 203. Kulig.

Siewka (*Charadrius pluvialis*) (fig. 204) mieszka nad wodami śródlądowymi w Europie, na piaszczystych brzegach rzek. Przelatuje dwa razy przez Europę środkową, lecąc na lato na północ i wracając na zimę do Afryki północnej. Głos ma przenikliwy, świszczący.



Fig. 204. Siewka.



Fig. 205. Bekas.

148. Do rodziny **bekasów** należą:

Bekas dubelt (*Scolopax major*) (fig. 205), ciemno - brązowy z podbrzuszem białawym, stanowi wyborną zwierzynę.

Słonka (*Scolofax rusticola*) jest ptakiem przelotnym. Zamieszkuje lasy liściaste i iglaste, przecięte wilgotnymi łąkami. Jest bardzo trwożliwa i chętnie przebywa w gęstych zaroślach wśród zeschłych liści, gdzie staje się wskutek swej barwy trudną do rozróżnienia. Żywi się robakami i gąsienicami, które długim swym dziobem wyciąga z bagnistego gruntu. Gdy niebezpieczeństwo zagraża, bierze pisklę w łapy, unosi się z niem w powietrzu (fig. 206) i przenosi je do spokojniejszego miejsca. Gniazdo jej znajduje się w gęstych zaroślach.



Fig. 206. Słonka przenosząca pisklę.

Jaja składane w liczbie 3—4 są koloru rdzawo-żółtawego.

Drop (*Otis tarda* (Tab. V, fig. 5), jest wielkości indyka lub większy. Zamieszkuje Europę środkową i południową. Przebywa w dzień wśród zboża, w nocy zaś na ugorach lub otwartych miejscach, czując się tu bezpieczniejszym. Wtedy całe stado leży, przypadłszy do ziemi: młode ptaki w środku, starsze dokoła nich; ale sen ich jest bardzo lekki, tak, że niepodobieństwem jest podejść niepostrzeżenie pod stado. Każdy nowy przedmiot, którego przedtem dropie nie widziały, zwraca ich uwagę i potrzeba długiego czasu, zanim się oswoją z nim i ośmielą się zbliżyć do niego. Wskutek ich ostrożności i szybkiego biegu, polowanie na nie jest trudne. W młodości drop żywi się owadami, a później pokarmem roślinnym. Zimą i lato spędza w tej samej miejscowości. Za gniazdo służy mu dołek, wykopany wśród zboża, jaknajdalej od brzegu; składa dwa jaja, mniejsze od gęsich, barwy oliwkowej, ciemno nakrapiane.

Żoraw (*Grus cinerea*) (fig. 207), wysoki prawie na 1½ metra; upierzenie ma popielate z czarnem, dziób przy nasadzie czerwony. Znajduje się w całej Europie. Gnieździ się zwykle na polach przeciętych bagnami; gniazdo ukrywa w niedostępnych miejscach, ale sam nigdy nie przylatuje wprost do niego, lecz spuszcza się na ziemię opodal, a potem zbliża się ukradkiem, czając się w trawach. Jaja są duże, zielonawe

w cętki. Pisklęta już po kilku dniach opuszczają gniazdo.



Fig. 207. Żóraw.

ry <, ostrym końcem obróconą w kierunku lotu („klucz”). Lecą w dzień wysoko i kraczą; w nocy zaś nisko, ale wtedy nie wydają głosu. W krajach południowych trzymają się



Fig. 208. Łyska.

wielkimi stadami; gdy przylatują do nas, rozbijają się na pary i odszukują dawne swoje gniazda.

Żóraw afrykański (*Grus virgo*) ma wierzch popielaty, skrzydła białe, a podbrzusze czarne. Znajduje się w zachodniej Afryce. Jest mniejszy od naszego.

Łyska (*Fulica atra*) (fig. 208) ma błony u palców, dobrze pływa i nurkuje; wogóle trybem życia zbliża się do ptaków wodnych.

Żywi się owadami, ślimakami i ikrą rybią. Znajduje się obficie na stawach porośniętych trzcina.



Fig. 209. Czapla.

Podobna do niej **Kokoszka wodna** (*Gallinula chloropus*), żyje na bagnach i mniejszych stawach; jest to ptak wędrujący.

149. Do *brodzących właściwych* czyli *szczudłowatych* należą:

Czapla siwa (*Ardea cinerea*) (fig. 209), siwo-popielata, pod spodem biała. Szyję i nogi ma długie; na głowie czubek, złożony z kilku długich piórek. Brodzi powoli po płytkich wodach i co

chwila chwytą swoim długim dziobem zdobycz, którą stanowią przeważnie ryby, żaby i większe owady. W braku innego pożywienia, zjada myszy i małe ptaszki.

Czaple gnieźdzą się na wysokich drzewach licznymi kolonjami, tak, że dokoła jednego stawu bywa po kilkanaście gniazd. Kolonja ogromnie ożywia się, gdy wylęgnięte pisklęta dopominają się o pokarm, który im znoszą rodzice. Na tych samych drzewach gnieźdzą się najczęściej i wrony; kradną one czaplem jajka z ich gniazd, wskutek czego trwa ciągła wojna pomiędzy temi ptakami.

Inne gatunki czapli są u nas rzadkie. Do najpiękniejszych należy **Czapla jedwabista** (*Ardea nivea*), zamieszkująca rozległe bagniska węgierskie.

Bąk (*Botaurus stellaris*) (Tab. V, fig. 8), ptak nietowarzystki, mieszkający nad stawami, w trzcinach i sitowiu; żywi się rybami, jaszczurkami i drobnymi zwierzętami czworonogiemi. Jest duży i krępy, a wskutek nastroszonych piór barwy żółto-brunatnej przybiera dziwaczne postacie, przypominające otaczające go przedmioty, tak, że trudno go nieraz dostrzedz na bagnie; wydaje huczący głos, daleko się rozlegający.

Z bocianów znane są u nas dwa gatunki:

150. **Bocian biały** (*Ciconia alba*) (fig. 210) i **Bocian czarny** czyli **hajstra** (*Ciconia nigra*). Ostatni mieszka w lasach; pierwszy zaś, biały z czerwonym dziobem i czerwonymi nogami, znany każdemu, od dawien dawna zostaje w zażyłości z człowiekiem, gnieźdząc się w sąsiedztwie jego mieszkań na wysokich drzewach i stodołach, na które bywa nawet zapraszany przez gospodarza, zakładającego w tym celu na dachu koło; na niem bociany budują gniazdo. Ptaki te corocznie powracają do tych samych gniazd, witane z radością, jako zwiastuny wiosny. Bocian jest ulubionym ptakiem naszego ludu; liczne piosnki i podania poświęcane są „boćkowi.” Charakterystyczne jest przywiązanie jego do gniazda rodzinnego. Pewnego razu przyczepiono do szyi bociana przed odlotem mosiężną tabliczkę z napisem łacińskim: „Bocian ten jest z Polski.” Na wiosnę bocian przyleciał napowrót, ale miał na szyi złotą tabliczkę z napisem łaciń-




Fig. 210. Bocian biały.

skim: „Indja wraca z darami bociana Polsce.” Bociany są ptakami drapieżnymi: pożerają one pisklęta mniejsze i większe, zajączki i t. d. Tępią jednak także i wiele szkodliwych dla człowieka zwierząt, jak myszy i inne; głównie zaś polują na ryby i żaby. Sympatyczne te ptaki zasługują więc ze wszelch miar na opiekę i obronę. Pisklęta bocianie są bardzo żarłoczne i przez dwa miesiące nie porzucają gniazda, żywiąc się tem, co rodzice przynoszą.

Gdy następuje pora odlotu, zaczynają się bociany gromadzić z rozmaitych stron; zdaje się, że na takich zebraniach odbywa się ocena zdolności do lotu pojedynczych ptaków: osobniki słabsze skazane bywają na zagładę i spokojnie znoszą razy dziobów współtowarzyszów, spełniających wyroki śmierci. Po tych naradach, krążą jeszcze jakiś czas ogromnemi stadami nad okolicą, jakby żegnając się z nią i znikają wszystkie razem.

Marabut czyli **bocian wolasty** (*Leptoptillus crumenifer*) (Tab. V, fig. 10), ma długi, zwisający worek pod dziobem, upierzenie barwy szaro-zielonawej, szyję i głowę cieliste, w ogonie długie, miękkie, fryzowane pióra, które używane są na ozdoby. Jest to ptak bardzo żarłoczny: pożera myszy, szczury, młode krokodyle, również chętnie jada padlinę. Zamieszkuje Indje.

151. Ibis czczony (*Ibis aethiopica*) (Tab. V, fig. 14), jest biały, dziób, głowę i szyję ma czarną, lotki granatowe. Znajduje się w środkowej Afryce. W Egipcie starożytnym ukazywał się jednocześnie z wylewem Nilu i czczony był jako tępicieł węży. Ciało jego balsamowano po śmierci.

Ibis gnieździ się na drzewach, żywi się jaszczurkami, rybami i szarańczę.

Ibis brunatny (*Ibis falcinellus*), o upierzeniu kasztanowatym, spotyka się w południowej Europie na bagnach, stawach i jeziorach.

Czerwonak czyli **Flaming** (*Phoenicopterus roseus*) (Tab. V, fig. 13), zamieszkuje kraje nad morzem Śródziemnem. Ma bardzo długą szyję, także nogi i dziób jakby załamany, którym zręcznie wydobywa z wody pożywienie. Jest to ptak bardzo piękny, barwy białej z cielistym odcieniem, skrzydła i nogi czerwone, lotki czarne. Znosi dwa jaja w gniazdo stożkowatego kształtu, zbu-



Fig. 211. Czerwonak na gnieździe, wysiadujący jaja.

dowane na płytkiej wodzie z mułu i roślin. Młode po wykluciu idą zaraz do wody, po której brodzą i pływają. Są to ptaki bardzo towarzyskie i żyją w wielkich stadach.

Rząd VIII. Pływające czyli płetwonogie.

152. Nogi mają krótkie, osadzone w tyle ciała, przednie trzy palce połączone płetwami. Życie pędzą przeważnie w wodzie; tylko dla złożenia jaj i wylęgania porzucają swój właściwy żywioł, w którym też znajdują i pożywienie, przeważnie zwierzęce. Pierze obfite i tłuste chroni ich skórę od zamoczenia.

Pierwszy dział stanowią **Nury**, z pomiędzy których **Pingwiny** czyli **Bezlotki** (fig. 212), są jakby fokami w królestwie ptaków. Skrzydła ich porośnięte krótkimi, podobnymi do łusek piórami, przypominają płetwy fok i nie służą im do lotu, tylko jako płetwy przy pływaniu. Pokrycie ciała, złożone z drobnych, rozszczepionych piórek, czyni je jeszcze bardziej do fok podobnymi. Chód tych ptaków ciężki i niezgrabny, najczęściej zamienia się na pełzanie przy pomocy nóg; do lotu są niezdolne. Mieszkają w morzach, otaczających biegun południowy; z wody wychodzą w niezliczonych stadach, i wtedy gnieźdzą się na skałach. Istnieje około 20 gatunków pingwinów, wśród których **Bezłotek olbrzymi** (*Aptenodytes patagonica*) jest największy, dorasta bowiem jednego metra długości; upierzenie ma barwy szarej z białą i czarną. Zamieszkuje południowe strony oceanu Spokojnego.



Fig. 212. Pingwin.

„Zachowanie się tych dziwnych, dotychczas niewidzianych istot, było powodem dla naszych pierwszych żeglarzy do zabawnych pomyłek — powiada Michelet. — Widziane zdaleka na skalistych wysepkach niezliczone gromady bezłotków ze swoim czarno-białym upierzeniem, wydawały się jakby rzesze dzieci w białych fartuszkach. Małe ich, niezgrabne rączki (gdyż skrzydłami szczątków tych nazwać nie można), nie-

pewne ich ruchy na lądzie, chwiejny chód, przykuwają je do fal oceanu, po których wybornie pływają i które są ich właściwym żywiołem.”

153. Drugą rodzinę stanowią **Alki**, zamieszkujące okolice obu biegunów. Te mają już skrzydła z lotkami, ale tak krótkie i słabe, że nie pozwalają ptakom tym wykonywać obrotów w powietrzu. Z trudnością podnoszą się z ziemi, lecz będąc raz w powietrzu, lecą dość szybko.

Alka północna (*Alca arctica*) (fig. 213), zamieszkuje morze lodowate północne; ubarwienie ciała z wierzchu czarne, spodem białe; czerwonawy dziób podobny do papuziego. Ptaki te i ich jaja stanowią główne pożywienie mieszkańców północy. Półów ich tak opisuje pewien przyrodnik:




Fig. 213. Alka.

„Skaliste urwiska nadbrzeżne szczególnie są przydatne do gnieźdzenia się tych ptaków, a zauważono tam ze dwadzieścia pięć „górszyszek,” mieszczących najliczniejsze ich kolonje. Opis jednej z nich da nam pojęcie o ży-

ciu alk, oraz o krajobrazie wysp Faröer.

„Nagle od powierzchni morza wznosi się czarna, pionowa skała, wysoka na 700 stóp, u której podnóża znajduje się głęboka, na wylot przechodząca rozpadlina, tworząca jakby olbrzymią bramę i zakończona małą zatoką, w której jednak duże nawet łodzie mogą się swobodnie obracać. Przez tę bramę, przy spokojnem morzu, wpływają do zatoki łodzie niosące łowców.

„Tutaj przedstawia się oczom widok prawdziwej tych wysp przyrody; pod sobą mamy głębię morską z właściwem jej ciemno-zielonem zabarwieniem, dokoła pochyłe lub pionowe skały, zdające się sięgać wierzchołkami niebios, w górze zaś skrawek jasnego błękitu nieba, nakształt przejrzystego dachu. U stóp skał głazy i rumowiska leżą w chaotycznym nieładzie; pomiędzy niemi głębokie, przez nikogo niezbadane rozpadliny i pieczary, w których wrą i kipią morskie bałwany, rozbijające się na pianę o skały. Gdyby tu nie było ptaków, cały ten widok robiłby przerażające wrażenie; ale dzika ta ustrona ożywiona jest rojami najrozmaitszymi.

szych ptaków morskich, z których jedne siedzą na złomach skał zupełnie nagich, albo pokrytych warstewką ziemi, utworzoną wskutek wietrzenia skały; inne z wrzaskiem krążą dookoła albo pływają i nurzają się w zatoce.

„Jak te góry ptasie są właściwością wysp Faröer, tak łowienie ptaków jest objawem największej zręczności ich mieszkańców. Zwykle używają oni do tego sieci, która jednak stosownie do gatunku ptaków i miejscowych właściwości, rozmaicie bywa stosowana. Siatka jest związana z grubszych i cieńszych nici, nakształt worka, utwierdzona u dwóch cienkich pałaków i przymocowana do długiej na 6 łokci żerdzi. Uzbrojony takim narzędziem ptasznik, udaje się na miejsce najgęstszego przelotu ptaków i chwyta je siecią, do czego jednak potrzeba wielkiej pewności oka i ręki. W celu łowienia ptaków, gnieźdzących się na porastających trawą pochyłościach skał, udaje się ptasznik na odpowiednie dostępne miejsce, gdyż, podobnie jak strzelec alpejski, nie lęka się zawrotu głowy, i zasiada tam z siatką w rękę. Nie należy sobie wyobrażać, że siedzi tam wygodnie; leży raczej na pochyłej skale, oparty nogami o kępkę trawy; jeśli ta została rozmoczona przez śniegi i deszcze, i ustąpi pod naciskiem, wówczas nieszczęśliwy ptasznik spada, gruchocąc się o skały—i znajduje śmierć w głębinie. Jeśli miejsce, w którym się ptaki gnieźdzą, znajduje się zbyt nisko na ścianie skały, wówczas czterech do ośmiu ptaszników spuszcza się tam na linach, a przybywszy na miejsce połowu, zakładają obozowisko na dni kilka, czasem na tydzień, gdyż w połowie maja, to jest wtedy, gdy ptaki po raz pierwszy się niosą, trwa zwykle piękna pogoda.

„W takim razie ptasznicy zabierają z sobą krzesiwo i torf, jadło i napój. Na noc wpełzają w rozpadlinę skały, albo układają się do spoczynku za wielkim kamieniem; czasem i tego zrobić nie mogą dla zbyt wielkiej spadzistości, muszą się wtedy uwiązywać do głazów, aby nie spaść na dół w czasie snu. Złapane ptaki wrzucają do łodzi, stojącej w zatoce, albo gdy morze jest wzburzone i dostęp dla łodzi niemożliwy, wiążą je w pęki i wyciągają linami do góry.

„Skoro łów się ukończy, albo nastąpi zła pogoda, wtedy ptaszników wyciągają na linach do góry; lecz jeśli siedlisko ptaków znajduje się znacznie niżej, wówczas spuszcza się na linach do czekającej na dole łodzi.”

154. **Perkoz czubaty** (*Podiceps cristatus*) (Tab. V, fig. 11)

ptak piękny, z wierzchu czarny, spodem biały, silnie poły-
skuający, na głowie ma czub, wkoło szyi kołnierz, który mo-
że rozwinąć; pływa bardzo zręcznie, lekko i szybko i nurza
się wybornie. Lato spędza w Europie, a na zimę wędruje
na południową półkulę, w części lecąc, w części płynąc. Ży-
wi się rybami, rakami, owadami wodnymi, które łowi bardzo
zręcznie. Gniazdo jego mieści się zawsze na samym brzegu,
zarosłym trzcina i sitowiem; pływa ono po wodzie, przy-
twierdzone do brzegu żdźbłami i łodygami roślin; zrobione
jest z roślin wodnych, które ptak wydobywa z głębi razem
z mułem. Gdy perkoz oddala się od gniazda, przykrywa
jaja mokrym szlamem. Pisklęta sypiają przez pewien czas
na grzbiecie rodziców; stare ptaki otaczają je wielką tro-
skliwością, a w niebezpieczeństwie chowają je pod skrzydła
i zanurzają się razem z nimi w wodę.

155. Drugi dział stanowią ptaki **Długoskrzydłe**, zdolne
do bardzo szybkiego i wytrwałego lotu. Dziób mają silny,
niektóre haczykowato zakrzywiony.

Do tego działu należy **Albatros** (*Diomedea exulans*) (Tab.
V, fig. 15), wielki ptak, którego rozpostarte skrzydła dosię-
gają $3\frac{1}{2}$ m.; upierzenie barwy białej, skrzydła czarne. Wła-
ściwą jego ojczyznę są wyspy Aukland i wogóle morze po-
łudniowe; spotyka się wszakże i w północnych stronach, a na-



Fig. 214. Petrel lodowy.

wet na morzu Behringa. Pta-
ki te towarzyszą zwykle okrętom
i chwytają wszystko, co z okrętu
wyrzucają. O ile doskonale la-
tają, o tyle niezgrabne są na lą-
dzie; są też złemi nurkami.

Petrel lodowy (fig. 214) żyje
na otwartych miejscach morza
Północnego; ukazanie się jego jest
wskazówką dla żeglarzy, że nie-
daleko znajduje się otwarte mo-
rze. Jest to ptak niewielki, bar-

wy z wierzchu szarej, spodem białej.

Petrel czyli **Jaskółka morska** (*Thalassidroma pelagica*)
(fig. 215) jest niewielkim ptaszkiem barwy matowo - czarnej;
uwija się masami, podobnie jak albatros, dokoła okrętów.
Według mniemania majtków pojawienie się tych ptaszków
jest złą wróżbą dla żeglarzy: mają w nich pokutować dusze

zmarłych żeglarzy, a zjawienie się ich w otwartym morzu ma zwiastować burzę, co w rzeczywistości jest prawdą, gdyż w wzburzonym morzu trudniej im jest chwycić w wodzie pożywienie, wtedy więc zbliżają się do okrętów. Zabicie jednego takiego ptaszka, według mniemania marynarzy, staje się przyczyną zguby dla okrętu. Petrele spędzają prawie całe życie nad morzem; za gniazdo służy im dołek, wygrzebany w szparze nadbrzeżnej skały; samica składa tylko jedno jajo.



Fig. 215. Petrel czyli jaskółka morska.

156. Bardzo liczną rodzinę długoskrzydłych stanowią **Mewy** (*Laridae*). Jedne z nich same starają się o pożywienie, chwytając ryby (*rybołowy*); inne korzystają z cudzej pracy, ścigają żywiące się rybami ptaki i wydzierają im zdobycz (*mewy napastnicze*).

Największą z mew jest **Mewa olbrzymia** (*Lestrnis catarractes*), długa na 55 cm.; rozpostarte jej skrzydła sięgają do 1 m. 40 cm.; barwy jest brunatnej z rdzawo-czerwoną. Zamieszkuje północną Norwegję i wyspy północnej Europy. Jest to drapieżnik, rzucający się na mniejsze ptaki; nawet albatrosa ściga dopóty, aż zmusi go do porzucenia zdobyczy. Mewa olbrzymia rzuca się na człowieka i na psy, gdy zbliżają się do jej gniazda. Gnieździ się na skalistych wybrzeżach. Mewy, chociaż są przeważnie ptakami morskimi, trzymają się zawsze brzegów i nie puszczają się na otwarte morze. Dlatego też ukazanie się mew jest dla żeglarza pewną oznaką bliskości lądu. Życie ich jest bardzo rucholiwe.

„Dniem i nocą, na południu i na północy, nad wodą lub nad brzegiem, w pogoni za martwą lub żywą zdobyczą, wszystko to jedno dla tych ptaków. Korzystając ze wszystkiego, co się tylko nadarzy, czując się wszędzie jak u siebie w domu, unoszą się na białych swych skrzydłach pomiędzy niebem a wodą; każda zmiana kierunku wiatru jest dla nich pomyślna; wiatr je niesie tam, gdzie dla nich najlepiej... Mewy nie wyglądają wcale dziko, ruchem swych białych skrzydeł bawią one żeglarza i jakby opowiadają mu

o dalekich krajach, o brzegach, które dopiero co opuścił, lub tych, które wkrótce zobaczy, o nieobecnych lub oczekiwanych przyjaciółach. Nie mniejszą też czynią mu przysługę, oznajmiając o zbliżającej się burzy: często skrzydła ich białe, jak żagle rozpostarte, ostrzegają go, że właśnie nadchodzi pora zwinąć żagle okrętu. Nie należy bowiem sądzić, że za nadejściem burzy ptaki te składają swe skrzydła. Przeciwnie, burza jest dla nich porą żniwa; im burzliwsze jest morze, tem trudniej rybnie uniknąć tych śmiałych łowców.⁷

Mewa śmieszka (*Larus ridibundus*) (Tab. V, fig. 9), znana powszechnie pod nazwą *rybitwy*, znajduje się zarówno na brzegach mórz Europy, Azji, północnej Afryki i Ameryki, jako też nad rzekami, stawami i jeziorami, porośłemi sitowiem. Barwa jej ciała z wierzchu niebieskawa, spodem różowawo-biała, ślicznie odbija na tle zielonawego morza. Jaja jej, oliwkowo-zielone z brunatnymi cętkami, poszukiwane są jako przysmak.

Na morzach północnych żyje **Mewa srebrzysta** i **Mewa morska**. Ta ostatnia jest jedną z największych i najpiękniejszych mew: wierzch ciała ma czarny, szyja, głowa i spód ciała lśniąco białe. Żarłocznością przewyższa wszystkie gatunki.

157. Oddzielną rodzinę, zbliżoną do mew, stanowią **Rybołówki**. Są mniejsze i zgrabniejsze od mew; mają ogon wcięty widełkowato, stąd nazwano je *jaskółkami morskimi*.

Rybołówka zwyczajna (*Sterna hirundo*) (Tab. V, fig. 12), o upierzeniu szaro-białem z czerwonymi nogami i takimże dziobem, jest najbardziej znaną. Zamieszkuje ona wody łądowe Europy, Azji i Ameryki. Całe stada ich unoszą się w powietrzu z ogromną szybkością. Gniazdo wygrzebuje sobie w piasku i w nie składa jaja.

158. Trzeci dział płetwonogich stanowią ptaki **Rudłonogie** (*Steganopodes*), mające wszystkie cztery palce u nóg połączone błoną.

Największym z tych ptaków jest **Kormoran** (*Phalacrocorax carbo*) (fig. 216), dochodzi do




Fig. 216. Kormoran.

90 cm. długości; rozpostarte jego skrzydła sięgają na $1\frac{1}{2}$ m. Grzbiet i skrzydła ma brązowe, głowę, szyję i piersi zielonawo-szare. Doskonale pływa i daje nurka; po lądzie chodzi bardzo źle, żwawo zaś czepia się gałęzi drzew, na których też gniazdo zakłada. Mieszka nad morzem i wodami lądowymi Europy, Azji i Ameryki północnej. Są to nadzwyczaj żarłoczne ptaki, niszczące ogromną ilość ryb.

W Chinach układają kormorany do połowu ryb; w tym celu wylęgają jaja, podkładając je kurom, a pisklęta, gdy wyrosną, przyzwyczajają do nurkowania, z początku na sznurku, a po kilku tygodniach skoro ułożą się zupełnie i dorosną, puszczają je bez sznurka w obrożach z nici, nie dozwalających im połykać schwytanej ryby, którą ptaki te posłusznie znoszą do łodzi i tu na gwizd łowców rzucają; potem nurkują po drugi połów. Gdy ryba jest tak duża, że jeden kormoran unieść jej nie może, inne pośpieszają mu z pomocą. Po skończonym połowie, łowcy puszczają je bez obróż, aby polowały dla siebie. Kormorany należą do ptaków najłotniejszych.

Fregata (*Atagen aquila*) (fig. 217) jest ptakiem najszybciej latającym z pośród ptactwa wodnego. Długi jest na 1 m. 10 cm., a siąg skrzydeł 2 m. 35 cm. Przy takiej wielkości waży cała zaledwie 3 funty. Leci bez trudności 80 kilometrów na godzinę, t. j. wyprzedza najszybsze pociągi. Barwa piór jest lśniąca, czarno-brunatna z purpurowym i zielonawym odblaskiem. Palce fregaty mają słabo rozwiniętą błonę, wskutek czego źle płyną; również niezgrabna jest na lądzie. Gniazda buduje z drobnych gałązek na drzewach lub skałach. Jako zły pływak, może fregata żywić się tylko latającymi rybami, które chwytą gdy te wzbijają się po nad wodę, albo poluje na inne ptaki obławowane zdobyczą i ścigając je, zmusza do porzucenia złowionej ryby, którą chwytą w locie i pożera. Prawdziwym jej żywiołem jest powietrze.




Fig. 217. Fregata.

„Mamy tu ptaka — powiada Michelet, — który cały jest w skrzydłach. Ciało jego wielkością dorównywa zaledwie kurze, ale rozpostarte skrzydła jego obejmują długość 14 stóp. Ptak, który od przyrody otrzymał taką budowę, daje

się tylko unosić falam powietrza. Skoro się zerwie wichur, wtedy wzbija się w wyższe warstwy i pławi się ponad chmurami w czystym i spokojnym lazurze niebios. Poetyczna przenośnia, nieodpowiednia dla innych ptaków, na nim sprawdza się w zupełności: ptak ten śpi na wicherach.

„Jeśli naprawdę chce użyć skrzydeł, wtedy dla niego znika wszelka odległość. Budzi się w Bengalu, a w Ameryce spożywa wieczorny swój posiłek. Może też sobie pozwolić na mniejszy pośpiech w drodze, odbywając ją w nocy, pewny, że w każdej chwili może wypocząć na skrzydłach, tylko rozpościerając je w powietrzu. Oddaje się w opiekę sługom swoim — wiatrom, których obowiązkiem jest kołysać go.”



Fig. 218. Głuptak.

Do tej grupy należą także **Głuptaki** (fig. 218), bardzo niezgrabne na lądzie, latają ciężko, ale dobrze nurkują. One to są zwykłemi, masowemi

dostawcami pożywienia fregat.

159. **Pelikan** (*Pelecanus onocrotalus* (Tab. V, fig. 16), zamieszkuje Europę południowo - wschodnią, Azję i Afrykę. Jest to największy z ptaków wodnych, o ciężkiej budowie ciała, dobrze jednak lata, pływa i chodzi po lądzie. Długość jego wynosi $1\frac{1}{2}$ metra, a siąg skrzydeł $2\frac{1}{2}$ metrów. Upierzenie jest białe; dziób jego ma osobliwą budowę: górna część jest spłaszczona i opatrzona na końcu haczykiem; dolna zaś składa się z dwóch gałęzi, między którymi skóra tworzy obszerny worek, żółtawej barwy, służący do łowienia ryb: pelikan chwytając nim ryby, a przykrywszy górną częścią dzioba, wypuszcza wodę, ryby zaś polyka.

Pelikany żyją kolonjami i łowią ryby towarzysko. Tworzą one całem stadem łańcuch i napędzają ryby do jakiej płytkiej zatoki, gdzie je z łatwością chwytają. Trzymają się przeważnie płytkiej wody, bo nurkować nie mogą. Gniazda budują z sitowia na bagnistym brzegu. Żyją w południowej Europie, napotykanie także na Węgrzech.

160. Dział **Blaszkodziobych** (*Camellirostres*) obejmuje ptaki wodne domowe, mające boki dzioba opatrzone szeregiem rogowatych, ząbkowanych blaszek.

Z tych **Łabędź** należy do najpiękniejszych ptaków, zamieszkujących stawy w naszych parkach.

Łabędź biały (*Cygnus olor*) (fig. 219) w stanie dzikim żyje na północy Europy i Azji stadami i składa jaja w gnieździe, uwitem z sitowia na kępce, otoczonej wodą. Żywi się owadami, które wydobywa sobie ze szlamu przy pomocy długiej szyi; hodowane, karmione są jęczmieniem. Jest to ptak silny, odważny, nie obawia się drapieżników i stacza walkę nawet z orłem. Pióra jego i puch są bardzo cenne. Młode łabędzie są szare.



Fig. 219. Łabędź biały.

Nieco mniejsze są **Czarne łabędzie** z czerwonym dziobem, hodowane również na stawach w parkach.

Łabędź krzykliwy (*Cygnus musicus*), barwy śnieżno-białej, może wydawać tony, przypominające dźwięki instrumentów dętych. Żyje na głębokiej północy Europy i Azji.

Gęś dzika czyli **Gęgawa** (*Anser cinereus*) jest przodkiem naszej **gęsi swojskiej** (fig. 220); przylatuje do nas w lutym, odlatuje zaś w sierpniu. Pierze ma z wierzchu szaro-brunatne, z dołu nieco jaśniejsze. Gniazda buduje na bagnach z gałązek i wyściela je własnym puchem.



Fig. 220. Gęś swojska.

Posiwnica (*Anser sepetum*) czyli **Gęś zimowa**, jak ją nazywają myśliwi, zwiedza nasze kraje w przelocie z krajów północnych, gdzie wysiaduje jaja. Te dwa gatunki nie lubią się nawzajem, a gdy przylatuje jeden, drugi opuszcza miejsce.

161. **Kaczka dzika** (*Anas boschas*) czyli **Krzyżówka** (fig. 221) jest prarodzicem naszej **Kaczki domowej** (fig. 222). Upierzenie samca barwy żółto-brunatnej w ciemne pęgi; samica jasno-brunatna, ciemno nakrapiana. Kaczka zamieszkuje całą północ-




Fig. 221. Kaczka dzika.



Fig. 222. Kaczka domowa.

na półkulę; w miejscowościach, gdzie wody zamarzają, odlatuje na zimę, gdzie zaś lodu nie ma, żyje przez cały rok. Gnieździ się na brzegach, zarosłych trzciną i sitowiem.

Kaczka edredonowa czyli **Miękkopiór** (*Somateria mollissima*) (fig. 223), z wierzchu biała, pod spodem czarna, po




Fig. 223. Kaczka edredonowa.

bokach głowy zwieszają się zielone pióra; samica jest szara. Gniazdo swoje wyściela delikatnym puchem z piersi; tym samym puchem okrywa jaja, gdy odlatuje z gniazda. Puch ten jest bardzo ceniony, więc aby go dostać, wdrapują się ludzie z wielkiem niebezpieczeństwem na wysokie, skaliste

wybrzeża północy, gdzie te ptaki gnieźdzą się w ogromnej ilości, i wydobywają puch z gniazda. Zabierają także i jaja. Taki rabunek odbywa się po dwa razy z każdego gniazda; za każdym razem ptak cierpliwie wyskubuje na nowo pierze i powtórnie składa jaja. Po raz trzeci zniesione zostawiają im ludzie zwykle dla lęgu, bo gdyby je zabrano, kaczki znichęcone opuściłyby na zawsze to gniazdo, przenosząc się w miejsce mniej dla człowieka dostępne.

KLASA III. PŁAZY.

162. Są to zwierzęta kręgowce, których ciało okryte jest łuską lub skorupą kostną; krew mają czerwoną, zimną, oddychają płucami i składają jaja. Niektóre z nich pozbawione są nóg. Wiele z nich w zimie wpada w odrętwienie.

Do klasy tej należą następujące trzy rzędy:

1. Żółwie. 2. Jaszczurki. 3. Węże.

Rząd I. Żółwie.

163. Szeroki tułów tych zwierząt zamknięty jest w skorupie kostnej, powstającej wskutek zrośnięcia się żeber; część grzbietowa skorupy jest wypukła, brzuszna płaska. Służy ona za ochronę zwierzęciu i ma otwory na głowę, ogon i cztery nogi. W razie niebezpieczeństwa żółw wciąga wszystkie te członki w skorupę. Szczęki nie mają zębów, lecz są tak ostre, że żółw odgryza niemi rośliny. Żółwie na lądzie są niezgrabne, w wodzie pływają zwinnie. Pancierz ich dostarcza szyldkretu.

Głównym przedstawicielem tego rzędu jest **Żółw słoniowy** (*Testudo elephantopus*), zamieszkujący skaliste wyspy Galapagos na zachodnim wybrzeżu Ameryki południowej.

Jest to olbrzymie i ciężkie stworzenie (mające przeszło




Fig. 224. Szkielet i skorupa żółwia.

metr długości), żywi się kaktusami; podróżuje nieraz daleko w głąb wyspy po słodką wodę, którą bardzo lubi. Darwin tak je opisuje:

„Spotkałem na drodze dwa wielkie żółwie, z których każdy mógł ważyć około 100 kilogr. Jeden z nich zjadł kawałek kaktusa; spojrzał na mnie, gdym się zbliżył i spokojnie popełznął dalej; drugi zaś zasyczał i schował głowę w skorupę. Ogromne te płazy wśród głazów czarnej lawy, bezlistnych krzaków i potwornych kaktusów, wydawały się jakby istoty z pierwotnego świata.”

Indianie jedzą ich jaja, a z żółwi wytapiają tłuszcz.

Żółw błotny (*Emys europea* v. *Cistudo lutaria*) (Tab. VI, fig. 7), osiąga 40 cm. długości. Tarczę ma czarną z żółtymi kropkami i pręgami, promienisto ułożonemi. Zamieszkuje bagna, stawy, błota i jeziora Europy południowej i środkowej. Pływa i nurza się doskonale, musi jednak od czasu do czasu wypływać na powierzchnię dla zaczerpnięcia powietrza. Żywi się rybami, ikłą żabią, ślimakami i t. p. Hodowany bywa w akwariach; mięso jego jest jadalne.

Żółw jadalny (*Chelone esculenta*) jest największym z żółwi. Długość jego osiąga 2 m. 30 cm., a waga 500 kilogr. Skorupa jego jest tak ciasna, że nie może w niej schować głowy i nóg. Przednie nogi ma dłuższe od tylnych, a stopy tworzą płetwy. Zamieszkuje morza gorącej i umiarkowanej strefy, prócz Śródziemnego. Jaja składa na piaszczystych wybrzeżach, kopiąc dołki w piasku. W tym czasie łowią go w ten sposób, że kilkoro ludzi z drągami zbliża się do niego i przewraca go na grzbiet; żółw ten bowiem, mając płaską skorupę grzbietową, nie może

wrócić do położenia normalnego. Z mięsa żółwia gotują wyborną zupę.

Żółw szyldkretowy (*Chelone imbricata*) (fig. 225), długości ma 80 do 90 cm. Mieszka w morzach podzwrotnikowych. Barwy jest kasztanowato-brunatnej z żółtymi plamami. Nieszcześliwie to zwierzę boleśnie pokutuje za to, że skorupa jego




Fig. 225. Żółw szyldkretowy.

utworzona jest z cennego szyldkretu, budzącego chęć ludzką. Chcąc jaknajdoskonalej wyzyskać ten materiał, żywe żółwie prażą na ogniu lub wrzucają je do wrzątku. Mięso jego jest jadalne.



Rząd II. Krokodyle.

164. Są to wielkie zwierzęta kształtu jaszczurki; skórę mają pokrytą mocnymi kostnymi tarczami, paszczę najeżoną licznymi, bardzo ostrymi zębami, nogi opatrzone w pazury. Krokodyle znoszą jaja o twardej skorupie, które wylęgają się pod wpływem ciepła słonecznego. Zamieszkują słodkie wody strefy gorącej.

Krokodyl Nilowy (*Crocodylus niloticus*) (fig. 226), zamieszkuje wnętrze Afryki. Dosięga 7 metrów długości; napada na większe zwie-

rzęta i na człowieka. Na żer wychodzi tylko w nocy; dnie spędza w spokoju. Dawniej krokodyle żyły li-



Fig. 226. Krokodyl Nilowy.

cznie w Nilu, teraz są już prawie wyteńpione. Egipcjanie czcili krokodyla i balsamowali jego ciało po śmierci.

Kajman czyli **Aligator** (*Alligator lucius*) (Tab. VI, fig. 11) znajduje się w krajach gorących Ameryki, zwykle przesiaduje na wybrzeżach mulastych lub na pniach drzew zanurzonych w wodzie. Żywi się rybami, które zabija i podrzuca uderzeniem ogona, a następnie chwytą w łocie, pożera także ptaki i inne zwierzęta, podpluwając do nich cicho. Znosi do 100 jaj, wielkości jaj indyjskich. Na zimę zakopuje się w mule i spędza ją w odrętwieniu.



Fig. 227. Gawjai.

Gawjal (fig. 227) żyje w Azji połudn., zwłaszcza w Indiach Gangesowych, dosięga 5—6 m. długości. Pysk ma cienki i wydłużony.

Rząd III. Jaszczurki.

165. Jaszczurki zwykle mają ciało wydłużone, pokryte łuskami; mają po cztery nogi, niektóre po dwie lub wcale ich nie mają. Jaszczurki dzielą się na rodziny, stosownie do kształtu języka.

Do pierwszej rodziny należą jaszczurki *mające język długi, cienki, na końcu rozdwojony*. Przedstawicielem jej jest **Jaszczurka zwyczajna** (*Lacerta agilis*) (Tab. VI, fig. 4), znajdująca się prawie w całej Europie środkowej. Jest zwinna i zgrabna; gnieździ się w norach lub szparach starych murów. Ma ciało wysmukłe o bardzo długim ogonie; jest barwy brunatnej w pręgi i plamy, boki zielonawe; paszcza jej szeroka, opatrzona drobnymi, ostremi ząbkami. Składa 5—8 jaj na ciepłym, słonecznym miejscu i nie troszczy się ani o jaja, ani o potomstwo. W słoneczny dzień letni można widzieć te jaszczurki, wygrzewające się na słońcu, czatujące na owady, pająki i robaki. Są to niewinne istoty, a nawet pożyteczne, gdyż niszczą owady. Trzymają je często w terrarium, karmiąc muchami i t. p.

Jaszczurka zielona (*Lacerta viridis*) znajduje się na łąkach zarosłych, na brzegach pól, częściej w Europie południowej, niż u nas. Barwę ma pięknie zieloną z drobnymi czarnymi plamkami, na brzuchu żółtawą.




Fig. 228. Jaszczurka murowa.

Jaszczurka murowa (*Lacerta muralis*) (fig. 228), bywa rozmaitej barwy: szara, niebieska lub plamista. Znajduje się w okolicach skalistych nad morzem Śródziemnym. Żywi się, jak i poprzednie, owadami i pająkami.

Jaszczurka żyworodna (*Lacerta vivipara*), mała na krótkich nogach, o ogonie bardzo cienkim na końcu; bywa różnie zabarwiona; nazwa jej pochodzi stąd, że małe wykluwają się z jaj w chwili gdy je jaszczurka znosi.

166. Do rodziny *o języku długim, robakowatym, wysuwalnym i na końcu zgrubiałym*, należy:

Kameleon (*Chamoeleo vulgaris* (Tab. VI, fig. 1), zamieszkujący Afrykę północną. Jest to zwierzę bardzo osobliwej budowy: tułów jego z boków ściśnięty, grzbiet tworzy ostrą krawędź; nogi mają po sześć palców, z których trzy skierowane naprzód, a trzy w tył i zrosnięte są z sobą po trzy. Ogon długi, chwytny, dający się ślimakowato związać, ułatwia zwierzęciu trzymanie się na gałęziach. Oczy ma bardzo wielkie, a każde z nich może się poruszać w inną stronę, niezależnie od drugiego. Język długi na 15—20 cm. i kleisty, jest wybornie przystosowany do chwytania owadów. Największą zaś osobliwością kameleona jest zdolność jego zmieniania barwy skóry: zwykle jest zielona, jak kolor liści drzew, wśród których się przyczaja; w blasku słonecznym lub gdy zwierzę jest rozdrażnione, staje się czarną; w innych wypadkach zmienia się na białą, żółtą, czerwoną lub niebieską, stosownie do pory dnia i usposobienia zwierzęcia.

Pewien naturalista tak opisuje tryb życia kameleonów w niewoli:

„Jest to uosobiony spokój i niczem niezamącona cierpliwość; całe życie zdaje się skupiać w szybkości ruchów języka, w obracaniu oczu na wszystkie strony i w nagłych zmianach barwy skóry. Otrzymałem dwa kameleony z Trjestu i umieściłem je między oknami, gdzie miały dostatek światła słonecznego. Wskutek przywiązania do siebie, czy może tylko wskutek przyzwyczajenia, układały się zawsze jeden obok drugiego. Jeśli jednemu z nich zachciało się zmienić miejsce, drugi niezwłocznie udawał się za nim; rzadko czyniły one podobne wysiłki; najczęściej siedziały spokojnie całymi godzinami, nie zmieniając wcale postawy. Widząc je w tak nieruchomej postawie, obracające tylko oczy na wszystkie strony i wysuwające języki dla schwywania muchy, można było wziąć je za sztucznie wyrobione postacie z ruchomymi oczami i językami. Zabawne było, gdy zobaczyły jednocześnie dwie muchy, jedną w górze, drugą na dole, i śledziły ruchy każdej innem okiem, nie ruszając się z miejsca.”

W Europie kameleony spotykają się w Andaluzji.

167. Następną rodzinę stanowią jaszczurki o grubym i krótkim niewysuwalnym języku.

Tu należą: **Smok latający** (*Draco volans*) (Tab. VI, fig. 3), znajdujący się na wyspie Jawie. Jaszczurka ta, o dziwnej postaci, mająca zaledwie 20 cm. długości, jest bardzo ładnie

ubarwiona na kolor brunatny, z zielonym metalicznym połyskiem w czerwone pręgi. Dziwaczny kształt nadają jej dwie szerokie narośle, rozpostarte z każdej strony na przedłużonych żebrach i służące zwierzęciu za spadochron przy przeskakiwaniu. Koło paszczy ma także zwieszający się wyrostek skórny. Smok latający siedzi przeważnie na drzewie, na ziemię schodzi rzadko. Jest zupełnie nieszkodliwy.

Legwan (*Iguana tuberculata*) (Tab. VI, fig. 2), znajduje się w Indjach wschodnich i w Ameryce południowej, na brzegach rzek; łązi zręcznie po drzewach i pływa doskonale. Zabarwienie jego, podobne do liści drzew, sprawia, że z trudnością tylko dostrzedz go można; chwytą bardzo zręcznie rozmaite owady, którymi się żywi. Indianie polują na tę jaszczurkę dla mięsa jadalnego, poszukują również jaj, które ona składa w jamce w ziemi, zwykle w liczbie 15 do 20.

Gekko fałdzisty (*Platydictylus guttatus*) (Tab. VI, fig. 6), żyje w Chinach i Indjach wschodnich. Ma fałdy skóry, które tworzą rodzaj frendzli po bokach ciała; palce z błonkami, pozwalającymi mu utrzymać się na najgładszej powierzchni i pełzać po niej; wydaje głos podobny do zgłoski „gekk.” Są to jaszczurki nocne, które o zmierzchu zwykle wypęłzają ze swoich gniazd i czatują na zdobycz. Gdy dostrzegą jaki owad, rzucają się nań z odległości kilkunastu centymetrów.

168. Do jaszczurek *krótkojęzycznych*, mających język mały, wysuwalny, na końcu cienki i wycięty, a przy nasadzie gruby, ciało długie z drobnymi kończynami, lub bez nich, należy:

Padalec (*Anguis fragilis*) (Tab. VI, fig. 14), jest to zupełnie nieszkodliwe i niewinne zwierzę, pospolicie uważane za węża z powodu kształtu ciała i zupełnego braku nóg; barwę ma z wierzchu popielatą, po bokach czerwono-brunatną. Rozpowszechniony jest w całej Europie, Azji zachodniej i Afryce północnej. Chętnie wygrzewa się na słońcu; na żer zwykle wychodzi w nocy; żywi się owadami i robakami. Rozmnaża się szybko, jaja jego pękają w chwili znoszenia, jak u jaszczurki żyworodnej. Daje się łatwo hodować w terarjum. Pomimo braku nóg, budowa szkieletu oraz obecność powiek, których nie mają węże, dowodzi niewątpliwie należności padalca do jaszczurek.

Rząd IV. Węże.

169. Ciało mają długie, walcowate, beznogie, pokryte łuskami. Paszcza ich, wskutek ruchliwych kości twarzowych, może się niezwykle rozszerzać, tak, że połykają zwierzęta grubsze od siebie; język wysuwalny, rozdwojony; podniebienie opatrzone w drobne, ostre zęby. Oczy ich pozbawione są powiek, lecz osłonięte przezroczystą błoną. Węże lenieją co rok, t. j. zmieniają wierzchnią, zrogowaciałą warstwę skóry czyli naskórek, zrzucając go od przodu ku tyłowi i porastając nowym. Zimę spędzają zwykle w ukryciu, pogrążone we śnie, a w krajach gorących spędzają w ten sposób lato. Dzielimy węże na **jadowite** i **niejadowite**. *Węże jadowite* mają oprócz zwykłych zębów, jeszcze dwa przednie zęby, większe, nieco zakrzywione ku tyłowi, zaopatrzone w cienkie kanały; te są połączone z gruczołem jadowym, który naciśnięty podczas kłasnania, wypuszcza przez owe kanały jad do rany.

170. Do węzów *niejadowitych* należą:

Wąż wodny zw. Zaskrońcem (*Tropidonotus natrix*) (Tab. VI, fig. 12), najpospolitszy u nas, ma około 1 m. długości; barwy jest na grzbiecie brunatnej, spodem biały w czarne plamy. Oznakami, po których węża tego można poznać i z łatwością odróżnić od jadowitej gadziny (jak nazywają żmiję), są: kształt głowy, układ łusek, głównie zaś dwie plamy półksiężycowe na tyle głowy: u samca żółte, u samicy białe (fig. 229 i 230). Wąż wodny znajduje się w całej Europie, z wyjątkiem północy; zamieszkuje brzegi jezior lub wód powoli płynących; leży zwykle zwinięty i wygrzewa się na słońcu; spłoszony ucieka sycząc. Jaja składa pod liśćmi lub w norach kretów; żywi się rybami i żabami.



Fig. 229.
Głowa
gadziny.



Fig. 230.
Głowa
węża.

Miedzianka (fig. 231), podobna nieco do żmii z kształtu głowy i ubarwienia; znajduje się w okolicach górzystych.

Wąż koralowy (fig. 232), o świetnej koralowej barwie czarne pręgi; żyje w Gujanie

W Europie, jednym z największych jest **Wąż Eskulapa**, u nas rzadko spotykany.

171. Niejadowitemi też są niektóre węże olbrzymie, np.: **Wąż dusiciel** czyli **Boa** (*Boa constrictor*) (Tab. VI, fig. 13), zamieszkujący lasy południowe Ameryki. Długość jego



Fig. 231. Miedzianka.



Fig. 232. Wąż koralowy.

wynosi 3—5 metrów. Barwy jest czerwono - szarej w żółte plamy. Gnieździ się zwykle w suchych lasach i zaroślach, unika wody. Głównem jego pożywieniem są mniejsze zwierzęta wielkości królika, napada jednak także i na większe zwierzęta, które z wielką zręcznością i szybkością dusi, owijając się dokoła nich, i urobiwszy z nich rodzaj wałka, w całości połyka. Dla człowieka nie jest niebezpiecznym.



Fig. 233. Piton.

W Ameryce południowej znajduje się jeszcze największy z olbrzymich węzów — **Anakonda**, dochodzący do 10 m. długości, barwy ciemno-oliwkowej w czarne plamy, żyje przeważnie nad wodą, na gałęziach i z nich rzuca

się na nadchodzące do wody zwierzęta.

Podobne życie pędzi **Piton** (*Python reticulatus* i *Python molorus*) (fig. 233), znajdujący się w Indjach wschodnich.

Oba gatunki osiągają 8 metrów długości. Żywią się, jak i poprzednie, żywymi zwierzętami, na które czatują za-

wieszzone na drzewie, głową na dół. Wąż, ujrawszy swoją ofiarę, np. tygrysa, rzuca się na niego, chwytając za głowę, owija się dokoła ciała, i gdy, pomimo rozpaczliwej ale bezowocnej obrony ofiary, zdoła ją udusić, spuszcza się na ziemię, przyciąga zwierzę do drzewa i gruchocze mu swemi zwojami kości, poczem ułożywszy się spokojnie, powoli połyka je całkowicie, tak, że pod skórą jego można dostrzedz przesuwające się zwierzę. Po tej biesiadzie układa się do trawienia i w takiej pozycji pozostaje długi czas bezwładny; wtedy można podejść do niego bezpiecznie. Z tego korzystają myśliwi i zabijają tego węża, ściągają z niego skórę, a przeciąwszy mu brzuch, wydobywają w całości połknięte zwierzę.

172. *Z węzów jadowitych żyje u nas:*

Żmija zwana **gadziną** (*Pelias berus*) (Tab. VI, fig. 15), którą po kształcie głowy i barwie ciała można odróżnić z łatwością od węża. Bywa różnie ubarwiona; szara, zielonawa, brunatna; wzdłuż grzbietu ciągnie się zygzakowata ciemna pręga; po bokach głowy ma dwie ciemne linje w kształcie litery V. Długość żmii wynosi około 60 cm. Trzyma się ona zwykle zarośli, torfowisk lub lasów, i częściej spotyka się w górach, niż na równinach. Zamieszkuje całą Europę. Zimą spędza w wypróchniałych drzewach lub w dziurach mysich. W nocy wypełza żmija na łowy; ale nie ściga zdobyczy, tylko czatuje na nią, a ukąsiwszy, czeka na działanie jadu. Myszy, stanowiące główne pożywienie żmii, zdychają prawie natychmiast po ukąszeniu; ptaki—w kilka minut, koźłę lub jagnię—w kilka godzin. Dla człowieka ukąszenie żmii może być śmiertelnem, jeśli się nie przedsięwzięmie natychmiast środków zaradczych; polegają one na szybkim przewiązaniu miejsca powyżej ukąszenia, na rozcięciu rany i podtrzymaniu krwawienia, wyciskaniu krwi i t. p. Wysysanie nie jest bezpieczne dla ratującego, gdyż wyssany jad może się przedostać przez zepsute zęby wewnątrz organizmu i działa bardzo szkodliwie na głowę. Wewnątrz daje się ukąszonemu wódkę lub wino z wodą, dla pobudzenia układu nerwowego, sparaliżowanego przez jad żmii.

W Indjach, przeciwko ukąszeniu węzów jadowitych, używają wypalanej masy kostnej, która, przyłożona do rany, chciwie pochłania krew zatrutą w pory swoje. Roślina, znana pod

nazwą *Vejuco de Huaco*, jest bardzo skuteczna na ukąszenie węzów; własność tę odkrył pewien murzyn. Zauważył on, że krogulec Huako, żywiący się węzami jadowitymi w strefach podzwrotnikowych, zjada kilka liści tej rośliny, skoro zostanie przez węża ukąszony. Ciekawą jest walka żmii z jeżem: zanim ona zdoła go ukąsić, jeż chwytą ją za kark i ubezwładnia.

Najbardziej jadowitą jest **Żmija piaskowa** (*Vipera amodytes*), żyjąca w południowej Europie, wśród wzgórz i zarośli.

173. Z węzów zwrotnikowych do najmniejbezpieczniejszych należą **Grzechotniki**, zamieszkujące Amerykę. Mają one na końcu ogona pierścienie rogowe, wydające odgłos, który stał się przyczyną nazwy tych węzów.

Grzechotnik Durissu (*Crotalus durissus*) (Tab. VI, fig. 16), żyje w Stanach Zjednoczonych południowo-wschodnich; dochodzi długości 1—2 m., jest barwy ciemno-szarej w ciemne pręgi, pod spodem żółtawy w cętki.

Grzechotniki zwykle leżą zwinięte w kłębek pod osłoną krzaka na suchej łące i kasają wszystko, co się do nich zbliży. Wół lub koń, ukąszony, ginie w ciągu 10-u minut. Zbliżając się do tego węża ostrożnie, można go łatwo zabić prętem; ale nadeptany niespodzianie, kasa natychmiast. Pomimo jadowitości grzechotników, murzyni trzymają je czasem w swoich chatach.



Fig. 234. Okularnik indyjski.

Straszniejszym jeszcze jest wąż bez grzechotki, zwany w Brazylii **Surukuku** (*Lachesis muta*), z wierzchu czerwono-żółty, pod spodem żółtawo-biały, na całym ciele ma plamy czarne z białymi oczkami. Długi jest na 2 metry, grubości goleni ludzkiej. Rzuca się na człowieka, a nawet kuguar od niego ucieka.

Niemniej jadowitymi są **Okularniki** (*Naja*) (fig. 234), dochodzące długości 2 metrów, barwy mieniającej się. Niebezpieczne te węże układają hin-

dusi do tańca, działając na nie siłą wzroku i pewnemi ruchami, hypnotyzującemi węże. Czasem wyrwywają im zęby jadowe, które jednak po pewnym czasie napowrót wystają. Rozdrażniony okularnik podnosi szyję i wydyma ją, a wtedy daje się widzieć na niej znak, przypominający kształtem okulary,—stąd nazwa.

Pomimo swej wielkości i jadowitości, węże także mają wielu nieprzyjaciół wśród zwierząt, których się strzedz muszą; do takich należą: *Sekretarz*, *Wężojad* i *Ichneumon*; ten ostatni tak zręcznie chwytą węża za gardło, że i olbrzymi piton oprzeć mu się nie zdoła. Nawet świnia bywa postrachem dla grzechotnika, bo umie go zręcznie napaść i zagryzwszy, zjada go, pozostawiając głowę nietkniętą.

Terarjum.

174. Jaszczurki i węże trzymają często w *terarjum*. Jest to skrzynka oszklona, której dno cynkowe wyłożone



Fig. 235. Terarjum.

bywa zwykle warstwą piasku, po części zaś mchem. Wewnątrz urządza się z kamieni grotę, przed nią umieszcza się

szerokie na 15—20 cm. naczynie z wodą, po obu zaś stronach grotu umocowuje się silnie gałązki drzew i wsadza rośliny, mogące żyć w tych warunkach.

Terarjum umieszcza się na oknie, zwróconem ku południowi, tak, iżby mieszkańcy jego jak najczęściej mogli korzystać z promieni słonecznych.

Na pożywienie dają jaszczurkom i padalcom owady, muchy, robaki i nagie ślimaki; węzom, których wszakże razem z innymi zwierzętami trzymać nie można, daje się salamandry i żaby. Ponieważ zwierzęta te są bardzo niewymagające, opieka więc nad terarjum nie zabiera dużo czasu. Należy tylko dość często zmieniać wodę i usuwać nieczystości, odmieniając także od czasu do czasu mech.

Przed nastąpieniem zimy wyjmuje się z terarjum wszystkie zwierzęta, kładzie się je do skrzynki, wypełnionej do połowy ziemią, pokrywa mchem i wstawia do miejsca, gdzie mróz nie dosięga, lub też zakopuje się w ziemię na głębokość około 50 cm. Z początkiem wiosny i ciepła przenosi się obudzone zwierzęta napowrót do terarjum.

KLASA IV. ZIEMNOWODNE czyli SKRZEKI.

175. Nazwa ta pochodzi stąd, że młode, wylęgające się z jaja zwierzątka, zwane pospolicie „kijankami”, podobne z kształtu do ryb, żyją w wodzie i oddychają skrzelami; stopniowo zaś ulegają przeobrażeniom, wskutek których rozwijają się w nich płuca i wtedy pędzą życie podobne jak inne twory lądowe. Zwierzęta te mają ciało nagie, pokryte skórą zwykle śliską, krew czerwoną, zimną.

Klasa ta dzieli się na dwa rzędy: 1. **Żaby** (*Batrachia*), mające szeroki tułów z czterema nogami bez ogona; 2. **Skrze-ki ogoniaste** (*Urodela*) czyli **jaszczury**, mające ciało wydłużone, kształtem przypominające jaszczurkę, z ogonem, którego długość dosięga długości ciała. Głowę mają szeroką, płaską, z dużymi oczami, paszczę również szeroką z drobnymi ząbkami; nogi tylne dłuższe i bardzo silne, wskutek czego zręcznie skaczą; palce opatrzone błoną.

Rząd I. Żaby.

176. Zwierzęta te składają jaja w postaci kłębków lub sznurków, znanych powszechnie pod nazwą *żabiego skrzeku*. Z jaja wylęga się kijanka (fig. 236, A i B), opatrzona po-




Fig. 236. Rozwój żaby: AB—kijanka; CD—przemiana kijanki; F—żaba z pozostającą jeszcze częścią ogona.

czątkowo w skrzela; ma ona długi ogon, za pomocą którego pływa. Podczas przemiany, trwającej od trzech do pięciu miesięcy kijanka traci najprzód skrzela (C), później rozwijają się nogi (D); *najpierw tylne, następnie przednie*; a w końcu zanika ogon (F). Gdy to nastąpi, przemiana jest ukończona i zwierzę staje się zdolnem pędzić żywot lądowy.

Z pomiędzy **żab** najlepiej każdemu znana jest **Żaba wodna** (*Rana esculenta*) (Tab. VI, fig. 10), niewielka, barwy brunatno - zielonej w czarne plamy i żółte pręgi, zamieszkuje nasze stawy i jeziora, znajduje się w całej Europie, aż do koła biegunowego. Wybiera zwykle wody stojące o brzegach zarosłych. Przesiaduje całemi dniami, grzejąc się na słońcu, ale gdy widzi niebezpieczeństwo, rzuca się do wody i zanurza głęboko. Po upływie pewnego czasu, znowu wytyka głowę na powierzchnię wody. Zimą żaby spędzają zagrzebane w szlamie, w stanie zupełnego letargu, a w kwietniu już budzą się i wtedy w ciepłe noce samce dają znane wszystkim koncerty; silny ten głos wydają przy pomocy znajdujących się pod gardłem dwóch pęcherzy, które nadymają i tym sposobem głos wzmacniają.

Już w czerwcu znaleźć można jaja, których każda samiczka składa do 1,000. Przemiana kijanek kończy się w październiku, ale zupełnego wzrostu osiąga żaba dopiero po pięciu latach. Żywi się owadami, robakami, a nawet drobnemi rybkami, które połyka nie żując.

Żaba lądowa (*Rana temporaria*) (Tab. VI, fig. 8), jest u nas również pospolita; z wierzchu brunatna z ciemnymi pręgami. Mieszka zwykle na lądzie — na polach, w lasach, na łąkach, do wody zaś idzie tylko dla składania jaj. W początku lipca przemiana bywa ukończona i młode żabki wychodzą z wody. Żaba lądowa żywi się owadami i ślimakami, wskutek czego jest bardzo pożyteczną.



Fig. 237. Żabka drzewna.

Żabka drzewna czyli **Rzekotka** (*Hyla arborea*) (fig. 237), najmniejsza i najładniejsza ze wszystkich żab, z wierzchu jest barwy jasnozielonej, pod spodem biała. Końce palców opatrzone są jakby poduszczkami, pozwalającemi jej przyczepiać się do

gładkich powierzchni. Znajduje się w lasach w środkowej i południowej Europie. W piękną pogodę przesiaduje na zewnętrznej powierzchni liścia, grzejąc się na słońcu; podczas deszczu ukrywa się pod liściem; skacząc, chwytając przelatujące owady, a może w skoku przylgnąć do pierwszego lepszego liścia za pomocą owych poduszczyków na palcach. W jesieni zagrzebuje się w mule jakiegoś pobliskiego stawu. Żabką tą posługują się jako barometrem pokojowym, umieszczając ją w słoiku, napełnionym do połowy wodą, w którym znajduje się drabinka. Przed słotą żabka zwykle zanurza się do wody, na pogodę zaś wychodzi na górne szczeble drabinki i rzekocze. Przepowiednia ta nie jest wspaniała.

177. Drugą rodzinę stanowią **Ropuchy**, o ciele bardziej krępym i do zręcznego skakania nieprzystosowanym, stąd ropuchy są ociężałe i prowadzą życie nocne, dzień zaś spędzają zwykle w ukryciu.

Najpospolitszą z krajowych jest **Ropucha szara** (*Bufo cinereus*) (fig. 238), długa na 8 — 20 cm. Ciało ma pokryte licznymi brodawkami, z których sączy się lepka ciecz, służąca zwierzęciu za obronę, dla człowieka jest jednak zupełnie nieszkodliwa; z wierzchu jest żółto-brunatna, pod spodem brudno-biała, cała niekształtna. Jest bardzo żarłoczna, stąd i pożyteczna; daje się łatwo oswoić. Jaja w dwóch długich sznurkach składa do wody.



Fig. 238. Ropucha szara.

Ropucha zielona (*Bufo viridis*), mniejsza od poprzedniej, brudno-biała w ciemno-zielone plamy, jest u nas także spotykana.

Kumka (*Bambinator igneus*) jest najmniejszą z ropuch krajowych (3 do 4 cm.); z wierzchu popielata, pod spodem czerwono-żółta. Zamieszkuje kałuże i wody stojące. Wydaje głos, który jej nadał nazwę kumki.



Fig. 239. Grzbietoród.

Grzbietoród (*Pipa americana*) (fig. 239) jest wielką na 20 cm. ropuchą amerykańską, o ciele prawie

czworokątnym, barwy

brunatno-czarnej. Osobliwość jej stanowi sposób wylęgania jaj. Samiec rozpościera je na grzbiecie samicy; na jej skórze tworzą się wtedy jakby komórki, otaczające jaja, w których rozwijają się kijanki i przechodzą wszystkie przemiany. Przez cały ten czas, to jest około trzech miesięcy, samica nie wychodzi z wody. Gdy młode zupełnie się wykształcą, opuszczają grzbiet matki.

Rząd II. Ogoniaste.

178. Różnią się od żab tem, że przez całe życie zachowują ogon, i że u ich kijanek rozwijają się *wcześniej nogi przednie, potem zaś tylne*. Należą tu **Salamandry** i **Trytony**.

Salamandra plamista czyli **Jaszczur** (*Salamandra maculata*) (Tab. VI, fig. 5), długa na 14—18 cm., barwy lśniąco-czarnej w żółte regularne plamy. Znajduje się w całej Europie, w Afryce północnej i Azji zachodniej. Zamieszkuje gęste, cieniste lasy, kryjąc się w dziuplach drzew, pod kamieniami lub we mchu. Wychodzi z ukrycia szczególnie po deszczu, aby łowić robaki ziemne i owady, które chwytając, pełzając po ziemi. Jaja składa do wody; potomstwo rodzi się żywe, gdyż jaja pękają podczas znoszenia i wylęgłe małe natychmiast udają się do wody, gdzie żyją, żywiąc się owadami, dopóki nie odbędą wszystkich przemian; poczem wychodzą na ląd. Biała, mleczna ciecz, którą wydzielają gruczoły umieszczone na grzbiecie salamandry, ma być zabójczą dla małych zwierząt; dla człowieka nie jest wcale szkodliwą. Na zimę zasypia, ukryta w jamce w ziemi.

W Alpach żyje *salamandra barwy czarnej*, bez plam.

Największą z grupy salamandr jest **Salamandra olbrzymia**, dochodząca do 1 metra długości, żyje w Japonji, w czystej, bieżącej wodzie, gdzie ukrywa się pod głazami.

179. **Trytony** są wysmuklejsze od salamandry; ogon mają one z boków spłaszczony, a samce skórzasty grzebień na grzbiecie. Odcięte członki, jak ogon, nogi, a nawet oczy, wyrastają im ponownie. Dwa gatunki spotykają się w Europie: **Tryton mniejszy** czyli **Kropkowany** (*Triton punctatus*) i **Tryton większy** czyli **Traszką** (*Triton cristatus*) (fig. 240), różniące się pomiędzy sobą wielkością i barwą.

Spotykany w akwarjach **Aksolotl** (*Amblystoma mexicanum*) (fig. 241), jest niedo-kształconym *Trytonem amerykańskim*, zachowującym skrzela tak długo, dopóki zostaje w niewoli; w odpowiednich jednak warunkach traci skrzela i przeobraża się w zwierzę lądowe, jak i poprzednie.



Fig. 240. Tryton większy i mniejszy.

Proteusz (*Proteus anguis*) (Tab. VI, fig. 9), znajduje się w wodach podziemnych Krainy i Dalmacji. Ma on szparki skrzelowe i bardzo małe oczy, przykryte skórą; barwy jest cielistej, skrzela ma czerwone. W akwarjach utrzymuje się długo.

Oprócz tych, wyżej opisanych gatunków zwierząt, należy jeszcze do *ziemnowodnych* wiele innych, przeważnie robakowatego kształtu, zamieszkujących kraje gorące.



Fig. 241. Aksolotl.

KLASA V. RYBY.

180. Ryby stanowią najniższą klasę zwierząt kręgowych, gdyż nie wszystkie nawet mają szkielet złożony z kości, lecz chrząstkowy. Oddychają nie za pomocą płuc, lecz *skrzelami* (fig. 242), umieszczonemi po obu stronach głowy; tlen




Fig. 242. Skrzela ryby po usunięciu pokrywających je części skóry.

potrzebny im do oddychania pobierają z wodą, w której jest on rozpuszczony, a przepuszczając wodę na zewnątrz przez skrzela, tlen zatrzymują. Na powietrzu skrzela prędko zasychają i dlatego ryby, skoro są wyjęte z wody nie mogą żyć długo. Krew mają zimną, czerwoną. Kształt ciała podługowaty, najczęściej z boków spłaszczony, głowa zrosnięta z tułowiem. Ciało pokryte jest łuskami lub blaszkami kostnemi.

Zamiast nóg mają ryby płetwy i oprócz płetw bocznych, jeszcze grzbietowe i ogonowe, nieparzyste. U wielu znajduje się pod stosem kręgowym *pęcherz pławny*, napełniony powietrzem, który przy pomocy osobnych mięśni ściskany lub rozszerzany, ułatwia rybie pogrążenie się na dno lub wypłynięcie na powierzchnię wody. Wogóle cała budowa ryb jest doskonale przystosowana do życia w wodzie. Żywią się zwykle innemi rybami i różnemi zwierzętami wodnemi; niektóre pokarmem roślinnym.

Ryby rozmnażają się z jaj (*ikry*), które złożywszy, pozostawiają bez dalszej opieki. Ponieważ jaja dla rozwoju swego potrzebują dużo powietrza, nie mogą więc być składane w głębi nieruchomej wody, gdyż tu prędko zużyłyby wszystko powietrze z otaczającej je warstwy wodnej, i mogłyby wkrótce zginąć. Dlatego też ryby muszą składać ikre



w takich miejscach, gdzie odbywa się żywy ruch wody. Takie odpowiednie miejsca znajdują one na brzegach mórz i rzek, o które rozbijają się fale, albo na dnie wód bieżących, przy ich brzegach, pokrytych roślinnością, gdzie powietrze atmosferyczne łatwo może przenikać do wody, i gdzie rośliny pochłaniają kwas węglowy a wydzielają tlen, potrzebny do oddychania. Aby wyszukać takie miejscowości, ryby są zmuszone opuszczać zwykłe swe miejsca pobytu i odbywać odległe wędrówki, nierównie większe niż wędrówki innych zwierząt. Tak np. łosoś węduje często kilka tysięcy kilometrów z morza do górskich strumieni dla złożenia w nich ikry; a śledzie, żyjące zwykle rozproszone, zbierają się w miliardowe gromady, opuszczają otwarte morza i skupiają się w zatokach północnych brzegów.

181. Stosownie do budowy szkieletu, dzielimy ryby na dwie gromady: **kostne** o szkielecie kostnym z ośmi, pokryte łuskami—i **chrząstkowate**, mające szkielet z materji chrząstkowatej. Do pierwszej należą dwa rzędy: 1. **cierniopłetwe**, które mają cierniste płetwy grzbietowe i 2. **miękkopłetwe**, o miękkich płetwach grzbietowych. — *Chrząstkowate* obejmują trzy rzędy: 1. **kostołuskie**, których ciało częściowo lub całkowicie pokryte jest łuskami kostnymi; 2. **poprzecznowuste**, mające poprzeczny otwór ustny pod spodem pyska; 3. **kręgoustę** z okrągłym otworem ust, pozbawionym szczęk, i z wargami, przystosowanemi do przysysania się.

RYBY KOSTNE.

Rząd I. Cierniopłetwe (Acanthopteri).

182. **Okuń** (*Perca fluviatilis*) (fig. 243) dosięga 25 — 30 cm. długości; barwy zielonawej w czarne poprzeczne pręgi;



Fig. 243. Okuń.



Fig. 244. Sandacz.

zamieszkuje rzeki i jeziora całej Europy; należy do naj-

smaczniejszych ryb krajowych. Jest bardzo żarłoczny, oprócz rybek zjada żaby, ślimaki, robaki i owady.

Sandacz (*Lucioperca sundra*) (fig. 244), bardzo rozpowszechniony w naszych wodach od Wisły do Dunaju; kształt ciała wysmukły, barwy szarawej, z srebrzysto-białym, ładnym połyskiem. Jest również żarłoczny; mięso jego bardzo smaczne.

Należą tu jeszcze:

Prażma zębacz (*Tab. VII, fig. 1*), znajdująca się w morzu Śródziemnem. Żywi się po części pokarmem mięsnym, po części roślinnym; mięso jest jadalne.

Cyrulik (*Acanthurus chirurgus*) (*Tab. VII, fig. 2*) osiąga długości 25—40 cm. Trzyma się wybrzeży oceanu Atlantyckiego, żyje zwłaszcza w strefie gorącej. Żywi się polipami i roślinami.

Półksiężyc (*Platax teira*) (*Tab. VII, fig. 3*), znajduje się w oceanie Indyjskim. Odznacza się niezwykle długimi i zaigietymi w tył płetwami grzbietowymi.

Parskacz (*Chelmo rostratus*) (*Tab. VII, fig. 4*). Łatwo go poznać po pięciu brunatnych pręgach i białych brzegach. Długi jest na 20—25 cm. Przebywa w oceanie Indyjskim oraz u wybrzeży Australji.



Fig. 245. Ciernik.

Papugoryb (*Scarus scretensis*) (*Tab. VII, fig. 5*), znajduje się w morzu Śródziemnem. Zabarwienie ma purpurowe. Żywi się przeważnie mięczakami i rakami.

183. Osobną rodzinę tworzą **Cierniki**, należące do najmniejszych rybek naszych wód; mają one nie więcej nad 7 cm. długości. Zamiast przednich płetw grzbietowych mają ciernie, stąd ich nazwa. Jest kilka gatunków *cierników*, żyjących w morzach i wodach słodkich; z nich najpospolitszym jest **Ciernik pospolity** (*Gasterosteus aculeatus*) (fig. 245), zamieszkujący wody większej części Europy, Ameryki półn. i Algierji.




Fig. 246. Gniazdo ciernika.

Cierniki budują swe gniazda w głębi wody z ziół wodnych (fig. 246), do budowy tej samiec starannie zbiera po-

przednio materiały, odrzucając przytem wszystko, co jest zbyt lekkie i wypływa na powierzchnię wody. Całe gniazdo, wielkości pięści, przymocowuje do dna za pomocą żwiru i zwykle zasypuje je piaskiem. Gdy gniazdo gotowe, ciernik zwabia do niego samice, aby kładła ikrę, a gdy tej zbierze się dostateczna ilość, staje na straży gniazda, nie dopuszczając do niego innych cierników, któreby mogły pożreć złożoną ikrę. Pilnuje przytem całości tego gniazda i ciągle w niem coś poprawia. O potomstwo okazuje troskliwość zupełnie nieznaną u innych ryb. Gdy małe rybki się wylęgną, czuwa nad nimi przez parę tygodni, a jeśli która zbyt daleko się oddala od gniazda, chwytą ją pyszczkiem i przynosi napowrót. Skoro jednak młode zaczną samodzielnie wyszukiwać pokarm, ustaje wszelka troskliwość, a nawet zdarza się, że ciernik pożera własne dzieci.

W akwarjach ciernik chętnie się gnieździ i tu można widzieć, jak, trzymając się przed otworem gniazda, szybko porusza płetwami piersiowymi, ażeby wywołać ruch w wodzie i doprowadzić świeże powietrze do jaj.

184. Do rodziny **Makreli** należą:

Makrela właściwa (*Scomber scomber*) (fig. 247), mieszka w morzach okalających Francję, Anglię i Hiszpanję; dosięga wielkości 60 cm.; jest barwy zielonawej w pręgi niebieskie.



Fig. 247. Makrela.

Tuńczyk (*Thynnus vulgaris*) (fig. 248) jest olbrzymią makrelą, żyjącą głównie w morzu Śródziemnem; ma 2—3 metrów długości; mięso tuńczyka jest jadalne i od najdawniejszych czasów poszukiwane jest przez rybaków z wybrzeży i wysp morza Śródziemnego. Do łowienia tuńczyków urządzają bardzo wielkie sieci, zwane „tonnarami,” które umocowują kotwicami w morzu. Każda sieć złożona jest z kilku komór, połączonych ze sobą tak, że ryby przepływają z jednej do drugiej, nie mogąc się na zewnątrz wydostać; ostatnia komora ma dno ruchome; gdy do niej ryby wejdą, rybacy sieć podnoszą w górę, otwierają dno i wydostają połów.




Fig. 248. Tuńczyk.

Pokrewnym makreli gatunkiem jest **Miecznik**, zwany **Włó-**

cznikiem (*Xiphias gladius*) (fig. 249), odznaczający się tem, że górna szczęka wydłużona jest nakształt miecza z ostrymi krawędziami, co mu służy do obrony. Zamieszkuje morze Śródziemne, ocean Atlantycki i morze Bałtyckie. Dochodzi do 2 metrów długości.



Fig. 249. Miecznik.

Rząd II. Miękopłetwe (Malacoptera).

185. Karp (*Cyprinus carpio* (Tab. VII, fig. 6), znajduje się w jeziorach lub wolno płynących rzekach o dnie szlamistym, porośniętym, w które zagrzebuje się na zimę. Żywi się prawie wyłącznie pokarmem roślinnym. Pochodzi z Chin i od niepamiętnych czasów hodowany jest przez człowieka. Dosięga niekiedy 1 metra długości; ciało ma z boków ścięśnione, pokryte dużemi, okrągłemi łuskami, barwy brunatno-żółtawej, spodem czerwonawej, przy pyszczku kępki szczecinek.

Karaś (*Carassius vulgaris*) (fig. 250), mniejszy od karpia, bez szczecinek przy pyszczku — i Leszcz (*Abramis brama*) pokrewne są z karpem.



Fig. 250. Karaś.

Żółta rybka (*Carassius auratus*) (Tab. VII, fig. 10), odmiana karasia, pochodząca z Chin, znana jest powszechnie i hodowana w sadzawkach i akwarjach.

Lin (*Tinca vulgaris*) (fig. 251), niewielka ryba, odznaczająca się drobnemi łuskami, pokrytami grubą warstwą śluzu, zabarwiona na ciemno-oliwkowo z żółtym odblaskiem; w kątach ust ma po jednym wąsie. Żyje w wodach stojących; mięso jego jest jadalne i smaczne.




Fig. 251. Lin.

Do rodziny karpio-
wych należy jeszcze kilka ja-

dalnych gatunków, zamieszkujących nasze wody słodkie, jak naprz. Piskorz i Sliz (fig. 252), podobne z kształtu do węgorza.

186. Osobną rodzinę stanowią Śledzie (*Clupea harengus*) (Tab. VII, fig. 7), o ciele z boków ścięśnionem, barwy morza ze srebrzystym połyskiem, — każdemu znane ryby i mające

wielkie znaczenie dla rybaków. Większą część roku śledzie spędzają w głębi morza (Północnego, Bałtyckiego i Atlantyku), a w czasie składania ikry ukażą się milionowymi tłumami około wybrzeży, gdzie wyławiają je rybacy licznie zgromadzeni i oczekujący niecierpliwie na ten połów. Śledzi jest wtedy tak wiele, że zbita ich masa podnosi łodzie. Ryby i ptaki drapieżne idą za tą ławicą; towarzyszą im też wieloryby i czynią wielkie między śledziami spustoszenia. Ułatwia to jednak pracę rybakom, bo śledzie, uciekając, dostają się do nastawionych na nie sieci. Największy połów odbywa się w lutym. Z łodzi odwożą je taczkami do składów, gdzie je oczyszczają, układają w beczki i zalewają wodą soloną.



Fig. 252. Śliz.

Mniejszy gatunek śledzia—**Pilchard** (*Clupea pilchardus*), stanowią znane wszystkim **Sardynki**; **Szprot** (*Clupea sprotus*) i **Kilki** (*Clupea kilo*) są również gatunkami śledzia.

187. **Szczupak** (*Esox lucius*) (Tab. VII, fig. 8), ciało ma walcowate, głowę spłaszczoną, zakończoną szeroko rozciętym pyskiem, podobnym do dzioba kaczki, z wystającą dolną szczęką o wielkich ostrych zębach. Jest to ryba żarłoczna, pożera nie tylko inne ryby, ale i ptactwo wodne; rzuca się nawet na zwierzątka lądowe, jeśli znajdują się na brzegu. Jest więc bardzo niepożądanym gościem w zarybionych stawach. Zamieszkuje wszystkie wśródładowe wody w północnej i środkowej Europie, zachodzi także do morza.

188. **Ryby latające** (*Exocoetus*) (fig. 253), mają bardzo rozwinięte płetwy piersiowe, które im służą jako narządy lotu; przy ich pomocy wzbijają się na wysokość kilku metrów nad powierzchnię morza i przelatują przestrzeń 50 — 100



Fig. 253. Ryby latające.

metrów. Pozostają tak długo w powietrzu, jak im na to skrzela pozwalają. Czynią to, zdaje się, dla uniknięcia prze-

śladowania innych żarłocznych ryb, ale wtedy stają się ofiarami swych uskrzydłonych wrogów. Mogą lecieć łatwiej pod wiatr, niż z wiatrem, a w dni spokojne wcale ich w powietrzu nie widać. Niekiedy spadają na pokład okrętu i stanowią smaczny pokarm dla marynarzy. Są to bardzo ładne i oryginalne stworzenia, dochodzą do 50 cm. długości, oczy mają piękne, duże. Ojczyzną ich są morza strefy gorącej i podzwrotnikowej; spotykane także bywają w morzu Śródziemnem i koło brzegów Anglii.

189. **Sum rzeczny** (*Silurus glanis*) (Tab. VII, fig. 9), dosięga długości 2 — 4 metrów, przy wadze 50 — 60 kilogr. Ciało ma walcowato-okrągłe, paszczę szeroką, z górnej wargi zwieszają się dwa długie wąsy; skóra jego naga, ślizka, barwy oliwkowej, spodem biaława. Jest to ryba drapieżna, na połów wychodzi w nocy. Zamieszkuje mulaste dna większych rzek Europy.

190. Z rodziny *miętusowatych* ważnym jest **Dorsz** (*Gadus morrhua*) (Tab. VII, fig. 11), dosięga $1\frac{1}{4}$ metra długości, barwy oliwkowej w cętki, na grzbiecie ma trzy płetwy; znajduje się w oceanie Atlantyckim i stanowi ważny przedmiot połowu u brzegów Islandji, Newfoundlandu i innych. W stanie solonym dorsz nazywa się *kabljon*, suszony stanowi *stokfisz*. Z wątroby dorsza otrzymuje się *tran rybi*, używany w lecznictwie.

„Dorsz na zimę kryje się w głębinach, w marcu i w kwietniu ukazuje się znowu w wielkiej obfitości. Wkrótce też stawiają się na placu i jego prześladowcy, nie tylko z zatok Newfoundlandu, lecz także z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych i z Francji. Wtedy mgłą pokryte morze napełnia się ich statkami z załogą, złożoną z młodych, silnych ludzi, zdolnych do tego uciążliwego połowu. Aby jeden drugiemu nie przeszkadzał, każdy rybak ma na statku wyznaczone miejsce dla siebie, oraz na linki do połowu i na złowione ryby. Linki od węd są tak długie, że haki sięgają dna morza, dorsz bowiem nie płynie, jak śledź, blisko powierzchni wody, ale trzyma się głębi. Jako przynęta służą kawałki mątwy (*Sepia*), małe kraby, albo małe rybki z rodzaju łososia, poławiane wyłącznie na ten cel na brzegach amerykańskich w niesłychanej obfitości. Połów bywa zwykle szczęśliwy, gdyż dorsz ma wtedy wyborny apetyt i chwytą chciwie przynętę. Złowione ryby natychmiast płatają, oddzielają starannie wątrobę, a mięso solą.”

191. **Łosoś** (*Salmo salar*) (Tab. VII, fig. 13), dosięga $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ metra długości. Zimą i część wiosny łososię spędzają w morzu; dopiero ku czasowi składania ikry tłumnie wędrują wzdłuż rzek, przeskakując zresztą różne przeszkody i małe wodospady, na drodze napotkane; dochodzą nawet do strumieni i tu składają ikrę w dołku, który sobie robią pyszczkiem w piasku. Wylęgłe rybki pozostają tam dość długo, żywiąc się gąsienicami, owadami i t. p. Po pewnym czasie, gdy są już dość duże, wędrują do morza. Podczas tych wędrówek odbywa się obfity połów, mięso bowiem łososa bardzo jest smaczne i wysoko cenione.

Również smaczne mięsem odznaczają się: **Pstrąg** (*Salmo ferio*) (fig. 254), żyjący w czystych bystrych wodach o dnie piaszczystem; znajduje się np. w wielkiej ilości w Wiśle nieopodal jej źródeł. Barwa jego jest zmienna, zależna od warunków, w których żyje. **Troć** (*S. trutta*), żyjący przeważnie w morzu, podobnie jak łosoś. Obydwie ryby należą do rodziny *łososiovatych*.



Fig. 254. Pstrąg.

192. **Węgorz** (*Anguilla*) (Tab. VII, fig. 14), ma ciało wydłużone, wężowate, pokryte śliską skórą i tak delikatnymi łuskami, że wydaje się nagą. Barwy jest z górnej strony ciemno-zielonawej, na spodniej—białawej; płetwa grzbietowa ciągnie się wzdłuż grzbietu i łączy się z podogonową; przy głowie ma dwie krótkie płetwy piersiowe. Długi jest na $1\frac{1}{2}$ metra. Jest bardzo zwinny i łatwo prześlizguje się przez wąskie szczeliny. Żyje w Europie; w jeziorach i rzekach spotykają się tylko samiczki; samce żyją w morzu. W jesieni udają się i samice do morza dla składania ikry, a gdy wylęgną się młode, samice wracają do rzek, samce zaś pozostają w morzu. W dzień węgorz kryje się w mule, w nocy zaś wypływa na żer, łowiąc małe rybki, owady, robaki i mięczaki.



Fig. 255. Strętwa.

W morzu żyje **Węgorz morski** czyli **Murena**, a w rzekach Ameryki południowej znajduje się **Strętwa** czyli **Węgorz elektryczny** (*Gymnotus*

electricus) (fig. 255), grubszy i większy od węgorza, dochodzi do 2 metrów długości. Ryba ta posiada narządy elektryczne, ciągnące się z boku wzdłuż ciała, służące jej za

organy obronne i napastnicze; przy zbliżeniu się jej bowiem do ofiary, wyładowuje się z tych narządów tyle elektryczności, iż może zabić nie tylko inną rybę, ale nawet konia i człowieka. Przytem ryba ta jest tak żarłoczna, że sprawia wielkie szkody w zarybionych stawach i przy pomocy swego zabójczego narządu może w krótkim czasie wyniszczyć wszystkie ryby. Na żer wychodzi w nocy, w dzień kryje się na dnie wody, w mule. Krajowcy ogromnie nie lubią tej ryby, boją się jej i starają się ją wytępić. Nie daje się ona jednak złowić w sieci, dlatego też Indianie muszą na nią urządzić formalne polowanie.

Humboldt obszernie opisuje takie łowy, których sam był świadkiem: „Przewodnicy nasi przypędzili ze stepu około 30 dzikich, nieujężdżonych koni i mułów, i wpędzili je do wody. Wrzaski Indian i tętent koni wystraszyły ryby z mułu. Wtedy to czarne i żółte węgorze, podobne do wielkich roślin wodnych, pływają po powierzchni wody w rozmaitych kierunkach i cisną się pod brzuchy koniom i mułom. Dziwna ta walka zwierząt z rybami przedstawia w wysokim stopniu widok malowniczy. Indianie, uzbrojeni w oszczepy i długie pręty z trzciny, ustawiają się zwartym szeregiem dokoła stawu; niektórzy włożą na drzewa, których gałęzie sterczą poziomo nad wodą. Dzikim wrzaskiem i machaniem prętami napędzają konie napowrót do wody, jeżeli te próbują wydostać się na brzeg. Węgorze, odurzone hałasem, bronią się rozpaczliwie wyładowywaniem swoich narządów elektrycznych. Niektóre konie, rażone niewidzialnymi uderzeniami, padają i toną, inne, z najeżoną grzywą, parskając, wspinają się i usiłują ujsć przed tą niewidzialną burzą; niektórym udaje się ujsć uwagi Indian i wydostają się na brzeg, lecz potykają się za każdym krokiem i wkrótce padają na piasek. Nareszcie węgorze wyczerpują cały zapas siły i obezwładnione podpływają do brzegu, gdzie je Indianie łowią krótkimi oszczepami na sznurach. Po kilku minutach—pisze dalej Humboldt — byliśmy w posiadaniu pięciu dużych strętów, lekko tylko skaleczonych. Nie można się narazić bez wielkiego niebezpieczeństwa na pierwsze uderzenia wielkiej, mocno rozdrażnionej stręty; gdym nieostrożnie postawił obie nogi na wielkiej tej rybie, dopiero co wyciągniętej z wody, uczułem wstrząśnienie w całym ciele i ból nie do opisania, trwający przez cały dzień.”

193. Rodzina **Bokopływów** odznacza się tem, że ryby te



mają ciało z boków spłaszczone i obydwie oczy umieszczone po jednej stronie; u bardzo młodych jednak oczy znajdują się w zwykłych miejscach; pływają, leżąc jedną powierzchnią ciała na wodzie. Na wierzchu są różnie ubarwione, pod spodem białawe. Największą z tych ryb jest **Skarp** (*Rhombus aculeatus*) (fig. 256), dochodzący do 2 m. długości, a szerokości równej połowie długości. Żyje w morzach Europy; trzy-




Fig. 256. Skarp.




Fig. 257. Rybojeż.




Fig. 258. Kostera.

ma się piaszczystego dna, gdzie leży oczami do góry zwrócony. Żywi się innymi rybami. Mięso skarpa jest bardzo smaczne.

Mniejszą jest **Flondra**, łowiona w ogromnej ilości w morzu Bałtyckim. Mięso jej jest również bardzo cenione. Ryby te łowią najczęściej sieciami.

194. Do ryb kostnych należy kilka gatunków o dziwacznej postaci, zamieszkujących morza strefy gorącej, np. **Rybojeż** (fig. 257), ryba okrągłego kształtu, pokryta całą kolcami; **Kostera** (fig. 258) o skostniałym pancerzu, barwy żółtej;



Fig. 259. Iglica.

Iglica (fig. 259), żyjąca w morzach Europy; mała ta rybka kształtem swym wydłużonym przypomina liście roślin morskich, na których siedzi ukryta. W sposobie jej życia dziwnem jest to, że samica składa jajka



Fig. 260. Pławikonik.

do torebki, znajdującej się u ogona samca; tu wylęgają się młode i do pewnego czasu nie opuszczają ojca. Najdziwniejszy kształt ma **Pławikonik** czyli **Konik morski** (fig. 260),

rybka około 4—8 cm. długa, barwy czerwonej; ogon ma chwytny, głowę i szyję podobne do końskiej; żyje w oceanie Atlantycznym.

RYBY CHRZĄSTKOWATE.

Rząd I. Kostołuskie (Ganoidei).

195. **Jesiotr** (*Acipenser*) odznacza się głową wydłużoną w pyszczek i brakiem łusek, ale ma pokrycie skóry złożone z pięciu rzędów tarcz kostnych po obu stronach ciała (stąd nazwa rzędu).

Z rodzaju jesioteń ważne są dwa gatunki:

Jesiotr wschodni (*A. Güldenstädti*) (*Tab. VII, fig. 15*), znajduje się w morzach: Czarnem, Kaspjskiem i Azowskiem, i **Jesiotr zachodni** (*A. sturio*), dosięgający 5 m. długości, żyje w m. Śródziemnem i w zachodnich morzach Europy.

Mięso obu jest bardzo smaczne, a połów odbywa się w czasie, gdy jesioteń wędrują do rzek dla składania ikry. Ikra ta stanowi również bardzo ważny artykuł handlu pod nazwą *kawioru*. Z pęcherza pławnego jesioteń wygotowuje się *klej rybi*.

Do tegoż rodzaju należą jeszcze:

Wyz (*A. huso*), największa ryba wód słodkich, dostarczająca najwięcej kleju, i **Sterlet** (*A. ruthenus*), którego mięso jest bardzo smaczne. Poławia się go w wodach wpływających do morza Czarnego.

Rząd II. Poprzecznuoste (Selachii).

196. Tu należą głównie **Żarłacz** i **Płaszczki**.

Żarłacz czyli **Rekin**, albo **Ludojad** (*Carcharias melanopterus*) (*Tab. VII, fig. 18*), żyje przeważnie w oceanie Atlantycznym. Dosięga 4 metrów długości; paszcza jego, mająca około 1 metra szerokości, zaopatrzona jest w ostre zęby w liczbie około 400, odrastające w miarę zużywania się. Głowa u żarłacza nie jest zakończona pokrywami skrzeliowymi, jak u innych ryb, lecz skrzela ukryte są w pięciu torebkach,

otwierających się na zewnątrz tyłu szparami tuż przed płetwą piersiową. Żarłacz płynie zwykle za okrętami, czatując na zdobycz i chwytają wszystko, co wpadnie do morza. Ryby te łowią na wielkie haki, przyczepione do łańcucha; za przynętę może służyć cokolwiekbądź, bo rekin jest ogromnie żarłoczną rybą. Wyciągniętego na pokład rekina zabijają; lecz i tu należy wystrzegać się niebezpiecznego uderzenia jego ogona.

Jest jeszcze kilka gatunków żarłaczy, a jeden z nich, żyjący w morzu Śródziemnem, składa szczególnego kształtu jaja czworoboczne z ogonkami z boków (fig. 261).

Młot (*Sphyrna zygaena*) (Tab. VII, fig. 17), zbliżony jest do ludojada; różni się głównie kształtem głowy, która jest potwornie rozszerzona, nadając całej rybie postać młota; oczy osadzone są na obu końcach głowy. Młot osiąga 4 metrów długości i jest również niebezpieczny, jak ludojad. Żyje w morzu Śródziemnem i wszystkich morzach strefy ciepłej.

Piła (*Pristis antiquorum*) (Tab. VII, fig. 16) zamieszkuje ocean Atlantycki i morze Śródziemne. Pysk jej wydłużony jest w wyrostek, długi na 2 metry i uzbrojony po bokach w ostre zęby nakształt piły. Cała ryba ma do 3 metrów długości. Szparki skrzelowe znajdują się na brzusznej części, jak u płaszczy, zresztą zaś podobna jest do żarłaczy.

197. **Płaszczki** są to ryby o szerokim spłaszczonym tułowiu; oczy mają na górnej powierzchni ciała, paszczę zaś i szparki skrzelowe na spodniej.

Płaszczka (*Raja batis*) (fig. 262) zamieszkuje morza Europy, prócz m. Bałtyckiego. Osiąga 75 cm. długości. Mięso jej jadalne; pokryta jest drobnymi kolcami. Niektóre inne gatunki dochodzą do 50 klg. wagi.

Do tej samej rodziny należy **Drętwa** (*Torpedo narce*) (fig. 263) jest ona długa na 1½ metra, szeroka na 1 metr. Posiada narząd elektryczny, umieszczony po obu stronach



Fig. 261. Jaja rekina.




Fig. 262. Płaszczka.




Fig. 263. Drętwa.

głowy i składający się z licznych słupków kanciastych, ustawionych pionowo i podzielonych poprzecznymi ściankami na mnóstwo tarczowatych komórek, wypełnionych przejrzystą, galaretowaną cieczą. Tą bronią drętwa, podobnie jak węgorz elektryczny, zabija lub ogłusza swoją zdobycz.

Rząd III. Kręgousto (Cyclostomi).

198. Ryby te odznaczają się szczególnymi ustami, opisanymi przy ogólnym opisie ryb i odmienną budową skrzelii, które mają postać fałdzistych woreczków z otworami na zewnątrz i umieszczone są wzdłuż przełyku. Sposób ich życia jest także odmienny, bo są to przeważnie pasorzyty, czepiające się innych ryb i wysysające im krew; żywią się jednak także innymi rybkami oraz robakami.

Przedstawicielami tych ryb są **Minogi** o robakowatym kształcie ciała:

Minog morski (*Petromyzon marinus*) (Tab. VII, fig. 12), zamieszkuje morza Europy, Afryki zachodniej i Ameryki północnej, spotyka się także w rzekach. Jest barwy żółtawej, dosięga 1 m. długości. Pospolitszy jest **Minog rzeczny** (*P. fluviatilis*), o połowę mniejszy od poprzedniego, barwy oliwkowej; żyje w rzekach i jeziorach Europy. Mięso obu jest cenione.

Ostatni ten rząd obejmuje najniższej uorganizowane ryby; na nim kończymy opis klasy ryb.

Akwarjum.

199. Akwarjum daje możność obserwowania życia zwierząt wodnych, nie tylko ryb, ale i niższych gatunków, jak np. ślimaków, owadów wodnych i t. d. Akwarjum ma zwykle kształt skrzyni, której boczne ściany zrobione są z tafli szklanych, wprawionych w ramy za pomocą specjalnego kitu. Niektóre akwarja opatrzone są u dołu w kran, którym można wypuszczać wodę, co ułatwia bardzo odnawianie wody w skrzyni. Dno akwarjum pokrywa się warstwą piasku, grubą na 5—10 cm.; piasek powinien być czysty i dobrze opłukany. Na piasku układa się kamyczki, w środku robi się

z tufu *) rodzaj skały, z zagłębieniem dla posadzenia roślin wodnych. Niekiedy w skale tej urządza się wodotrysk. Tak przygotowane akwarjum powinno stać w pobliżu okna zwróconego na wschód. Przedewszystkiem należy zaopatrzyć akwarjum w rośliny wodne, gdyż pochłaniają one kwas węglowy, wytworzony przy oddychaniu przez znajdujące się w akwarjum zwierzęta i rozkładają go na węgiel i tlen. Węgiel zostaje przez roślinę przyswojony, wydzielony zaś tlen rozpuszcza się po części w wodzie i służy zwierzętom do oddychania.



Fig. 264. Akwarjum.

Tak więc rośliny przyczyniają się do odnawiania rozpuszczonych w wodzie gazów, zużywając szkodliwy dla zwierząt kwas węglowy, a dostarczając potrzebnego im tlenu.

Rośliny, nadające się do akwarjum, są następujące:

Osoka aloesowa, żabiściek pływający, elodea kanadyjska, pływacz pospolity, rzęsa wodna i rzęśl. Jedne są roślinami pływającymi i te puszczamy wprost do wody, inne, rosnące

*) Rodzaj wapniowca, bardzo gąbczasty.

w szlamie, powinny być zasadzone w nim przed napełnieniem akwarjum wodą, którą wpuszczamy powoli za pomocą rurki gumowej, pokrywamy wprzód rośliny i piasek arkuszami bibuły. Po napełnieniu akwarjum usuwamy ostrożnie bibułę. Akwarjum jest wtedy gotowe do przyjęcia zwierząt wodnych. Mogą nimi być: zwierzęta żyjące w wodzie, jak ryby, raki i niektóre oddychające skrzelami mięczaki, oraz takie, które wypływają na powierzchnię wody dla zaczerpnięcia powietrza, a więc ziemnowodne, owady wodne, ślimaki posiadające płuca i t. p.

Jeśli ilość roślin wodnych jest wystarczająca dla odnawiania gazów, potrzebnych zwierzętom do oddychania, to utrzymanie akwarjum nie sprawia wiele kłopotów.

Do karmienia zwierząt służyć mogą drobne raczki i owady wodne lub ich larwy, które znaleźć można na brzegach jezior i stawów, muchy, robaki ziemne pocięte, drobno siekane nietłuste mięso, larwy mrówek, roztarte białe opłatki, drobinki chleba i t. p. Nie należy tylko karmić zbyt często, ani zbyt obficie naraz: latem codziennie, zimą zaś 2—3 razy na tydzień. Jeśli woda w lecie zbyt szybko się ogrzeje, odlewamy jej $\frac{1}{3}$ część za pomocą rurki gumowej, którą się posługujemy jak syfonem, i dolewamy świeżej za pomocą tej samej rurki. Narastającą na ściankach warstwę zielonych wodorostów ścierać należy twardym pędzlem i usunąć je następnie razem z wydzielinami zwierząt za pomocą rurki gumowej, prowadząc powoli nad warstwą piasku zanurzony jej koniec, podczas gdy przez drugi woda odpływa na zewnątrz.

Materiał potrzebny do akwarjum można łatwo znaleźć w stawach przy pomocy lekkiej sieci z obrączką, jak do chwytania motyli.

Mając takie akwarjum, możemy badać życie niektórych istot, ich zwyczaje, sposoby żywienia się, czem otwieramy sobie zupełnie nowe i ciekawe widoki.

Zwierzęta bezkręgowce.

Typ II. Stawonogie.

200. Do stawonogich należą zwierzęta, pozbawione szkieletu wewnętrznego; natomiast ciało ich okryte jest zwykle dosyć twardą osłoną z osobliwej substancji (chitynowej), zbliżonej do rogu, jak to widzimy szczególnie u chrząszczy; osłona ta u niektórych (np. u raków) nasiąknięta jest wapnem, co nadaje jej większą twardość. Wszystkie mają nogi złożone z kilku części cz. *stawów*; stąd nazwa typu.

Typ ten dzieli się na 4 klasy: 1. **Owady**. 2. **Krocionogi**. 3. **Pająki**. 4. **Skorupiaki**.

KLASA I. OWADY (*Insecta*).

201. Ciało owadów, okryte powłoką chitynową, składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoku. Na głowie mieszczą się wielkie oczy, złożone z małych oczek gęsto przy sobie skupionych, i wielkie rożki, zwane *czułkami*, oraz narząd do pobierania pokarmu, który różnie bywa zbudowany: np. przystosowany do żucia, jak u chrabąszcza, w postaci trąbki, jak u motyli i t. p. Na tułowiu, złożonym z 3 części cz. *pierścieni*, znajdują się nogi w liczbie 3-ch par i u niektórych 1-a lub 2-e pary skrzydeł; odwłok składa się również z kilku pierścieni. Owady




Fig. 265. Kawałek oka owadu, silnie powiększony.

oddychają za pomocą drobnych rureczek, zw. *dychawkami* (tracheidy), licznie rozgałęzionych wewnątrz ciała i kończących się na zewnątrz drobnymi otworami. Krew bezbarwna, zawarta w jamie ciała, opłukuje te rurki, pochłania tlen i roznosi go po całym ciecie.

Najcharakterystyczniejszą cechą owadów jest *przemiana* (metamorfoza), której podlegają w czasie swego rozwoju. Z jajeczka, zniesionego przez samiczkę, wylęga się zwykle *gąsienica*, zwana liszką, mająca postać robaczka: robaczek ten ma *narząd pyszczkowy gryzący*, jest bardzo żarłoczny i rośnie szybko, a gdy nagromadzi w swoim ciecie dosyć tłuszczu i innych materiałów, otacza się oprzędem (wysnutym z oddzielnych gruczołów), twardą osłonką i t. p. i przemienia się w *poczwarkę*, nieruchomą i pozornie nieżywą. Przez ten cały czas odrętwienia odbywa się jednak w poczwarce bardzo energiczna praca wewnętrzna; ciało bowiem poczwarki przeistacza się w owad doskonały, który nagle wylatuje przez pękniętą osłonę.

U niektórych owadów przeobrażenia nie są zupełne, to jest brakuje jednej z form przemiany.

Klasa owadów liczy około 150,000 gatunków; z tych motyli jest 20,000, chrząszczy 80,000. Największa ilość owadów znajduje się w krajach zwrotnikowych.

Klasa owadów dzieli się na siedm rzędów, które rozpatrzmy po kolei.

Rząd I. Tęgopokrywe (Coleoptera).

202. **Tęgopokrywe** czyli **Chrząszcze** mają nad błoniastymi skrzydłami *twarde pokryw*y chitynowe, stanowiące drugą parę skrzydeł i służące do ochrony błoniastych w czasie spoczynku. Całe ciało okryte jest również twardą powłoką. *Narząd pyszczkowy gryzący*; ulegają zupełnym przemianom. *Gąsienice* zw. *pędrakami* mają po 6 nóg i głowę wyraźnie oddzieloną od tułowia. Tu należą:

203. **Piaskowiec mieszaniec** (*Cicindela hybrida*) (Tab. VIII, fig. 1), przebywa zwykle na piaszczystych, ogrzanych słońcem miejscowościach; żywi się innymi owadami; ma długie nogi i biega prędko; złapany, gryzie mocno. Pędraki jego zakopują się w piasku, wystawiając tylko głowę i czatując na zdobycz.



Często również spotyka się **Piaskowiec polny** (*C. campestris*) i **Piaskowiec leśny** (*C. sylvatica*).

Szczypawka skórna (*Carabus coriaceus*) (Tab. VIII, fig. 2) jest dosyć pospolita w całej Europie w miejscowościach ciemnych i wilgotnych, np. w lasach. Dzień spędza ukryta pod kamieniem, w nocy wychodzi na żer. Pędraki jej żywią się przeważnie ślimakami. Inne gatunki tego rodzaju, jak **Szczypawka złotniczek** (*C. auratus*) barwy zielono-żółcistej, **Szczypawka fioletowa** (*C. violaceus*) i t. d. należą do owadów pożytecznych, gdyż pożerają inne owady, szkodliwe dla roślin.

Tęczyk zdradliwy (*Calosoma sycaphauta*) (Tab. VIII, fig. 3), spotyka się w lasach; pełzając po drzewach, wyszukuje on i pożera gąsienice i poczwarki innych owadów roślinożernych, zwłaszcza zaś prądkę wędrowną, jest więc pożyteczny i nie należy go tępić.

Pływak wielki (*Dityscus latissimus*) (Tab. VIII, fig. 4) osiąga długości $3\frac{1}{2}$ — 4 cm., ma żółtawą obwódkę dookoła obrączki szyjowej i pokryw skrzydłowych i takąż dolną stronę. Znajduje się w dużych stawach, gdzie tak sam owad, jak i jego długie pędraki niszczą małe rybki.

Pospolity jest **Pływak obrzeżony** (*D. marginalis*), podobny do poprzedniego, tylko nieco mniejszy. Pędraki tych owadów, skoro zupełnie urosną, wygrzebują sobie otwory nad brzegiem wody i w nich, zakopawszy się, odbywają przemiany.

204. **Każnik czarny** czyli **Każnica** albo **Żuk wodny** (*Hydropphilus piceus*) (Tab. VIII, fig. 5), spotyka się we wszystkich wodach stojących. Osiąga $4\frac{1}{2}$ cm. Żywi się roślinami wodnymi. Samiczka jego, zanim złoży jaja, splata na powierzchni wody gniazdo, zamykające się pokrywką (fig. 266). Wylęgnięte pędraki żywią się małymi stworzeniami wodnymi; przemiany odbywają podobnie jak pływaki. Żuki wodne dają się utrzymywać w akwarjach, aby jednak mogły odbyć przemiany, trzeba umieścić na skale nieco darniny, w której się ukrywają.




Fig. 266. Oprzęd każnicy w całości i w przekroju.

Kasawiec kosmaty (*Staphylinus hirtus*) (Tab. VIII, fig. 6) odznacza się tem, że ma pokrywy skrzydeł krótsze, niż odwłok. Kasawce kryją się zwykle pod kamieniami pomiędzy mchem, w nawozie i t. d. Pędraki ich są bardzo zbliżone do owadu doskonałego, brak im tylko skrzydeł i pokryw. Żywią się innymi owadami i gnijącymi szczątkami roślin i zwierząt.

Pospolitszym jest **Kasawiec cesarski** (*S. caesareus*), którego łatwo poznać po błyszczących, złocistych plamach na odwłoku.

Grabarz niemiecki (*Necrophorus germanicus*) (Tab. VIII, fig. 7) spotyka się rzadziej niż **Grabarz pospolity** (*N. respillo*); ten ostatni odznacza się dwoma pomarańczowemi, gzyg-zakowatemi prążkami na czarnych pokrywach skrzydeł. Grabarze latają na wiosnę i w lecie; jajka składają na trupach małych zwierzątek, które poprzednio zagrzebują w ziemię, robiąc pod niemi dołek. Jeżeli grunt jest tak twardy lub kamienisty, że nie mogą ciała zagrzebać, to wpelzają w kilkoro pod nie i przenoszą na dogodniejsze miejsce, dźwigając je na plecach. W trudniejszych razach pracę wykonywują wspólnie, gromadząc się w znaczniejszej liczbie. Wylęgnięte pędraki mają w padlinie gotowe już pożywienie; w ciągu czterech tygodni wyrastają i zamieniają się w poczwarki, a w dwa tygodnie później wylęgają się z nich chrząszcze. Niszcząc wiele padliny, która psułaby powietrze, grabarze przynoszą pewną korzyść w gospodarstwie przyrody.

205. **Otrupek** (*Hister cadaverinus*) (Tab. VIII, fig. 8) jest

bardzo pospolity i żywi się nawozem i padliną, chwytając i drobne owady. W poszukiwaniu zdobyczy chrząszcze te odbywają w ciepły wieczór marsze i przeloty; skoro zaś znajdą się w niebezpieczeństwie, ratują się, udając nieżywych.

Omarlice (*Silpha*) (fig. 267), owady wielkości 1 cm., o punktowanych pokrywach, żywią się tak jak i ich gąsienice — padliną, a czasem napadają na rośliny i wyrządzają wielkie szkody.




Fig. 267. Omarlice. A—gąsienica, B—owad, C—gąsienica na liściach buraka.

Skórnik słoniniec (*Dermestes lardarius*) (Tab. VIII, fig. 9), na wolności żywi się padliną; wszakże często spotyka się w mieszkaniach ludzkich, gdzie niszczy rozmaite materiały pochodzenia zwierzęcego (futra, skóry, wyroby mięsne, zwierzęta wypchane i t. d.). Składa też w nie jaja, a wylęgłe z nich kosmate pędraki sprawiają również wiele szkody. Owady te, za dotknięciem, chowają rożki i nogi, i udają nieżywych przez czas dłuższy.

Jelonek (*Lucanus cernus*) (Tab. VIII, fig. 10), jest największym z chrząszczów krajowych. Mieszka w lasach dębowych. Samiec ma długie szczęki, zaopatrzone w ząbki, co stanowi potężną broń; samica pozbawiona jest tych rogów. Żywi się sokiem wypływającym z dębów. Pędraki jego żyją w próchniejącym drewnie dębowym i potrzebują 5 lat na ukończenie przemiany.

Żuk (*Geotrupes typhoeus*) (Tab. VIII, fig. 11), żyje na pastwiskach w miejscowościach leśnych, wykopuje pionowe otwory w ziemi pod nawozem krowim i owczym, i tam składa jaja. Samiec ma trzy rogi na tarczy górnej tułowia.

Pospolitszą jest **Krówka** (*G. stercorarius*) (fig. 268), mniejsza od żuka, spotykana na drogach w nawozie końskim; z wierzchu jest czarna lub niebieskawa, pod spodem fioletowa. Żuki te są pożyteczne.



Fig. 268. Krówka.

206. **Chrabąszcze** (*Melolontha vulgaris*) (fig. 269), należą do najszkodliwszych owadów, objadają bowiem liście drzew i są bardzo żarłoczne. Latają zwykle w maju. Samiczka składa około 70 jaj kupkami w ziemię i następnie umiera. Wylęgnięte w ziemi pędraki są również szkodliwe, jak i same chrabąszcze: wę-



Fig. 269. Chrabąszcze, a, b, c, d pędraki; e poczwarka w ziemi, g i f chrabąszcze.

drując pod ziemią, żywią się korzeniami rozmaitych roślin gospodarskich, które wskutek tego usychają; niszczą także i korzenie drzew. Przez trzy lata odbywa się powolny wzrost i niszczycielska praca pędraka; ku końcowi trzeciego lata wygrzebuje on sobie większą norę i w niej zamienia się na poczwarkę (e), która pozostaje prawie bez ruchu i nie przyjmuje wcale pokarmu. Po upływie paru miesięcy wychodzi z niej doskonały owad i wygrzebuje się z ziemi (f) zwykle z początkiem wiosny.

Lata, w których chrabąszcze ukazują się w większej ilości (bywa to zwykle co cztery lata), są istną plagą dla ogrodników. W celu wytępienia, strząsają je z drzew i zaparzywszy wodą, dają nierogaciznie.

Rohatyniec garbarz czyli **Nosorożec** (*Oryctes nasicornis*) (Tab. VIII, fig. 12). spotyka się dosyć często w czerwcu i w lipcu. Składa jaja w dębnicy garbarskiej, w inspektach, w dziuplach drzew. Tu żyją jego pędraki przez szereg lat i zamieniają się na poczwarki.

Wałkarz lipczyk (*Polyphylla fullo*) (Tab. VIII, fig. 13), spotyka się w lasach liściastych i iglastych, szczególnie na sosnach, sprawiając nieraz znaczne szkody. Pędraki jego żyją w ziemi i żywią się korzeniami traw.

Bogatek olbrzym (*Euchroma gigantea*) (Tab. VIII, fig. 14) znajduje się w Brazylii. Pędraki żyją w drewnie. Metalicznie dźwięczące pokrywy jego skrzydeł noszą krajowcy nawleczone jako naszyjniki.

Zacios (*Corymbites aeneus*) (Tab. VIII, fig. 15) spotyka się na kwiatach. Położony na grzbiecie, wypreża się z taką siłą, że staje na nogi. Pędraki jego żyją w ziemi i są bardzo szkodliwe dla ogrodów.




Fig. 270. Świetlik (a); b jego samiczka (powiększ.).

207. **Świetlik** cz. **Robaczek świętojański** (*Lampyris splendidula*) (Tab. VIII, fig. 16) ma świecące się w ciemności pierścienie na odwłoku. Wieczorem samce, latając, świecą, podobne do ruchomych gwiazdeczek; samiczka zaś (fig. 270), nie mająca skrzydeł, siedzi zwykle w tra-

wie wilgotnej, skąd też wydaje bardzo żywe światło. Pędraki świetlika żyją w próchniejących drzewach i świecą także, lecz słabiej. Żywią się przeważnie żywymi ślimakami.

Pszczółowiec (*Trichodes apiarus*) (Tab. VIII, fig. 17) zw. także *owłosiakiem*, spotyka się w lecie na kwiatkach, w słonecznych miejscach; lata tak prędko, że trudno go schwycić. Pędraki jego zakradają się niekiedy do ulów i zjadają poczwarki pszczół.

208. **Kantaryda lekarska** czyli **Mucha hiszpańska** (*Lytta vesicatoria*) (Tab. VIII, fig. 18), w niektórych latach spotyka się dosyć obficie na drzewach i krzewach leśnych, np. na bzach, topolach, wierzbach. Samczyki ukazują się w czerwcu i zwracają już zdaleka uwagę nieprzyjemnym zapachem. Kantarydy ususzone i roztarte, używane są w lecznictwie jako wezykatorje, gdyż mają własności ciągnące i przyłożone do ciała wywołują pęcherze.

Maik pospolity (*Meloë proscarabeus*) (Tab. VIII, fig. 19) spotykany jest często na wiosnę w trawie i na drogach. Żółte pędraki jego, nie dłuższe nad dwa milimetry, czatują w kwiatkach na pszczoły i czepiają się ich okrycia włoskowego; w ten sposób dostają się do ula, gdzie żywią się początkowo jajami pszczelemi, a następnie miodem. Przed zamianą na poczwarkę, maik opuszcza ul i zakopuje się w ziemię. Za dotknięciem wydziela z siebie żółtawą, gryzącą ciecz, dlatego ptaki go nie zaczepiają.

209. **Słoniki** czyli **Ryjkowce** (*Curculionideae*), maleńkie owady z dużymi różkami, z głową zakończoną rykiem, zagiętym na dół; należą do największych szkodników w lasach, na polach i w ogrodach. Z tych pospolitemi są **Strąkowce** (fig. 271), barwy czarnej w białe plamki; jaja składają w słupek kwiatowy grochu; tam rozwijają się gąsienice i wyjadają dojrzałe już nasienie.

Zwijacze (fig. 272), jaskrawo ubarwione; samiczki zwijają liście drzew w tutkę, w którą składają jajka, albo też znoszą je w owoce, a wylęgłe gąsienice niszczą straszliwie miejsca swego pobytu.

Orzechowce (fig. 273) przekłuwają rykiem młode orzechy laskowe i składają wewnątrz jajka. Jasno - żółty mały pędrak (fig. 274) zjada całą zawartość orzecha, ro-




Fig. 271. Strąkowiec. A—gąsienica, B—owad (powiększ.).



Fig. 272. Zwijacz. (powiększ.).

bi dziurkę w skorupce, poczem wychodzi na zewnątrz (puste orzechy z dziurką są pozostałością po tych szkodnikach). Zakopawszy się w ziemi, spędza tak zimę; na wiosnę dopiero przemienia się w poczwarkę i w owad dojrzały.

Kwieciak jabłkowiec nakłuwą pączki kwiatowe jabłoni i gruszy i składa tam jajka, czyni więc ogromne szkody.



Fig. 273. Orzechowiec. (powiększ.).

Największym szkodnikiem dla gospodarza jest **Wołek zbożowy** (*Calandria*

granaria), żyjący w śpichrzach; na wiosnę samiczka składa jajka w ziarna, które następnie gąsienice całkowicie niszcza. Zimą owady te spędzają ukryte w szparach. Ażeby się od tych szkodników zabezpieczyć, należy utrzymywać śpichrz w wielkiej czystości.

Wołek palmowy (*C. palmarum*) (Tab. VIII, fig. 20), znajduje się w Ameryce południowej; pędraki jego żyją w pniach palm i stanowią ulubioną potrawę krajowców.

Polesiak albo **Drwal** (*Hylaster ater*) (Tab. VIII, fig. 21)

lata w kwietniu i w maju. Pędraki jego żyją pod korą sosen i sprawiają wielkie szkody.

210. **Kornik drukarz** (*Bostrichus typographus*) (Tab. VIII, fig. 22), maleńki owad, mający $\frac{1}{2}$ cm., pospolity i bardzo szkodliwy; pod korą jodeł żłobi chodniki (fig. 275), gdzie składa jaja; kanały te w dalszym ciągu rozszerzają wylęgłe w nich pędraki, i tam zamieniają się w poczwarki, poczem owad wykształcony wydosta-



Fig. 275. Kornik drukarz i kawałek kory z jego chodnikami.

je się na zewnątrz. Drzewo takie musi uschnąć. Owad ten sprawia więc straszne spustoszenia w lasach jodłowych. Wy-



Fig. 274. Orzech otwarty z gąsienicą orzechowca.

obrażenie o jego szkodliwości może dać następująca cyfra: w r. 1783 w Hercegowinie uschły dwa miliony pni sosnowych; korniki, unoszące się w powietrzu, tworzyły jakby chmurę, a na jednym drzewie można ich było naliczyć około tysiąca.

Kozioróg rycerz (*Cerambyx heros*) (Tab. VIII, fig. 23), osiąga długości 3—5 cm.; odznacza się długimi czułkami: spotyka się w czerwcu i w lipcu na dębach. Pędraki jego, długie na 8 cm., przez kilka lat żyją w drewnie starych dębów, tocząc je we wszystkich kierunkach. Chrząższe te spędzają dzień ukryte w szczelinach kory, wylatują zaś wieczorem.

Wonnica piżmowa (*Aromia moschata*) (Tab. VIII, fig. 24) łatwa jest do poznania po piżmowej woni, którą wydaje. Często spotykana w lipcu i sierpniu na wierzbach, w których drewnie żyją jej pędraki.

Biegowiec łucznik (*Clytus arcuatus*) (Tab. VIII, fig. 25) jest wszędzie dosyć rozpowszechniony; znajduje się zwykle na próchniejących dębach.

Kołatek (fig. 276), mały chrząszczyk barwy ciemno-brunatnej, żyjący w drzewie budulcowem i w drewnianych sprzętach. Tocząc drzewo, sprawia kołatanie, które nieraz w pokoju wyraźnie słychać, zwłaszcza w nocy.

Słonka topolowiec (*Chrysomela populi*) (Tab. VIII, fig. 26), znajduje się na wierzbach i topolach. Pędraki jej pożerają liście tych drzew i są wskutek tego bardzo szkodliwe.

211. **Złotki** (*Chrysomelidae*) mają ciało kształtu jajowatego, z wierzchu mocno wypukłe; są także szkodnikami, a najdotkliwszym jest **Złotka Kolorado** (fig. 277), zw. *chrząszczykiem kartoflanym*, gdyż tak on, jak i jego gąsienice żywią się liśćmi kartofli. Owady te są tak żarłoczne, że całe pole w krótkim czasie spustoszyć mogą. Pochodzą z Ameryki i razem z kartoflami przedostały się do Europy.



Fig. 276. Kołatek: c—owad, a—gąsienica, b—wielkość naturalna owadu.



Fig. 277. Złotka Kolorado.

Nie powinniśmy tu pominąć i **Biedronki siedmiokropkowej** (*Coccinella septempunctata*) (fig. 278), pospolicie zwanej



Fig. 278. Biedronka siedmiokropkowa.

Bożą krówką, barwy zwykle czerwonej w czarne kropki. Składa ona jaja na roślinach, na których gnieźdzą się mszyce, a pędraki jej żywią się temi szkodliwymi dla roślin pasorzytami; oddaje przeto usługi ogrodnikom. Poczwarka jej, przymocowana do liścia, odbywa przy dotknięciu tak regularne ruchy podnoszenia i opuszczania tylnej części ciała, jak wahadło zegarka. Również pospolitą

jest **Biedronka dwukropkowa** (*C. bipunctata*).

212. **Sprężyki** (*Elateridae*), chrząszczyki o postaci owalnej, z małemi, grzebykowatemi rożkami. Odznaczają się tem, że położone na grzbiecie, podrzucają się do góry i następnie spadają na nogi. Sprężyki wyrządzają wielkie szkody w zbożu i warzywach. Najpospolitszy jest **Sprężyk zbożowy** (fig. 279), żyjący wśród zboża.



Fig. 279. Sprężyk zbożowy (powięk.).

Ze *sprężyków*, zamieszkujących obce kraje, na szczególną uwagę zasługuje **Świeciel**, żyjący w Brazylii; długi na 2 cm.; na szyi ma dwie żółte plamki, które w ciemności świecą tak, że można przy ich świetle czytać. Indianie przywiązują je sobie do obu wia, co zastępuje im latarki, a kobiety noszą je w siateczkach na głowie, jako ozdobę.

Wskazówki do łowienia i przechowywania chrząszczy.

213. Zbieracz żuków powinien przedewszystkiem wiedzieć, gdzie i kiedy może je znaleźć, gdyż nie wszystkie są w dzień widzialne. Musi je wyszukiwać pod kamieniami, w trawie i w mchach, wśród szczątków zwierzęcych i roślinnych, w nawozie. Powinien także zajrzeć pod korę starych drzew, rozłamywać stare grzyby, przesuwac siatką lub brzegiem otwartego parasola po trawie; niektórych gatunków poszukiwać musi w stojącej lub płynącej wodzie, in-



nych w gniazdach pszczoł, os i trzmieli lub w mrowiskach. Schwytane chrząszcze zabija się, jeśli są gładkie i czarne, zanurzając je w spirytus; jeśli zaś mają włoski na powierzchni lub są ubarwione, wpuszcza się je do słoiczka, w którym znajduje się bibułka lub gąbka, nasyczona kilku kroplami eteru albo benzyny i zamyka się słoik korkiem. Zabite owady nasadza się na cienkie szpilki (fig. 280), umyślnie do tego celu przygotowane. Większym żukom wtyka się szpilkę w wewnętrzny kąt prawego skrzydła, tak, iżby wyszła pomiędzy drugą a trzecią parą nóg. Drobne żuki przykleja się za pomocą gumy arabskiej, (do której dodaje się trochę cukru), na końcu klinowatego kawałeczka papieru, tak, aby nogi z obu stron wisiały swobodnie. Papierki te w szerszej części przetyka się szpilkami (fig. 281). Ażeby wszystkie żuki znajdowały się na równej wysokości, zostawia się około 1 cm. pomiędzy główką szpilki a chrząszczem. Zebrane żuki przechowywać należy w dobrze zamykających się pudełkach oszklonych lub w specjalnie do tego sporządzonych skrzynkach i trzeba czuwać nad tem, aby nie stały się pastwą pleśni, owadów, np. moli i t. p.

W końcu dodać należy, że chcąc poznać świat owadów, nie powinniśmy ograniczać się tylko do zbierania jaknajwiększej ilości martwych okazów, lecz starać się poznać tajemnice żywej przyrody przez własne badanie i spostrzeżenia.



Fig. 280. Nasadzanie żuków na szpilkę.

Fig. 281. Drobne żuki, naklejone na papier.

Rząd II. Błonkoskrzydłe (Hymenoptera).

214. Owady tego rzędu mają po cztery skrzydła błoniaste, cienkie, z nielicznymi, rozgałęzionymi żyłkami; przednie skrzydła są większe od tylnych. Przemiana zupełna; przrząd pyszczkowy przystosowany do kłosa i ssania.

Pierwszą grupę tego rzędu stanowią owady, opatrzone wysuwalnem *żądłem*, umieszczonem w tylnej części odwłoka; narzędzie to służy im do obrony.

Najważniejszym przedstawicielem tej grupy jest **Pszczola**

(*Apis mellifera*), znana w najdawniejszej starożytności. Dziś w Europie prawie nie znajduje się w stanie dzikim, natomiast w Ameryce, dokąd przewieziona została w roku 1675, rozmnożyła się bardzo i zdziczała.

Pszczoły są owadami towarzyskimi; kolonja ich czyli jeden rój, składa się z trojakich osobników: 1) *pszczół roboczych* (fig. 282) w liczbie 10,000 do 30,000; 2) jednej tylko *matki (królowej)* (fig. 283), czyli samiczki, składającej jaja; 3) z 200 do 300 *samców* czyli *trutniów* (fig. 284). Za miesz-



Fig. 282. Pszczoła robocza. Fig. 283. Pszczoła-królowa. Fig. 284. Truteń.

kanie służy dla pszczół dzikich—dziupla drzewna; dla domowych — specjalnie w tym celu sporządzone *ule*. W takiej dziupli lub ulu wytwarzają pszczoły robocze bardzo kunsztowną budowlę z wosku, t. zw. *woszczynę* (fig. 285). Składa



Fig. 285. Kawałek plastra wosku z matecznikiem.

się ona z sześciobocznych komórek kształtu bardzo regularnego, najlepiej zastosowanego do tego, by całą przestrzeń dokładnie zapełnić. Takich woszczyn zawieszają w ulu znaczną ilość. Każda ma 3 cm. grubości, a znajdują się od siebie w takiej odległości, aby dwie pszczoły swobodnie rozminąć się mogły. Woszczyny lepią pszczoły robocze z wosku, który jest wydzieliną osobnych gruczołków, umieszczonych w odwłoku. Komórki woszczyny napieniają one *miodem* i pyłkiem kwiatowym. Miód jest to słodki sok, wyssany przez pszczoły z kwiatów; pyłek zaś kwiatowy zbierają one do osobnych woreczków, znajdujących się na tyl-

nych łapkach, do których pracownice zgarniają go z kwiatów. Po przybyciu do ula, pszczoła wypłuka cały zebrany miód, prócz niewielkiej ilości, którą spożywa.

Do komórek woszczyny składa matka jaja, po jednym w każdej. Jaja według przeznaczenia składane są w różne komórki; i tak: jaja, z których wylądz się mają pszczoły robocze, składa matka do komórek zwykłej wielkości; w nieco większe komórki—jaja, z których wylęgnąć się mają trutnie; w nieliczne zaś, umieszczone z brzegu woszczyny, duże i okrągłe komórki, t. zw. *mateczniki*, składa jaja, z których mają wyjść matki. Po upływie trzech dni wychodzi już z jaja gąsienica, którą natychmiast biorą pod swoją opiekę pszczoły robocze i karmią ją troskliwie, a skoro ta zamieni się w poczwarkę (fig. 286), zalepiają komórkę woskiem. W niej w ciągu krótkiego czasu odbywa owad przemianę, a gdy pszczoła wylęgnie się z poczwarki, przegryza ową woskową pokrywę i wylatuje na wolność. Jeśli to jest pszczoła robocza, bierze się natychmiast do pracy, której nigdy nie brak



Fig. 286. Larwa i poczwarka pszczoły.

w ulu, gdyż na pszczołach roboczych spoczywa obowiązek czuwania nad czystością i porządkiem, wności i młodego pokolenia od wszelkich napastników i t. d. Trutnie zaś pędzą życie ociężałe, wylatują tylko w gorące dni i są mało ruchliwe. Gąsienice wylęgłe w matecznikach, odżywiane są przeważnie pyłkiem kwiatowym staranniej i obficie niż inne, wskutek czego rosną szybciej. Po upływie 16 dni cała przemiana jest ukończona i młoda matka wydaje charakterystyczny dźwięk, który wprawia w gniew starą królowę. Usiłuje ona żądłem zabić młode matki, lecz pszczoły robocze i trutnie nie dopuszczają do tego. Powstaje ogromne zamieszanie w całym ulu, aż nareszcie detronizowana królowa wylatuje z częścią pszczoł roboczych z ula, szukając innego pomieszkania i cały nowy ten rój zaczyna się gdzieś na drzewie, tworząc zbitą masę (fig. 287). Wtedy



Fig. 287. Zbieranie roju.

zagarnia się go i przenosi do nowego ula; tu natychmiast pszczoły rozpoczynają robotę: czyszczą, zalepiają woskiem szpary, budują woszczyny, w którą jeszcze przed końcem jesieni należy złożyć zapas miodu, aby rój mógł się wyżywić przez zimę. Tymczasem w starym ulu młoda matka, zostawszy panią, zaczyna swoje królowanie od tego, że oblatuje go




Fig. 288. Osa.

i zabija wszystkie niewylęgłe jeszcze siostry - matki, i w ten sposób zostaje jedyną królową roju. Ku jesieni pszczoły robocze wypędzają i zabijają trutnie, jako niepotrzebne i zajmują się gorliwie składaniem nowych zapasów na zimę.

215. Podobnież towarzyski żywot pedzą **Osy**, z których wszystkim znaną jest **Osa pospolita** (*Vespa vulgaris*) (fig. 288), zbliżona kształtem do pszczoły,



Fig. 289. Gniazdo osy.

ły, lecz od niej wysmuklejsza. Gniazda os, podobne do woszczyny pszczoł, ulepione są zwykle z przeżutej masy roślinnej (fig. 289). W kolonjach ich znajdują się również samce, samiczki i osy robocze. Z tych tylko samiczki pozostają żywe przez zimę; zakładają one nowe gniazda i wychowują osy robocze i samców, które giną z pierwszymi mrozami.

216. Do rodziny *os* należą też:

Szerszeń (*Vespa crabro*), budujący gniazdo w dziuplach drzew i pod dachami. Ukłucie jego żądła jest bardzo bolesne.

Trzmiele (*Bombus*), o kształcie ciała pękatym, żyjące w nielicznych gromadach w ropyadlinach ziemi, gdzie budują gniazda bez woskowych komórek (fig. 291).

Najpospolitszym jest **Trzmiel ziemny** (fig. 290), okryty czarnymi włoskami z jedną żółtą pręgą na odwłoku i **Trzmiel ogrodowy**, mający odwłok czarny z żółtymi pręgami.



Fig. 290. Trzmiel ziemny.

217. Do tego samego rzędu błonkoskrzydłych należą **Mrówki** (fig. 293), które podobnie jak pszczoły, żyją gromadnie i tworzą społeczeństwo. Miesz-

kanie wykopują w ziemi, w postaci bardzo regularnych kurytarzy, a na niem układają zwykle duży kopiec z kawa-



Fig. 291. Gniazdo trzmieli (wielkość naturalna).

łeczków drzewa, igieł sosnowych, kamyczków, odłamków żywicy i t. d. (fig. 292).

Kolonja mrówek składa się zwykle z trojakiich osobników (fig. 293): 1) *oskrzydłonych samców*, 2) również *skrzydlatych samiczek* i 3) *bezskrzydłych robotnic*. Te ostatnie mają na pieczy jaja, liszki i kokony (tak zwane „poduszeczki” lub fałszywie przezywane *jajkami mrówczemi*), w których znajdują się poczwarki. W dzień słoneczny mrówki wynoszą swe kokony na wierzch mrowiska, skoro zaś nastąpi czas wilgotny lub zagraża jakie niebezpieczeństwo, znoszą je napowrót do głębokich piwnic swoich. Mrówki robocze budują mieszkania, znoszą pokarm, wykonywują wszelkie roboty domowe i bronią wspólnego gniazda. Są przytem tak



Fig. 292. Gniazdo mrówek w przekroju.



Fig. 293. Mrówka-samiec, robotnica, samiczka, poczwarka, liszka, kokon.

koleżeńskie względem siebie, że mogą służyć za przykład; gdy jedna spotka drugą idącą z ciężarem, to ustępuje jej

z drogi, a jeśli może, to pomaga w przeniesieniu tego ciężaru. Samce i samiczki nie pracują, ani nie znoszą pokarmu. Skoro młode pokolenie dorośnie, wylatuje w pole, a w krótkim czasie samce rozpraszają się i giną, samiczki zaś tracą skrzydła i wracają do gniazda składać jaja.

Mrówki żywią się pokarmem roślinnym i zwierzęcym, lubią bardzo słodczy, owady, nawet martwe zwierzęta objadają aż do kości; nieraz w mrowisku znajdowano szkielety ptaszków. Czasem mrówki trzymają uwięzione *mszyce*, dostarczając im pożywienia, a same karmią się cieczą lepką, słodkawą, wydzielaną przez te mszyce, które stanowią więc jakby zwierzęta domowe mrówek.

Mrówki są wzorem pracowitości, ciągle czynne; są jednak mściwe i gryzą swych napastników; przyczem wydzielają w nakłute miejsca skóry ostry sok z gruczołków, umieszczonych na końcu odwłoka, co sprawia przykry ból i swędzenie.

Jeżeli zakłócimy robotę gromadki mrówek, znajdującej się w pewnej odległości od gniazda, wtedy stają się niespokojne i biegną do mrowiska, a ogół natychmiast zaczyna zajmować się zbieraniem i znoszeniem swoich liszek i poczwerek w głąb kurytarzy podziemnych. Gdy mrówki czują się już bezpiecznemi, zabierają się żwawo do naprawy uszkodzonego mieszkania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu mieszkanie pierwotne okaże się niedogodnem, np. zbyt wilgotne lub zanadto zbliżone do miejsca, skąd grozi niebezpieczeństwo, wykopują inne i natychmiast przenoszą tam wszystkie kokony i gąsieniczki.

Obserwując mrówki, możemy zauważyć, że skoro dwie z nich spotkają się z sobą, dotykają się swojemi rożkami, tak, jakby chciały coś sobie powiedzieć. Liczne spostrzeżenia przekonywują o tem, że rzeczywiście owady te mogą się z sobą porozumiewać, dotykając się rożkami. Franklin opowiada następujący szczegół o mrówkach: w mieszkaniu w szafie miał słoik z syropem, do którego dostały się mrówki. Wytrząsłszy wszystkie, zawiesił ów słoik na sznurku u sufitu. Jedna wszakże mrówka została w nim; najadłszy się syropu, zaczęła szukać wyjścia, i po długich, daremnych wędrówkach znalazła wreszcie właściwą drogę po sznurku na sufit i po ścianie wróciła pod podłogę. Wkrótce potem ukazała się cała masa mrówek, wędrująca po ścianie i suficie wprost do sznurka, a stamtąd do słoika. Wędrówka ta trwała przez cały dzień, jedne mrówki schodziły po jednej stronie

sznurka do słoika, inne wychodziły z niego po drugiej, dopóki wszystek syrop nie został spożyty.

Chociaż wogóle w społeczeństwie mrówczem panuje miłość i równość, wszakże niekiedy przychodzi między nimi do walk zaciętych. Skoro tylko, wskutek jakichkolwiek przyczyn, wyginie młode pokolenie robotnicze kolonji mrówczej, mrówki udają się tłumnie do gniazd innych gatunków mrówek, opanowują je i zabierają liszki i kokony do swego gniazda. Obce mrówcze plemię, wyhodowane tu jako niewolnice, spełniają wszelkie roboty, potrzebne do utrzymania kolonji: znoszą pokarm do gniazda, zwiększają budowlę, wynoszą na słońce gąsienice i kokony, słowem łączą się z zaborcami, tworząc różnobarwne mrowisko.

Jest kilka gatunków mrówek, żyjących przeważnie w lasach iglastych; w naszych lasach najpospolitsze są małe **mrówki czarne** i duże **mrówki leśne** barwy czerwono-brunatnej. Te ostatnie budują ogromne, stożkowate kopce z igieł sosnowych, kawałków drzewa i t. p.; podrażnienie — gryzą mocno.

Po domach spotykane są **mrówki drobne**, chętnie przebywające w spiżarniach, gdzie żywią się przeważnie słodyczami; mieszkania swe mają pod podłogą.

W Afryce żyją **mrówki czerwone** i **mrówki czarne**, dużo większe od europejskich; są one bardzo dla zwierząt niebezpieczne, gdyż napadają je gromadnie i gryzą tak zawzięcie, że tylko kąpielą wodną mogą się napadnięte ofiary ratować od drobnych swych napastników.

218. Do tego rzędu należą także **Gąsieniczniki** (*Ichneumonidae*) (fig. 294) z długim pokładelkiem, którym przekłuwają skórę gąsienic innych owadów i składają jaja do wnętrza ich ciała. Tu wylęgają się liszki gąsienicznika, żywią się sokiem gospodarza, który pomimo to żyje i rośnie, ale najczęściej ginie wtedy, gdy jego pasorzyty przekształcą się w poczwarki. Tym sposobem owad ten niszczy bardzo wiele innych szkodliwych owadów, głównie zaś liszki kapustnika; jest więc pożyteczny.

Galasówka dębowa (*Cynips Quercus folii*) (fig. 295) jest drobnym owadem, składającym jaja



Fig. 294. Gąsienicznik.



Fig. 295. Galasówka.

w żeberka liści dębowych; podrażnienie to sprawia w liściu rozrost tkanki, tworząc t. zw. *orzeszek galasowy* (*galasówkę*) (fig. 296). W nim rozwija się liszka oraz poczwarka, po-
czem dojrzały owad wydostaje się na zewnątrz. Orzeszki galasowe służą do wyrobu czarnej farby; dawniej robiono z nich atrament. Inne gatunki gala-
sówek żyją na różnych drzewach. np. na róży, fidze, powodując na nich po-
dobne nabrzmienia.



Fig. 296. Orzeszki galasowe.

Trzpiennik (*Sirex gigas*) (Tab. XII, fig. 1), składa jaja w drewno sosen i świerków. Wylęgające się z nich liszki wydrążają sobie wężykowate kanały i przebywają tam dwa lata, aż do zupełnego rozwoju. Nieraz liszki trzpienników znajdują się w deskach użytych na budowlę i sprzęty, a z nich dopiero owad wydostaje się na zewnątrz, tak, że nieraz nagle ukazuje się w pokoju.

Rząd III. Łuskoskrzydłe cz. motyle (Lepidoptera).

219. Owady, należące do tego rzędu, mają po cztery skrzydła przejrzyste, okryte drobnymi, cienkimi łuskami (fig. 297); ciało mają pokryte włoskami; narząd pyszczkowy zrośnięty w postaci trąbki ssącej (fig. 298). Przemianę odbywają zupełną. Gąsienice ich nazywają się *liszkami*; owad do-




Fig. 297. Łuski na skrzydłach motyla; *a b c*—pojedyncze; *a*—ułożone na skrzydłach (powiększ.).



Fig. 298. Głowa motyla z trąbką (powiększ.).

skonały żyje bardzo krótko.

Rozróżniamy w tym rzędzie cztery gromady: 1) **motyle** **dienne**, 2) **m. wieczorne** cz. **zmierzchnice**, 3) **m. nocne** (te dwie ostatnie gromady zwykle nazywamy *émami*), 4) **drobnomotyle**.



220. **Motyle dzienne** (*Diurna*) o ciele walcowatym, wysmukłym; gąsienice ich mają po 16 nózek, są gładkie lub pokryte ostremi włoskami.

Paź królowej (*Papilio Machaon*) (*Tab. IX, fig. 1*), lata w lipcu i w sierpniu. Jaja składa na marchwi i innych roślinach baldaszkowatych. Liszka jego jest zielona w czarne pręgi i czerwone punkciki. Na łodydze jakiegokolwiek rośliny przemienia się ku jesieni w szaro-zieloną poczwarkę, z której wspaniały motyl wychodzi dopiero na przyszłą wiosnę.

Bardzo podobny do niego jest **Żeglarek** (*Papilio Podalirius*), składający jaja na szakłakach i śliwach.

Apollo (*Parnassius Apollo*) (*Tab. IX, fig. 2*), lata w lipcu. Jaja składa na rozchodniku. Liszka czarna o plamkach czerwono-żółtych, otoczywszy się lekką pajęczyną, przemienia się na ziemi w poczwarkę, okrytą niebieskawym pyłkiem; z niej po upływie dwóch tygodni wychodzi motyl. Żyje przeważnie w górach alpejskich.

Białawiec czyli **Bielinek kapustnik** (*Pieris brassicae*) (*Tab. IX, fig. 3*), jest wszędzie pospolity. Ukazuje się dwa razy do roku: od kwietnia do czerwca i od lipca do września. W tym też czasie składa jaja na rozmaitych gatunkach kapusty. Liszki niebieskawe lub brunatno-żółte (3 a) z pręgą żółtą na grzbiecie i na bokach. Gdy się mają zamienić w poczwarki, wypełzają na mury, parkany, do mieszkań i tu odbywają przemiany. Z poczwarek wiosennych motyle wylatują po 2—3 tygodniach; jesienne poczwarki zimują do następnej wiosny.

Cytrynek (*Colias rhamni*) (*Tab. IX, fig. 4*), ten cytrynowo-żółty motylek jest miłym zwiastunem wiosny, ukazuje się bowiem już w marcu lub kwietniu. Liszka jego, barwy matowo-zielonej (4, a), żyje na kruszynie; na gałązce przemienia się w zieloną poczwarkę (4, b), z której po 4—6 tygodniach wylęga się motyl, pospolity w całej Europie.

Dukatnik (*Polymmatas virgaureae*) (*Tab. IX, fig. 5*), ma skrzydełka wspaniałego złocisto-czerwonego koloru z czarnym brzeżkiem. Spotyka się w lasach w lipcu i sierpniu; składa jaja na szczawiu i tymianie. Gąsienice są ciemno-zielone; przemieniają się na łodygach roślin w brunatne poczwarki. Wylęganie motyla z poczwarki trwa od 4 — 6 tygodni.

221. Modraczek niebieski (*Lycaena Argus*) (Tab. IX, fig. 6). Przedstawiony tu samiec jest czerwono- niebieski; samiczka zaś ciemno-brunatna z mniej lub więcej wyraźnemi plamami półksiężycowemi koło brzegu. Bardzo pospolity na łąkach leśnych w czerwcu i w lipcu, na nostrzyku i niektórych innych ziołach. Gąsienice i poczwarki są brunatno-zielone. Wylęganie się motyla trwa 2—3 tygodni.

Rusałka mała (*Vanessa urticae*) (Tab. IX, fig. 7), bardzo pospolity motyl, ukazujący się już na początku wiosny, a powtórnie od lipca do października. Liszka (7, a) żółtawa z jaśniejszemi prążkami lub czarniawa z żółtymi pręgami, żyje na pokrzywie; poczwarka szaro-brunatna ze złotymi plamkami; motyl wylęga się z niej w 14 dni. Bardzo podobna do tej jest **Rusałka większa** (*Vanessa polychloros*), której gąsienice znajdują się w maju i w czerwcu na drzewach owocowych, wierzbach i wiązach.

Pawik dzienny (*Vanessa Jo*) (Tab. IX, fig. 8), na każdym skrzydełku ma po plamie barwnej, podobnej do oczek na piórach pawia. Lata w tym samym czasie co i poprzedni; ciemne jego liszki (8, a) żyją na pokrzywie; poczwarka (8, b) jest zielona z połyskiem złotym.

Żałobnik (*Vanessa Antiopa*) (Tab. IX, fig. 9) ma jedwabisto-brunatne skrzydełka z jasno-żółtą obwódką i plamami fioletowemi po brzegach. Spotyka się dosyć często. Jaja składa dwa razy do roku: na wiosnę i ku jesieni, na brzozach, wierzbach, topolach, gdzie wkrótce potem widzimy gąsienice jego, gromadnie żyjące (9, a). Poczwarka, uwieszona u drzewa, jest szaro-brunatna (9, b). Przemiana jej trwa 2—3 tygodni.

Admirał (*Vanessa Atalanta*) (Tab. IX, fig. 10) należy także do najpiękniejszych motyli dziennych. Lata od lipca do września i składa jaja na pokrzywie. Liszki brunatno-żółte lub czarne, mają z boków pręgi żółte lub białawe i zaopatrzone są w żółte ciernie. Żyją pojedynczo pomiędzy sklejonymi liśćmi i przemieniają się w czerwcu w brunatne, szare poczwarki, z których po upływie paru tygodni wylęga się motyl.

222. Rusałka osetek (*Vanessa cardui*) (Tab. X, fig. 1), lata pojedynczo na wiosnę, niekiedy zaś w większych masach w lecie. Jaja składa na ostach. Liszki (1, a) rozmaicie zabarwione, żyją samotnie między sklejonymi liśćmi.

Szaro - brunatna poczwarka okryta jest złotymi brodawkami. Motyl ten rozwija się w ciągu trzech tygodni.

Perłowiec cesarek (*Argynnis Paphia*) (Tab. X, fig. 2) pospolity jest w niezbyt gęstych lasach w lipcu i w sierpniu. Liszki żyją na fijołkach, pokrzywach, malinach i jeżynach; są brunatne i mają na grzbiecie szeroki pas żółty z czarną linią w środku. Uwieszona poczwarka przemienia się w motyla w ciągu trzech tygodni.

Szachownica (*Melanagria galathea*) (Tab. X, fig. 3) jest wszędzie pospolita; lata w tym samym czasie i w tych miejscach, co i perłowiec. Gąsienica żyje na trawach; przemianę odbywa na ziemi.

Pstrokolnik czyli **Skalnik** (*Satyrus Hermione*) (Tab. X, fig. 4), lata w lipcu i w sierpniu; nie jest zbyt pospolity. Jaja składa na kłosówce wełnistej, gdzie też żyją w ukryciu jego liszki; przezimowawszy, przemieniają się w poczwarki, z których po trzech tygodniach wylatują motyle.

223. 2. Motyle wieczorne czyli **Zmierzchnice** mają ciało grubsze, stożkowate; gąsienica gładka lub okryta włosiem, z rogiem na ogonie lub bezrożna. Motyle te wylatują tylko o zmierzchu, dzień spędzają w ukryciu.

Trupia główka (*Sphinx Acherontia Atropos*) (Tab. X, fig. 5) jest największym z motyli europejskich. Nazwa jej pochodzi stąd, że ma na środku ciała żółte plamy w kształcie trupiej główki. Lata w czerwcu i w jesieni. Liszka jej (5, a) żyje przeważnie na kartoflach; przemianę odbywa na ziemi. Poczwarka jest wielka, czerwono - brunatna. Motyl wychodzi z niej zwykle po 4 — 5 tygodniach. Nie bardzo pospolity.

Zmierzchnica ostromleczowa (*Deilephila euphorbiae*) lata w czerwcu i w lipcu. Gąsienica żyje na ostromleczu; jest zielona z czerwoną pręgą na grzbiecie, a żółtymi i czerwonymi plamami po bokach. W sierpniu przemienia się w ziemi na poczwarkę, która zimuje, a na wiosnę owad wylata. Jest pospolitsza od poprzedniej.

Gryzuń topolowy (*Smerinthus populi*) (Tab. X, fig. 6), lata w maju i w czerwcu; jaja składa na topolach i wierzbach; liszki (6, a) żyją przez całe lato na tych drzewach; są one niebieskawo - zielone w białe prążki. Przemianę odbywają w ziemi; poczwarka (6, b) jest ciemno-szara z jaśniejszymi miejscami.

Pawik nocny (*Smerinthus ocellata*) (Tab. X, fig. 7) spo-

tyka się dosyć często na kwiatach w wieczory majowe i czerwcowe. Składa jaja na jabłoniach, topolach i wierzbach. Liszka jego (7, a) bardzo zbliżona jest do poprzedniej; poczwarka (7, b) czarno-brunatna, znajduje się również w ziemi. Szkodliwy dla młodych drzewek.

224. Gołębi-ogon (*Macroglossa stellatarum*) (Tab. XI, fig. 1) spotyka się w maju i powtórnie od sierpnia do października. Zielonawe lub brunatno - czerwone liszki żyją na przytulji; przemianę odbywają między sklejonemi liśćmi. Jest wszędzie pospolity.

Przeziernik (*Macroglossa bombyliiformis*) (Tab. XI, fig. 2) lata w maju i w czerwcu. Przy pierwszym polocie traci łuski ze skrzydeł, które są wskutek tego przejryste. Liszki żyją na przytulji i przewiertniu; są one zielonawe i mają czerwony róg na ogonie. Przemianę odbywają w podługowatym, brunatno-żółtawym kokonie.

Łomignatek tawulec (*Zygaena filipendulae*) (Tab. XI, fig. 3) jest wszędzie pospolity, spotyka się na ostach, skabiozach i t. d. w lipcu i w sierpniu, zwłaszcza w przejrzystych lasach. Liszka jest żółta z czarnemi plamkami na grzbiecie; żyje na koniczynie i innych roślinach (przetaczniku, babce, dziurawcu).

Niedźwiedziówka (*Arctia caya*) (Tab. XI, fig. 4) należy do najpospolitszych motyli; liszki jej (4, a), zaopatrzone w długie włosy, żyją na najrozmaitszych roślinach. W maju lub czerwcu kończy się wzrost; potem otaczają się przedzą i odbywają w niej przemianę w poczwarkę (4, b); motyl wylatuje z niej po 3—4 tygodniach.

Borowiec zawisak (*Sphinx pinastri*) (fig. 299), barwy po-



Fig. 299. Borowiec zawisak.

pielatej w czarne pręgi;— ma bardzo długą trąbkę i—wysysa sok z kwiatów, nie siadając na nich i unosząc się na skrzydłach. Jaja składa na igłach sosen, na których żyją później gąsienice, zielonawe, żółto i białopaskowane, z rogiem na końcu.

Gąsienice innych zawisaków żyją na innych drzewach, jak topolach i t. p. Wszystkie są bardzo szkodliwe.

225. **3. Motyle nocne** (*Nocturna*) są budowy krępej, wylatują tylko w nocy; gąsienice są gładkie lub okryte włosem, mają 5—8 par nóg. Przemianę odbywają zwykle w kokonie, który liszki wysnuwają z gruczołów przednich; owad wykształcony, chcąc wyjść na zewnątrz, wydziela gryzącą ciecz i w ten sposób robi sobie w kokonie otwór, którym wylata.

Przędka pierścieniowata (*Gastropucha Bombyx neustria*). (Tab. XI, fig. 5), ma grube włochate rożki, lata w lipcu i często zalatuje wieczorami do okien. Samiczka składa jaja w liczbie 300 — 400, oblepiając nimi młode gałązki drzew owocowych w postaci pierścionków (fig. 300), z nich wylęgają się na wiosnę gąsienice (5, a), które sprawiają ogromne spustoszenia wśród drzew owocowych.

Również szkodliwa jest dla drzew owocowych **Zakonniczka wielkogłowa** (*Ocneria dispar*).

Jedwabnik (*Bombyx mori*) (Tab. XI, fig. 6), niepozorny ten motyl, mający tak ważne znaczenie w przemyśle, pochodzi z Azji południowej. W Chinach i w Europie południowej hodują go w domach dla otrzymania jedwabiu. Motyl ten składa w lipcu 300—400 jajeczek, z których następnej wiosny wylęgają się białawe liszki (6, a), w tym czasie, gdy rozwijają się liście białej morwy, którą gąsienice się żywią. W ciągu miesiąca wyrastają one zupełnie i snują przez 3½ dnia swój kokon (c). W ciągu następnych pięciu dni zamienia się gąsienica w poczwarkę, której przemiana na motyla trwa znowu 14 do 19 dni. W kokonach, przeznaczonych do otrzymania jedwabiu, należy wprzód zabić poczwarkę za pomocą ogrzewania, gdyż motyl wydostając się z kokonu, przegryzłby go i uczyniłby kokon bezużytecznym. Kokon taki składa się z jednej nici, długiej na 8 do 10 tysięcy metrów,



Fig. 300. Jajka przędki pierścieniowatej.



Fig. 301. Jedwabnik: gąsienica, kokon i poczwarka.

powstającej z wydzielanej przez liszkę lepkiej substancji, którą liszka odpowiednimi ruchami owija około siebie. Na powietrzu substancja ta twardnieje i tworzy znaną przędzę jedwabną. Aby tę przędzę zużytkować, potrzeba każdy kokon rozplątać. W tym celu wrzucają go do wody wrzącej, aby rozpuścić sklejającą go substancję i oddalić zewnętrzną gorszą warstwę jedwabiu, co się dokonywa przy pomocy uderzeń pręcikami. Następnie wyszukują końce kilku (5 — 7) kokonów i przyczepiają je do motowidła, które je rozkręca. Z 10 kilogr. kokonów otrzymuje się około 1 kilogr. ($2\frac{1}{2}$ funta) gotowego jedwabiu, a na 1 kilogram idzie 500—600 kokonów surowych.

Pierwsze jaja jedwabników zostały przyniesione do Europy dla cesarza rzymskiego Justyniana z Chin potajemnie, w wydrążonych laskach, przez dwóch mnichów chrześcijańskich, w 555 roku. Wychodowano z nich liszki i w ten sposób otrzymano pierwsze jedwabniki w Europie. Dopiero wszakże od r. 1600 rozwinęło się jedwabnictwo na wielką skalę w południowych krajach i we Francji. U nas, pomimo wielu usiłowań, jedwabnictwo nie mogło stać się przemysłem prawdziwym, dlatego, że hodowla jedwabników wymaga koniecznie obecności białej morwy, którą się żywią liszki, a drzewa te trudno się udają w naszym klimacie. Jedwabniki karmione innymi liśćmi nie dają kokonów. Obejście się z nimi wymaga wielkiej uwagi i czystości, gdyż łatwo podlegają rozmaitym chorobom; młode liszki są bardzo wrażliwe na zimno.

226. **Barczatka** (*Lasiocampa quercifolia*) (Tab. XI, fig. 7), ukazuje się w czerwcu i w sierpniu: składa jaja na drzewach owocowych i na tarninie. Liszki są szare z dwoma wcięciami ciemno - niebieskimi; czynią one znaczne szkody w szkółkach drzewnych.

Przędka sosnówka (*Gastropucha pini*) (Tab. XI, fig. 8) ukazuje się w niektóre lata w wielkiej obfitości i bywa wtedy bardzo szkodliwą dla lasów sosnowych. W lipcu lub sierpniu składa samiczka 150—250 jaj, z których wychodzą natychmiast liszki i przezimowawszy w mchu, osiągają zupełnego rozwoju w czerwcu następnego roku. Przemiana ich odbywa się w kokonie i trwa trzy tygodnie.

Przędka wędrowna (*Cnethocampa processionea*) Tab. XI, fig. 9) ukazuje się w sierpniu i we wrześniu; składa jajka (150—200) na pniach dębów. Na wiosnę wylęgają się z jaj

liszki, które dzień spędzają w swoich przedziwach, w nocy zaś wywędrowują gromadnie, idąc szeregiem ku górnym gałązkom, których liście objadają nieraz doszczętnie. Włoski, któremi są liszki okryte, odłamują się łatwo i dostawszy się do skóry człowieka lub zwierząt, powodują silne zapalenie. Gąsienice otaczają się brudno - białymi kokonami i w nich przemieniają się w poczwarki żółtawej barwy.

227. Drugą grupę *nocnych motyli* obejmują tak zwane **Sówki** czyli **Ćmy**.

Nocnica zw. **ćmą rolniczą** (*Agrotis pronuba*) (Tab. XI, fig. 10) jest wszędzie pospolitą. Lata w czerwcu i w lipcu; liszki jej żyją na rozmaitych ziołach; przemianę odbywa w ziemi.

Pyszałek (*Moma Orion*) (Tab. XI, fig. 11) jest ćmą również pospolitą; ukazuje się w maju i w czerwcu. Gąsienice jej czarne, okryte czerwono - brunatnymi włoskami, znajdują się na dębach, bukach i brzozech. Przemiana odbywa się we wrześniu lub październiku, pomiędzy liśćmi, gdzie czerwono-brunatna poczwarka zimuje.

Mora niebieska (*Catocala fraxini*) (Tab. XI, fig. 12) nie należy do pospolitych. Szaro-popielate jej liszki żyją na topolach, jesionach, bukach, dębach i t. d., których liście pożerają podczas nocy. Przemianę odbywają w luźnem utkaniu pomiędzy liśćmi; poczwarka okryta jest pyłkiem niebieskim.

Mora czerwona (*Catocala nupta*) (Tab. XI, fig. 13) spotyka się w sierpniu i we wrześniu na pninach wierzb; siedząc, ukrywa swe tylne, czerwono lub niebiesko zabarwione skrzydełka pod szaremi przednimi, tak, iż trudno ją dostrzedz. Liszki jej żyją na wierzbach i topolach. Przemieniają się w białym kokonie, przymocowanym do liści lub do szpary w korze. Poczwarka także jest okryta pyłkiem niebieskim.

Miernik pstrokaty (*Agreściak*) (*Abraxas grossulariata*) (Tab. XI, fig. 14), lata w lipcu i w sierpniu. Liszki jego zielonawe pożerają liście agrestu i porzeczki; poruszają się one w ten sposób, że wyginają się łukowato, przytwierdzając się kolejno przednimi, to tylnymi nogami. Poczwarka znajduje się w luźnem przedziwie wśród liści. Jest bardzo szkodliwy.

Ogółatniak cetyniak (przedzimka) (*Hibernia defoliaria*) (Tab. XI, fig. 15), lata późną jesienią. Samiczka niema skrzy-

deł, nie podobna jest zupełnie do motyla (fig. 302, *b*), wędruje po drzewach; łowi ją za pomocą tasiemek nasmarowanych klejem. Liszka spotyka się nietylko na drzewach owocowych, ale prawie na wszystkich leśnych; w czerwcu spuszcza się ona po wysnutej nitce na ziemię, gdzie zagrzebuje się i odbywa przemiany.




Fig. 302. Ogołatniak: *a*—samiec, *b*—samica, *c*—gąsienica.

ce, którą wysnuwają, lub sporządzonej z tkaniny, którą gryzą.

Mól ziarnik (*Tinea granella*) (Tab. XI, fig. 16), składa jaja w czerwcu w zapasy zboża, sprawiając w nich znaczne szkody, gdyż żyje w ziarnie, które otacza swą przędzą i zawartość ziarna całkowicie wyjada; w jesieni robi kokon w szparach budynków i tam pozostaje przez całą zimę.



Fig. 303. Mól
kożusznik.

Mól sukiennik (*Tinea sarcitella*), znany powszechnie motyl, którego liszki sprawiają tyle szkód w sukniach: mieszkanie swoje, wyglądające jak pochwka, robi z tkaniny, którą gryzie i pochwkę tę ciągle powiększa.

Mól kożusznik (fig. 303), żyje w futrach, z których robi sobie kożuszek.



Fig. 304. Mól jabłoniak.

Oprócz tych, jest jeszcze kilka gatunków moli, żyjących na drzewach i w owocach, np. **Mól jabłoniak** (fig. 304), którego liszka żyje na liściach jabłoni i niszczy je, a czasem wgryza się w owoce. Wszystkie mole są bardzo szkodliwe.

Piórolotek (*Pterophorus pcutadactylus*) (Tab. XI, fig. 17) ma skrzydełka śnieżno-białe, rozdzielone tak, że wyglądają jakby z piórek złożone. Często spotyka się od czerwca do sierpnia. Liszki jego żyją na powojach.



Zbieranie, hodowla i preparowanie motylów.

229. Wyhodowanie motylów z jaj nie jest łatwe, a i przy pielęgnowaniu liszek, napotykamy często na znaczne trudności, gdyż trzeba znać nie tylko tryb ich życia, lecz i rośliny, którymi się żywią. Przedewszystkiem zaś wiedzieć trzeba, gdzie należy wyszukiwać gąsienic. Przeszukuje się więc w dzień i wieczorem, a nawet w nocy przy pomocy latarni, liście pogryzione i skrecone; strząsa się gąsienice z drzew i krzaków na podstawioną siateczkę lub zbiera się ją z ziół, jak żuki. Zebrane gąsienice przenosi się do szafki na ten cel sporządzonej (fig. 305), której ścianki boczne i sufit utworzone są z gęstej siateczki, dno zaś usypane warstwą przesianego piasku, zmieszanego z ziemią, grubą na 5—10 cm. Rośliny,




Fig. 305. Domek gąsienic.

którymi gąsienice żywią się, wstawiać należy wewnątrz w buteleczkach z wodą i odnawiać, skoro tylko zaczną więdnąć. Nie należy też ruszać gąsienic, tylko od czasu do czasu spryskiwać je wodą, aby zastąpić wilgoć, którą w naturze otrzymują w postaci deszczu. Gdy nadchodzi czas przemiany na poczwarkę, gąsienice przestają się żywić i stają się niespokojne. Jedne przymocowują się wtedy do gałązek rośliny, którą się żywiły, drugie oplatają się przedziwem w jednym z kątów szafki, trzecie zagrzebują się w ziemi, aby w niej odbyć przemianę i t. p. Poczwarki, które dają się łatwo zdjąć, przenosi się do osobnego pudełka, inne zaś pozostawia się na miejscu. Jedne i drugie wszakże należy w pewnych odstępach czasu spryskiwać wodą, aby nie zaschły i nie wydały niedoskonałych motylów. Jeśli poczwarki mają przebyć zimę, to umieścić je należy w miejscu, gdzie

byłyby zabezpieczone od mrozów, lecz nie w ciepłym pokoju, w którym rozwój motyla zostałby zbyt znacznie przyspieszony. Skoro motyl wylęgnie się z poczwarki, cel nasz został osiągnięty; poznaliśmy jego rozwój i możemy go puścić na wolność.

Jeśli wszakże chcemy go przechować w swoich zbiorach, należy go zabić tak, aby mu nie przyczynić męczarni, ani też uszkodzić. Motyle dzienne zabijamy przez ostrożne ściskanie tułowia palcami; nocne — zapomocą pary chloroformu lub eteru. Zabitego motyla przebijamy szpilką przez środek



Fig. 306. Deseczka do rozpinania motyli.

tułowia, następnie umieszczamy go na sporządzonej do tego deseczce ze żłobkiem w środku i brzegami korkowymi, i rozpostarliśmy na nich skrzydełka, umacniamy je w tem położeniu za pomocą paseczków papierowych, przymocowanych szpilkami do korkowej powierzchni deszczułka (fig. 306). (Aby ułożyć skrzydełka zupełnie równo, dobrze jest nakreślić na deseczce linje poprzeczne równoległe). Po upływie 8 — 14 dni motyl może być zdjęty z deseczki i przeniesiony do oszklonego pudełka. Zaopatruje się go tu w karteczkę, na której wynotować należy nazwę, czas wylęgania i t. d. Zbiory należy ochraniać starannie od kurzu, wilgoci i robactwa.

Rząd IV. Dwuskrzydłe (Diptera).

230. Owady te mają tylko 1 parę błoniastych skrzydeł; w miejscu drugiej pary znajdują się małe maczugowate wyrostki, zw. *przezmiankami*, o które owady potracają skrzydła przy lataniu, wskutek czego brzęczą donośnie. Oczy mają wielkie; narząd pyszczkowy w kształcie trąbki do ssania, czasem opatrzone klującymi szczecinkami. Na rożkach

pazurki, a u niektórych poduszcзки, zw. *przylgami*, które przyczepiają się do gładkich przedmiotów. Przemianę odbywają zupełną.

Do tego rzędu należą:

Komar pospolity (*Culex pipiens*) (fig. 307), ciało ma wysmukłe, nogi długie, smoczek wydłużony, opatrzony szczecinką, którą przekłuwa naskórek i smoczkiem wysysa sok, przytem wpuszcza ostrą ciecz, sprawiającą bąble na skórze; rożki długie, puszyste. Samce żywią się sokami roślinnymi, samiczki krwią ludzką i zwierzęcą. Jaja składają w wodach stojących na pływające rośliny, liście i t. p. Liszki i poczwarki żyją w wodzie, pływając pod samą powierzchnią, tak, że tylko część ciała z oddechową rurką wystaje nad wodę. Beznogie gąsienice są bardzo tchórzliwe i uciekają szybko w głąb wody; żywią się mniejszymi stworzeniami wodnymi i są bardzo żarłoczne. Mała, krępa poczwarka, po kilku dniach zrzuca z siebie skórę i przekształca się w owad, który jeszcze przez pewien czas siedzi na wodzie w starej skorce poczwarki, jakby w łódce; potem wylatuje i wody unika, a samiczka tylko przed śmiercią powraca do wody, aby złożyć jajeczka.



Fig. 307. Komar pospolity.

Komary są bardzo dokuczliwe dla człowieka i zwierząt, a jeszcze bardziej nieznosne są komary w krajach gorących, np. **Moskity** w Ameryce, gdzie masami napadają, kłując niemiłosiernie, tak, że trudno się od nich obronić.




Fig. 308. Trąbka muchy domowej (silnie powiększona) A — smoczek, B — rożki.

231. Z rodziny **Much** najpospolitsze są:

Mucha domowa (*Musca domestica*) (fig. 308), znany każdemu ten owad dokuczliwy, żyje we wszystkich strefach ziemi; żywi się wszystkim, nawet padliną i gnijącymi ciałami, stąd przyczynia się do roznoszenia zarazków. Jaja składa w nawozie, w miejscach zanieczyszczonych, np. w spluwaczkach, i tam przebywają małe robakowate liszki, które po 24 godzinach zamieniają się w poczwarki baryłkowate, otoczone luźną skórą; po kilku dniach wylata z nich owad.

Mucha ma ogromne oczy, a na nóżkach przyłgi, co jej ułatwia chodzenie po gładkiej szybie.

Mucha plużąca (*Musca vomitiva*) (fig. 309), większa od poprzedniej, barwy połyskującej, ciemno - niebieskiej; brzęczy bardzo głośno; składa jaja na mięsie, gdzie żyją też białe robakowate jej liszki.



Fig. 309. Mucha plużąca; jej gąsienica i poczwarka.

Mucha złocista (*Musca caesar*), barwy zielonej ze złocistym połyskiem; **Bolimuszka**, dokuczająca bardzo bydłu w jesieni; podobna jest do muchy domowej.

W Afryce żyje **Mucha tsetse**, ukłucie której bywa zabójczym dla bydła.

232. Do rodziny much należą **Gzy**, bardzo dokuczliwe dla zwierząt domowych; z nich pospolitym jest **Giez bydlęcy** (fig. 310) barwy żółtawej i **Giez koński** (*Gastrophilus equi*), duża, długa mucha, barwy brunatno-żółtawej; składa jaja na skórze konia; tu wylęgają się gąsienice, które koń zlizuje, i w ten sposób dostają się do jego paszczy i żołądka, gdzie przyczepiają się do ścian haczykowatymi wyrostkami i sprawiają zwierzęciu przykry ból. Gdy wydostaną się na zewnątrz, przemieniają się w poczwarkę i owad.



Fig. 310. Giez bydlęcy.

Również niebezpiecznym dla owiec jest **Giez owczy** (fig. 311), który składa jajka w nozdrza owcy, a liszki dostają się czasem do mózgu, wskutek czego owce chorują. Ażeby się uchronić od tego nieproszonego gościa, owce posłyszawszy brzęczenie gza, uciekają z łbami pochylonemi.



Fig. 311. Giez owczy i jego liszka.

Bąk zwyczajny (*Tabanus bovinus*) (Tab. XII, fig. 2), ma długi smoczek; żywi się krwią bydła domowego, dokuczliwy, zwłaszcza w upały; pospolity jest wszędzie; lata przez całe lato; liszki jego żyją w ziemi na łąkach.

233. Do owadów dwuskrzydłych należą także **Pchły** (*Pulex*), które wprowadzie skrzydeł nie mają, lecz podobne są do

much z narządu pyszczkowego i sposobu rozwoju. Są to nieznosne pasorzyty ludzi i zwierząt, od których uwolnić się można tylko czystością; jajka składają w miejscach zakurzonych, np. w szparach podłogi, w śmieciach; tam też żyją beznogie robakowate gąsienice. Pchły (fig. 312) mają tylne nogi bardzo silnie rozwinięte, dlatego to mogą robić duże skoki.



Fig. 312. Pchła silnie powiększona).



Fig. 313. Czyk; obok ten sam w chwili składania jajek (silnie powiększony).

Na różnych gatunkach zwi-

erząt żyją pchły rozmaitej postaci i wielkości. W Afryce i Ameryce południowej, znajduje się maleńka pchła, zwana **Czyk** albo **Pik**; nakłuwa ona skórę i pod nią składa jajka, które tam rozwijają się i sprawiają niebezpieczne zapalenie.

Rząd V. Półpokrywe (Hemiptera).

234. Mają po dwie pary skrzydeł jednakowych lub niejednakowych, albo ich wcale nie mają. Organa ustne przystosowane do klucia i ssania. Przemiana niezupełna: t. j. lizska już podobna jest do rozwiniętego owadu i stopniowo wyrastają jej skrzydła.

235. Do tego rzędu należą **Pluskwy**, owady o spłaszczonem ciele, wydające wstrętną woń, wydzielaną przez oddzielne gruczoły.

Z rodziny tej pospolite są:

Pluskwa roślinna (*Tropicoris rufipes*) (Tab. XII, fig. 3), uskrzydłona, żyje na brzozech i rozmaitych krzewach.

Pluskwa zwyczajna (*Acanthia lectulavii*) (fig. 314), bezskrzydła, rozpowszechniona na całej kuli ziemskiej, jako dokuczliwy pasorzyt człowieka. Składa jaja w marcu, maju, lipcu i wrześniu, w szparach łóżek, pod tapetami, w kątach ścian i t. p.; przemiana trwa około 3-ch miesięcy. Są to bardzo wytrwałe stwo-



Fig. 314. Pluskwa pokojowa (powiększ.).

rzenia, mogą nawet przez dłuższy czas być się bez pożywienia.

Płoszyca pospolita (*Nepa cinerea*) (Tab. XII, fig. 4), często znajduje się na mulastem dnie stojących wód. Przednie nogi ma silne i może je składać, jak nożyce. Ukąszenie płoszycy jest dosyć bolesne. Żywi się innymi drobnymi mieszkańcami wód.



Fig. 315. Płoszyca.

Pluskolec (*Notonecta glauca*) (fig. 315), żyje w wodzie i jest bardzo pospolity. Nogi tylne ma wydłużone, opatrzone włoskami i używa ich jako wiosła; pluskolec pływa bardzo szybko, leżąc na wznak. Żywi się innymi owadami, a nawet wysysa krew drobnych rybek. Złapany, kłuje boleśnie. Jest barwy szaro-żółtej z czarną tarczą na grzbiecie.




Fig. 316. Nartnik błotny.

Nartnik błotny i stawowy (*Hydrometra paludom et locustris*) (fig. 316), barwy czarnej, ciało ma długie, cienkie, dwie pary nóg bardzo wydłużone; przypomina z wyglądu komara bez skrzydeł. Pospolity jest na wodach stojących, strumieniach, gdzie chodzi szybko po powierzchni wody. Żywi się innymi owadami.

ko po powierzchni wody.

236. Do rzędu półpokrywych należą również **Piewiki** (*Cicada*), owady o budowie krępej, uskrzydłone; odznaczają się tem, że samczyk wydaje głos, pocierając nogę o odwłok, na którym znajduje się napięta błonka. Żywią się sokami roślin, które nakłuwają. Zamieszkują przeważnie kraje ciepłe.




Fig. 317. Piewik mанныy i jego gąsienica.

Z nich najbardziej znany jest **Piewik mанныy** (fig. 317), żyjący na jesionie, który nakłuty, wydziela sok tężejący, używany w lecznictwie pod nazwą „manny.”

Latarnik surynamski (*Fulgora laternaria*) (Tab. XII, fig. 5)

znajduje się w Brazylii i w Chinach; nazwa jego pochodzi stąd, że podobno świeci w nocy.

Latarnik europejski (*Fulgora europea*), nieco większy, zielony, znajduje się w Europie południowej.

237. Szkodliwe dla roślin są rozmaite gatunki **Mszyc** (*Aphis*), (fig. 318) małe owady, których samce są uskrzydłone, samice bezskrzydłe; siedzą zwykle gromadnie na liściach i łodygach roślin, których sokami się żywią. Jedne są zielone, np. żyjące na róży, inne czarne, np. na bzie. Wydzielają z siebie słodką ciecz, którą zlizują inne owady, jak np. mrówki, i w tym celu łążą ciągle po łodygach, na których siedzą mszyce.



Fig. 318. Mszyce (powiększ.).

Również pospolita jest *Mszyc krwawa*, żyjąca na korze jabłoni.

Bardzo szkodliwym owadem, należącym do mszyc jest **Filoksera** (*Phylloxera rostratrix*) (fig. 319); składa jaja w korzonkach winorośli, sokami których żywią się gąsienice, jakoteż bezskrzydłe samiczki; wskutek tego cały krzew gnie. Filoksera jest to drobny owad barwy żółtawej lub brunatnej; pochodzi z Francji, skąd w roku 1863 z krzewami winnymi dostał się do innych krajów.




Fig. 319. Filoksera (znacznie powiększona).

Czerwce (*Coccus*) żyją na niektórych roślinach: *Czerwiec polski* (*C. polonicus*) służył niegdyś do fabrykacji farby pasowej i był u nas nawet hodowany.

Najważniejszym z czerwców jest **Czerwiec koszenila** (*C. caeti*) (fig. 320), którego używa się dotychczas do wyrobu czerwonej farby zw. *karminem*. Suszone owady sprzedają u nas pod nazwą koszenili. Ojczyzną jego jest Meksyk, gdzie go hodują na wielką skalę na kaktusach, których sokiem się żywi. Teraz hodowany jest w Hiszpanji i w innych ciepłych krajach. Owad ten



Fig. 320. Koszenila.

ma zaledwie 3 milim. długości, barwy jest czerwonej; samiczka bezskrzydła, tak, jak i u innych mszyc.



Fig. 321. Wesz głowowa i jej gnidy (powiększona).

Do półpokrywych należą także **Wszy** (*Pediculus*) (fig. 321), nieznosne pasorzyty, pospolite we włosach i na odzieży ludzi nieporządných. Białe ten, bezskrzydły owad, składa białe, gruszczykowatego kształtu jaja, zwane *gnidy*, u nasady włosów; po kilku dniach wylęgają się młode. Na innych zwierzętach ssących żyją różne gatunki wszy.

Rząd VI. Żyłkoskrzydłe czyli siatkoskrzydłe; (Neuroptera).

238. Mają po cztery jednakowe, błoniaste skrzydełka, siatkowato użyłkowane; narządy ustne zwykle gryzące; przemiana zupełna.

Mrówkolew (*Myrmeleon formicarius*) (fig. 322), podobny do ważki, barwy czarnej z żółtymi plamkami na grzbiecie. Zamieszkuje piaszczyste okolice; lata wieczorami. Liszka mrówkolewa ma ciało spłaszczone (*Tab. XII, fig. 6*), opatrzone trzema parami nóg; szczególnie duże, zakrzywione jak cęgi, któ-



Fig. 322. Mrówkolew.

remi chwyta mrówki.




Fig. 323. Lejek w piasku z owadem, który weń wpadł.

W tym celu wygrzebuje w piasku dołek lejcowaty (fig. 323), w głębi którego czatuje na spadające doń mrówki i inne owady: zasypuje je zaraz i wysysa; szczątki ciał mrówek wyrzucają larwy z dolka na zewnątrz. Przemianę odbywają w kokonie zrobionym z przedzwy swej i oblepiają go piaskiem.

Chróściki (*Phryganea*) (fig. 324), owady bardzo krótko żyjące, jak jętki, i w czasie życia nie przyjmujące pokarmu; nie mają nawet dobrze rozwiniętych narządów pyszczkowych.

Dzień spędzają ukryte pod kamieniem, o zmierzchu wylatują. Chróściki mają tylne skrzydła dłuższe od przednich i w spoczynku złożone wachlarzowato. Liszki ich żyją w wodzie i budują sobie domki rurkowate z liści, piasku, muszelek i t. d., w których siedzą i z nimi się poruszają. Przed nastąpieniem przemiany zalepiają otwory domku przedzą, wydzielaną z gruczołów przednich, tak, że woda nie może dopływać do wnętrza.



Fig. 324. Chróścik i jego gąsienica w pochewce.

Do żyłkoskrzydłych zaliczane są owady o przeobrażeniu niepełnym, to znaczy, że gąsienica podobna jest do doskonałego owadu, tylko brak jej skrzydeł i z niej wychodzi wprost owad. Z tych pospolite są:

Jętki (*Ephemera*) (fig. 325), mające na końcu ciała parę długich szczecinek i skrzydła delikatne, zielonawe. Jajka składają do wody; liszki rozwijają się przez parę lat; cały ten czas żyją w wodzie. W sierpniu ukazują się te owady w wielkiej masie. Jętki żyją zaledwie jeden dzień, podobnie jak chróściki. Używane bywają za nawóz i jako pokarm dla owadożernych ptaków.



Fig. 325. Jętka.

239. Ważki (*Libellula*), owady o dużej głowie na cienkiej szyi; odwłok ich długi, skrzydła równej długości, delikatne, pięknie ubarwione. Latają zwykle nad wodami, żywią się innymi owadami, które chwytają w locie. Jajka składają na wodne rośliny; gąsienice żyją w wodzie. Z kształtu ciała gąsienice podobne są do owadu doskonałego, tylko nie mają skrzydeł, a pod szczękami mają kleszczyki wysuwalne, t. zw. *maskę*, którą zakładają na głowę. Kleszczami temi gąsienice łapią drobne wodne zwierzątka, np. larwy innych owadów, kijanki, drobne rybki i t. p. (fig. 326). Są one żarłoczne i ciągle się uganiają za zdobyczą.



Fig. 326. Larwa ważki, chwytająca maską (a) gąsienicę jętki.

U nas pospolite są: **Ważka spłaszczona** (fig. 327), o ciele grubym, barwy żółtawo-

brunatnej; **Łątka wielka** (*Aeschna grandis*) (Tab. XII, fig. 10), wysmukła, o skrzydłach gęsto siatkowanych; **Pałatka wodna panna** (*Agriön virgo*), barwy niebieskawej, i kilka innych.



Fig. 327. Ważka spłaszczona.

240. **Termity** (*Termes*), owady barwy biało-żółtawej, zw. **białemi mrówkami** (fig. 328), pędzą życie towarzyskie, podobnie jak mrówki. Kolonje termitów składają się: z *samców skrzydlatych*, *samic bezskrzydłych* o dużym odwłoku, *robotników* i *żołnierzy* bezskrzydłych (Tab. XII, fig. 11) o wielkiej głowie i silnych szczękach. Tak jak w społeczeństwie mrówek, tak i tutaj robotnice muszą spełniać wszystkie roboty: zajmują się budową gniazd, dostarczaniem żywności dla całej kolonji, porządkiem; opiekują się jajami, młodem termitami i t. p. Żołnierze nic nie robią, tylko obchodzą gniazdo dookoła i towarzyszą robotnicom w ich wędrówkach po żywność; w razie niebezpieczeństwa stają do boju i gryzą swemi silnemi szczękami zawzięcie. Gdy spotykają się z czarnemi mrówkami, staczają z niemi walkę, w której najczęściej zwyciężają. Gniazda budują robotnice w postaci kopców (fig. 329), mają-




Fig. 328. Termity: samica, samiec, robotnik, wojownik.



Fig. 329. Gniazda termitów.

bia, tylko obchodzą gniazdo dookoła i towarzyszą robotnicom w ich wędrówkach po żywność; w razie niebezpieczeństwa stają do boju i gryzą swemi silnemi szczękami zawzięcie. Gdy spotykają się z czarnemi mrówkami, staczają z niemi walkę, w której najczęściej zwyciężają. Gniazda budują robotnice w postaci kopców (fig. 329), mają-

cych kilka metrów wysokości i kilkanaście obwodu. Kopce te lepią z gliny, piasku, spróchniałych części drzewa i śliny. Wewnątrz są izby obszerne dla samiczki, młodych termitów i zapasów żywności. Niekiedy budują gniazda na drzewach lub w pniach: wydrążają je i wewnątrz lepią mieszkanie przy pomocy śliny i nanoszonej gliny. Do budowy tych gniazd znoszą materiały z daleka podziemnymi chodnikami; materiałem tym jest wszystko, co napotkają na drodze, z wyjątkiem szkła, metali i kamieni. Napadają też gromadnie na sprzęty i budynki ludzkie i wydrążają ściany, pozostawiając tylko zewnętrzną warstwę, tak, że domy wyglądają jak nietknięte, a za dotknięciem rozpadają się. Przyjemną więc niespodziankę sprawiają termity mieszkańcom, którzy nie domyślali się nawet, że w mieszkaniu ich gospodarują nieproszeni goście. Tylko po szmerze w ścianach można poznać ich obecność. Straszne te szkodniki zamieszkują tylko ciepłe kraje: Afrykę, Azję południową i Amerykę zwrotnikową.

Rząd VII. Prostoskrzydłe (Orthoptera).

241. Skrzydła przednie mają skórzaste lub sztywne, tylne błoniaste, cienkie; narząd pyszczkowy gryzący; przemiana niezupełna. Do tego rzędu należą:

Szarańcza wędrowna (*Pachytis migratorius*) (Tab. XII, fig. 8), wielkości 5 cm., barwy zielonej w czarne kropki. Odznacza się silnymi tylnymi nogami, przysposobionymi do skakania. Samce mają na nogach szereg ząbków, które pocierają o pokrywy skrzydeł i w ten sposób wydają donośne ćwierkanie. Szarańcze, tak jak i ich gąsienice, żywią się pokarmem roślinnym. Pospolite są w Europie południowo-wschodniej, zwłaszcza w Rosji południowej i na Węgrzech. Stąd wędrują w dalsze okolice na zachód i w niezliczonych masach napadają pola, które w okamgnieniu zupełnie ogłaczają. Są tak żarłoczne, że gdzie przejdą, zostawiają straszne spustoszenia. Masa przelatującej szarańczy wygląda jak czarna chmura zasłaniająca słońce. Wieśniacy, ujrzawszy tych groźnych napastników, starają się je odstraszyć wszelkimi sposobami; zabijają je cepami, drągami, palą ognie, polewają gorącą wodą; niewiele to jednak pomaga. Zmniejszona nieco masa w taki krótkim czasie opustoszy pola ze zboża

i kukurydzy. W jesieni szarańcze składają jaja kupkami w ziemię i otaczają je ulepioną torebką; na wiosnę z jaj wyłazą gąsienice (fig. 330),



Fig. 330. Gąsienice szarańczy.

sprawiające równie wielkie szkody na polach. Gąsienica, zanim dojrzeje w owad doskonały, zmienia kilkakrotnie naskórek.

Inne gatunki szarańczy żyją w Afryce i Australji; wszystkie są równie szkodliwe.

Podobnym do szarańczy z kształtu i wielkości jest **Pasikonik zielony** (*Locusta viridissima*) (fig. 331), nieszkodliwy, gdyż żywi się przeważnie muchami i innymi owadami. Ćwierka, siedząc i pocierając jedną pokrywę skrzydeł o drugą.




Fig. 331. Pasikonik zielony.

Świerszcz polny (*Grillus campestris*) (fig. 332), barwy czarnej, pospolity jest wszędzie. Wykopuje sobie mieszkanie podziemne z otworem na zewnątrz, w którym samczyk przesiaduje, wydając głośne ćwierkanie, podobnie jak pasikonik. Niszczy on roślin-

ność, żywiąc się jej korzeniami.

Świerszcz domowy (*Grillus domesticus*), mniejszy od poprzedniego, barwy brunatnej; żyje w domach, w szparach ścian, wyszukując sobie ciepłe miejsca. Żywi się resztkami potraw, mącznymi zapasami spiżarni i t. p.



Fig. 332. Świerszcz polny.

Turkuć (*Gryllotalpa europea*) (Tab. XII, fig. 9) zw. **Podjadkiem**, dosięga 5 cm. długości, barwy czerwono-brunatnej, pokryty gęsto włoskami, odznacza się tem, że prze-

dnie jego nogi zbudowane są do kopania, jak u kreta. Turkuć żyje w ziemi, jak również gąsienice, żywi się korzonkami roślin, przez co czyni na polach wielkie szkody, niesłusznie przypisywane kretom; wiemy jednak, że właśnie jest

przeciwnie: krety, żywiąc się takimi szkodnikami, jak są turkucie, wyrządzają wielką przysługę gospodarzom. Turkuć zamieszkuje całą Europę, z wyjątkiem północy.

Niektóre z owadów, należących do tego rzędu, odznaczają się dziwnym kształtem ciała, przypominającym liście, gałązki i t. p.; np. **Modliszka kosmata** (*Mantis religiosa*) (Tab. XII, fig. 7), ciało ma spłaszczone, barwy zielonej, przednią część tułowia wydłużoną, tak, że tworzy jakby szyję, którą trzyma wzniesioną do góry; przytem przednią parę nóg ma tak ustawioną, jak ręce do modlitwy; stąd pochodzi jej nazwa. W takiej postawie czatuje na owady, któremi się żywi i chwytą je łapkami.

242. Do tego rzędu należy jeszcze kilka gatunków owadów, mających nogi równej długości, przystosowane do szybkiego biegania. Takim jest **Karaluch** zw. **Karaczanem** (*Blatta orientalis*) (fig. 333), ten niemiły mieszkaniec kuchni. Owad ten ma ciało płaskie, barwy brunatnej, lśniącej. Dzień spędza ukryty w szparach ścian i podłóg, w nocy wychodzi i wędruje wszędzie, gdzie tylko może znaleźć pożywienie, którem są resztki potraw i wszystko, co ugryźć zdoła. Jajka swoje otacza kokonem; przeobrażenie niezupełne. Karaluch pochodzi z Azji.



Fig. 333. Karaluch (zmniejsz.).

W krajach podzwrotnikowych żyje **Karaluch olbrzymi**, napastrujący nawet człowieka; bardzo szkodliwy.

Podobne jak karaluch życie pędzi **Prusak** zw. **Persak** albo **Francuz** (fig. 334) mniejszy i wysmuklejszy od poprzedniego, barwy żółto-brunatnej.



Fig. 334. Prusak.

Skorek (*Forficula auricularia*) (fig. 335), barwy ciemno-brunatnej; skrzydła ma krótkie; na końcu odwłoka długie kleszczyki, stąd niewłaściwie nazywany bywa „szczypawką.” Żywi się pokarmem roślinnym i zwierzęcym, szczególnie lubi



Fig. 335. Skorek.

słodkie owoce. Żyje w ukryciu pod kamieniami, korą, wogóle w miejscach wilgotnych. Jest bardzo bojaźliwy i przed człowiekiem szybko ucieka.

KLASA II. KROCIONOGI (*Miriapoda*)

243. Ciało ich walcowate, nie oddzielone na tułów i odwłok, składa się z szeregu pierścieni, z których prawie każdy zaopatrzony jest w jedną lub dwie pary nóg. Na głowie znajduje się para czułek i dwie lub trzy pary szczęk. Krocionogi żyją przeważnie w ukryciu, w miejscach ciemnych i wilgotnych; biegają bardzo szybko.

Krocionóg pospolity (*Jullus fallax*) (Tab. XII, fig. 15), spotyka się wszędzie; znajduje się pod kamieniami, mchem, opadłymi liśćmi; żywi się próchniejącymi częściami roślin. Dochodzi do 3 cm. długości; jest barwy brunatnej w żółte pręgi, z każdego pierścienia wychodzą po dwie pary nóg.

Krocionóg może się zwijać ślimakowato i w takim położeniu często go znaleźć można.

Również pospolitym jest **Drewniak** (fig. 336), żyjący także w mchu i pod kamieniami.

Niektóre gatunki krocionogów, zamieszkujące kraje ciepłe, mają gruczoły jadowe, z których wypuszczają jad przy ukąszeniu; są one i dla człowieka niebezpieczne. Do takich należą **Skolopendry** (fig. 337) dosiegające nawet 30 cm. długości, mające po jednej parze nóg u każ-



Fig. 336.
Drewniak.



Fig. 337.
Skolopendra.

deg pierścienia. Skolopendry żywią się owadami.

KLASA III. PAJĄKI (*Arachnoidea*).

244. Ciało pajaków złożone jest z dwóch części: z *głowy* zrosniętej z *tułowiem*, tworzącej *głowo-tułów* i z *odwłoka*. Ciało okryte skórzastą powłoką; nóg mają cztery pary, oczu 2—12, brak skrzydeł i czułków, tylko u głowo-tułowia znajdują się dwie pary szczęk i t. zw. warga. W pierwszej parze szczęk są gruczoły jadowe, skąd przy ukąszeniu sączy się jad, którym pajak zabija zdobycz. Rozmnażają się z jaj; młode pajęczki, zupełnie podobne do starych, nie ulegają przemianom, tylko rosną. Oddychają za pomocą dychawek.

245. **Pajaki właściwe** odznaczają się tem, że odwłok ich jednolity, niezłożony z pierścieni, ma kształt kulisty i z głowotułowiem połączony jest cienką szyją. Niektóre z pajaków właściwych posiadają w tyle na końcu odwłoka gruczołki, t. zw. *kądziołki przedne*, z których przędą nić krzepnącą, t. zw. *pajęczynę*. Z pajęczyny tej pajak tka za pomocą nóżek bardzo delikatną sieć, w niej sam przesiaduje, czatując na owady, któremi się żywi; zaplątany w siatkę owad otacza on pajęczyną, zabija jadem i wysysa. Z pajaków pospolitemi są:

Krzyżak (*Epeira diademata*), barwy szarawo - żółtej, na wierzchu ma jasne punkciki w postaci krzyża. Sieć swoją w kształcie kół połączonych promieniami (fig. 338) zawiesza pionowo pomiędzy drzewami, na płotach, ścianach, czasem w pobliżu wody. Na zdobycz czatuje, siedząc w samym środku sieci; niszczy wiele much i innych szkodliwych owadów, jest więc pożyteczny. W razie niebezpieczeństwa ucieka szybko na ziemię na wysnutej nici.




Fig. 338. Krzyżak.

Pajak domowy (*Tegenaria domestica*) (fig. 339), barwy



Fig. 339. Pajak domowy.

żółtej w ciemne cętki. Jest większy od krzyżaka, lecz wysmuklejszy; samiec jest o połowę mniejszy od samiczki. Sieć zawiesza poziomo w kątach mieszkań; w samym kącie robi sobie lejkowate zagłębienie, w którym siedzi na czatach.

snuje pod wodą i zawiesza pomiędzy roślinami sieć gęstą



Fig. 340. Topik.

Topik cz. **Srebrnik** (*Argyroseta*) (fig. 340), pospolity w naszych stawach; żywi się wyłącznie owadami wodnymi. Pajęczynę swą wypełnia sam powietrzem, zaczerpniętym na powierzchni wody. Wskutek tego bańka ma postać kuli srebrzystej; w niej topik zwykle przesiaduje, czasem pływa po wodzie, uganiając się za zdobyczą.

246. Niektóre gatunki pajaków nie tkają sieci, lecz żyją na drzewach, skąd spuszcza się na długiej nici i pajęczynę swą zarzucają w postaci pasem, które wiatr roznosi w ciepłe jesienne dni (*babie lato*).

Inne pająki, jak np. **Tarantula** (*Lycosa tarantula*) (fig. 341); żyją w norach, wykopanych w ziemi, które wyściełają pajęczyną; stąd rzucają się na nadchodzące owady. Z kryjówek tej można wyciągnąć tarantulę za pomocą sznurka z kulką wosku; w wosk zaczepia ona szczęki i nie może ich wydobyć. Tarantula żyje w Europie południowej i Afryce północnej. Ukąszenie jej jest jadowite, ale nie zabójcze.



Fig. 341. Tarantula.

Największym z pajaków jest **Ptasznik** (*Mygale avicularia*) (fig. 342), zamieszkuje gorące strefy Ameryki południowej, osiąga 4 cm. długości, z nogami — 20 cm., jest więc większym od myszy. Ciało

jego pokryte gęsto włoskami. Siedzi zwykle w dziuplach drzew, które wyścieła pajęczyną. W końcu tejsze znajduje się woreczek, w który samica składa jaja. Ptasznik żywi się większymi owadami, małymi ptaszkami, jaszczurkami, żabami i t. p. Napada je i natychmiast otacza pajęczyną, jak taśmą szeroką, zabija jadem, szarpie w kawałki i wysysa, pozostawiając szczątki. Ukąszenie ptasznika i dla człowieka jest niebezpieczne.



Fig. 342. Ptasznik.

247. Do klasy pajaków należy **Kosarz** (*Phalangium*) (fig. 343), podobny z kształtu do pajaka właściwego; ma bardzo długie, cienkie nogi, które się łatwo odłamują i drgają. Kosarz nie snuje zupełnie pajęczyny, gdyż nie ma kądziołek. Jest zupełnie nieszkodliwy; żywi się innymi pajakami i owadami. Siedzi zwykle na ścianach, płotach, murach i t. p.



Fig. 343. Kosarz.

248. **Niedźwiadki** cz. **Skorpjony** różnią się od pajaków właściwych tem, że odwłok ich złożony jest z pierścieni i pokryty skórzastym pancerzem; głowotułów mają krótki, szczęki, t. zw. *szczękorożki*, wydłużone i zakończone kleszczami. **Niedźwiadek europejski** (*Euscorpius europeus*) (Tab. XII, fig. 17) spotyka się w Europie południowej, pod kamieniami, w starych murach, czasem w mieszkaniach. Żywi się przeważnie owadami i pajakami. Odwłok kończy się ciekim pierścieniowatym ogonem, w którym znajduje się gruczołek jadowy, z uściskiem ostrem w końcu. Kolcem tym kłuje i zabija swoją ofiarę; ukłucie to u większych zwierząt i u człowieka sprawia zapalenie. Jad niektórych gatunków zwrotnikowych bywa śmiertelnym nawet dla człowieka.

Kleszczotek papierowy zw. **Zaleszczotkiem** (*Chelifer caneroides*) (Tab. XII, fig. 16), barwy żółto-brunatnej; dosięga zaledwie 3 cm. długości, nie ma kolca jadowego, lecz przy-

rządy przedne, tak jak pająki. Żyje w książkach, starych papierach, odzieniu, pod słomą w kurnikach i t. d. Niszczy mszyce, mole i inne pasorzyty, przez co jest pożyteczny.



Fig. 344. Świerzbowiec (silnie powiększony).

249. Do pajaków należą drobne pajęczki wielkości mikroskopijnej, zwane **Roztoczami** czyli **Molikami**, z których jedne żyją w wodzie, np. **Wodopójka czerwona**, inne jako pasorzyty ludzi i zwierząt, np. **Świerzbowiec** (*Sarcoptes scabiei*) (fig. 344), dochodzi 2—3 cm., głowotułów i odwłok zrosnięte w jedną całość, nogi opatrzone w szczecinki. Żyje w skórze ludzkiej, gdzie wygrzebuje sobie przewody; składa tam jajka, co sprawia bolesne swędzenie i chorobę, zw.

świerzbą. Na innych zwierzętach żyją różne gatunki świerzbowca; wszystkie są niebezpieczne.



Fig. 345. Nużeniec (silnie powiększ.).

Nużeniec (fig. 345), maleńki pasorzyt, żyje także w skórze ludzkiej i powoduje t. zw. wągry.



Fig. 346. Kleszcz (powiększony).

Kleszcze (*Ixodes*) (fig. 346) mają nogi opatrzone haczykami, którymi czepiają się skóry zwierząt i wysysają krew; odebrać ich nie można, bo pozostaje głowa w skórze i sprawia owrzodzenie; najlepiej jest posmarować skórę naftą, to kleszcze same wypadną.

Inne gatunki *roztoczy* żyją w mącznych pokarmach, w serze i t. p.

KLASA IV. SKORUPIAKI (*Crustacea*).

250. Ciało mają zwykle pokryte powłoką wapnistą, stanowiącą czasem twardy pancerz. Głowa zrosnięta z tułowiem tworzy *głowotułów*. Odwłok mniej lub więcej wydłużony, pierścieniowaty. Nóg mają kilka par lub kilkanaście, z których pierwsza przednia para przemieniona jest w narządy do żucia, t. zw. *żuwaczki*, druga i trzecia w szczęki, czwarta w kleszcze do chwytania zdobyczy; reszta do łążenia i pływania. Oddychają skrzelami, umieszczonemi przy nasadzie nóg u tułowia. Żyją tylko w wodzie.

Do nich należą:

251. **Rak rzeczny** (*Astacus fluviatilis*) (Tab. XII, fig. 14) barwy zielonawo-brunatnej, która po ugotowaniu raka staje się czerwoną. Ciało ma wydłużone, odwłok złożony z pięciu pierścieni, zakończony płetwami, co stanowi silny ogon pomocny przy pływaniu (zwany zwykle szyjką). U pierścieni odwłoka znajdują się nierozwinięte nogi w postaci wyrostków, których także zwierzę używa przy pływaniu. Na głowie są duże oczy, umieszczone na ruchomych słupkach i dwie pary rożków, z których jedne długie, zw. *wąsami*. Skórę i pancerz zmienia kilkakrotnie w miarę wzrostu, do czego służy nagromadzony w żołądku zapas wapna, w postaci kamyczków, t. zw. *oczu raczych*. Rak żyje w strumykach, rzekach, płynących kanałach i t. p., pod kamieniami lub w norach, które sobie robi u brzegu wody. Pływa szybko, naprzód i wstecz. Przez krótki czas może żyć bez wody, ale w miejscach wilgotnych. Żywi się padliną, mięczakami, ślimakami, rybkami, owadami i t. p.

Homar (fig. 347) żyjący w morzu Północnem i w oceanie Atlantyckim, podobny do raka rzecznego, tylko od niego znacznie większy, dochodzi do 60 cm. długości. Stanowi bardzo smaczną potrawę.

Garnele cz. **Krewetki**, niewielkie raczki, z wydłużonym odwłokiem, pokrytym miękkim pancerzem barwy oliwkowej

w różnobarwne cętki. Znajdują się w morzu Północnem, gdzie żyją na brzegach, zakopane w piasku. Poławiają je w znacznej ilości przy pomocy sieci, ciągnięjonej po dnie morskiem przez konia stąpającego brzegiem. Krewetki są jadane jako przysmak.



Fig. 347. Homar (zmniejszony).

252. **Krab wielobarwny** (*Grapsus varius*) (Tab. XII, fig. 12), odznacza się tak, jak i wszystkie *kraby*, odwłokiem krótkim podkurczonym, na dosyć wysokich nogach, i ma silne kleszcze. Pokryty jest twardym pancerzem barwy czerwonej z żółtą, brunatną i t. p. Znajduje się w morzu, pospolity jest u wybrzeży Europy północnej. Często pływa pod samą

powierzchnią; spłoszony, chowa się na dno. Żywi się ikrą rybą, krewetkami i t. p.

Pagur szeroki zw. **Kieszeńcem** (*Cancer pagurus*) (Tab. XII, fig. 13), podobny do poprzedniego, również pospolity jest w morzach europejskich, spotyka się wszakże na większych głębokościach niż poprzedni; jest jadalny. W Anglii poławiają go obficie.



Fig. 348. Biernatek pustelnik, chwytający rybę.

Zbliżonym do poprzednich jest **Biernatek pustelnik** (*Pa-gurus Bernhardus*) (fig. 348). Ma on pancerz tylko na przedniej części ciała, tylna jest naga, dlatego kryje ją biernatek w próżnej muszli ślimaków i z tem mieszkaniem porusza się, wysunawszy głowotułów. W razie niebezpieczeństwa wsuwa się w nią całkowicie. Ukryty w tej muszli, czatuje na rybki i mięczaki. Zamieszkuje ocean Atlantycki, morze Śródziemne i Niemieckie; mięso jego jest jadalne. Są to zwierzęta bardzo drapieżne i pożerają się często nawzajem. W akwariach można widzieć biernatka jak czatuje, wyczekując chwili, gdy jaki inny biernatek, uprzykrzywszy sobie jedną skorupę zmienia ją na inną. Wtedy rzuca się na niego i chwytając za miękki ogon rozrywa i pożera.

W kałużach i w wodach stojących żyją maleńkie, ledwo kilka milimetrów mające, skorupiaki, np. **Rozwielitki** (*Daphnia*) (fig. 349), służące rybom za pokarm.

253. Do skorupiaków należy także **Stonoga** cz. **Ośliczka murowa** (*Oniscus murarius*) (fig. 350); ma ciało jajowate, przypłaszczone, złożone z pierścieni, nie oddzielone na głowotułów i odwłok, rożki długie, siedm par nóg krótkich, uzbrojonych w ostre pazurki. Stonogi żyją w wilgotnych miejscach, pod kamieniami, w piwnicach; żywią się wszystkim, co napokają; są bardzo żarłoczne.

Do tej samej klasy zaliczane są niektóre zwierzęta, żyjące w morzu jako pasorzyty. Na innych skorupiakach, rybach i t. p., np. **Kaczenica** (*Lepas analifera*) (fig.

351) skorupiak dziwaczного kształtu; ciało ma pokryte dwoma fałdami skóry, z pomiędzy których wystaje 6 par nóg.



Fig. 349.
Rozwielitka.



Fig. 350.
Stonoga.



Fig. 351. Kaczenica.

Typ III. Robaki (*Vermes*).

254. Typ ten obejmuje zwierzęta bardzo rozmaite, tak co do kształtu, jak i budowy. Odznaczają się one brakiem nóg członkowanych. Zamiast tego niektóre mają brodawki lub szczecinki. Inne całkiem są ich pozbawione. Ciało u większej części składa się z pierścieni jednostajnych, wśród których wyróżnia się tylko głowa. Mięśnie pod skórą są tak ułożone, że mogą ciało kurczyć, wyprostowywać, zwijać się i t. p.; za pomocą tych ruchów posuwają się naprzód. Rozmnażają się z jaj. Niektóre, jak pijawka i dżdżownica, mają krew czerwoną; oddychają całą powierzchnią ciała przez skórę. Tu należą:

255. Dżdżownica zwyczajna zwana Glistą ziemną (*Lumbricus terrestris*) (fig. 352), ma ciało walcowate, długie, złożone z licznych, wyraźnych pierścieni, barwy cielisto-czerwonej; dochodzi do 20 cm. długości; po bokach ciała ma maleńkie szczecinki, niewidzialne gołym okiem; przy pomocy ich



Fig. 352. Dżdżownica.

i skurczania ciała, porusza się. Oczu nie ma, tylko w miejscach tych delikatne płaty skóry, wrażliwe na dotknięcie. Żyje w wilgotnej ziemi, gdzie wydrąży sobie nory; na powierzchnię wychodzi w nocy, albo po ciepłym deszczu; połyka różne szczątki roślinne, a przerobione wyrzuca na zewnątrz, co tworzy bardzo pożywną część ziemi, t. zw. próchnicę; krążąc ciągle pod ziemią, spulchnia ją. Dżdżownica jest więc bar-

dzo pożyteczna na polach i w ogrodach. Należy do gromady *pierścienic*.

Z tej samej grupy pospolitą jest **Pijawka lekarska** (*Hiruda medicinalis*) (fig. 353), której ciało złożone z licznych, mniej wyraźnych pierścieni, jest dołem spłaszczone, górą wypukłe, przy końcach mocno zwężone; szczecinek brak. Z obydwu końców znajdują się przysawki, z których tylna służy do przymocowywania się, przednią zaś, opatrzoną szczękami w kształcie trójkąta,



Fig. 353. Pijawka lekarska.



Fig. 354. Przednia przysawka pijawki lekarskiej ze szczękami.

(fig. 354), zwierzę przyczepia się do swej ofiary, nacina skórę i wysysa krew. Pijawki bywają używane w lecznictwie, gdy zachodzi potrzeba upuszczenia krwi choremu. Pijawki zamieszkują rzeki, stawy i bagna; żywią się owadami, krwią ryb i t.p.

Pijawka końska, pospolita także w wodach stojących, ma tępe szczęki; do celów leczniczych nie nadaje się.

W morzach żyje kilka gatunków pierścienic, np. **Rurkowiec**, przedstawiony na *Tab. XII, fig. 12* i inne, z bardzo licznymi kępkami szczecinek.

256. Niektóre z robaków żyją jako pasorzyty w ciele ludzi i zwierząt. Do takich należą:




Fig. 355. Glista ludzka.

Glista ludzka (*Ascaris lumbricoides*) (fig. 355), różni się od dżdżownicy głównie tem, że ciało ma obłe, nie złożone z pierścieni, cienkie, nagie, barwy białawej. Żyje w kiszkiach człowieka i niektórych zwierząt.

Trychina (*Trichina spiralis*) (fig. 356), jest cienka, widzialna tylko pod mikroskopem. Dorosła trychina dochodzi do $1\frac{1}{2}$ cm.;



Fig. 356. Trychiny w mięsie wieprza, (powiększ.).

znajduje się w mięsie wieprzowym, skręcona i otoczona błoną. W tym stanie dalej rosnąć nie może, ale skoro razem z mięsem dostanie się do żołądka człowieka lub innych zwierząt, rozwija się tam szybko i rozmnaża, a miliony tych stworzeń, przedziurawiając ściany żołądka i jelit, wędrują do mięśni, gdzie usadowiwszy się, powodują śmierć.

W krajach ciepłych znajduje się **Nitkowiec podskórny** (*Filaria medinensis*) (fig. 357), żyjący pod skórą ludzką i innych zwierząt, powoduje nabrzmienie i zapalenie. Młode nitkowce rozwijają się w ciele małych skorupiaków i stamtąd z pokarmem dostają się do ciała.




Fig. 357. Nitkowiec (b); młode nitkowce (c); przekrój poprzeczny (a).

257. **Tasiemiec** (*Taenia selium*) (Tab. XII, fig. 20), dosięga kilkunastu metrów długości; różni się tem, że ma ciało zupełnie płaskie, złożone z kilku tysięcy pierścieni spłaszczonych, jednostajnie zbudowanych; główka jej opatrzona jest przyssawkami lub haczykami (fig. 358 C), za pomocą których przyczepia się do ścianki jelita; całą powierzchnią zaś ciała wchłania przerobione soki swego „gospodarza,” t. j. zwierzęcia, w którego przewodzie pokarmowym żyje. Tasiemiec rozrasta się w ten sposób, że przy główce tworzą się ciągle nowe pierścienie, przez co starsze i największe zostają w tył odsuwane. Jaja rozwijają się w żołądku wołu; w mięśniach zaś tego zwierzęcia przechowuje się niedorośnięta forma tasiemca, jakby rodzaj poczwarki, zw. *wegrem* albo *bąblowcem* (fig. 356 B), który rozwija się w żołądku człowieka, dostawszy się tam z mięsem. Tu przeszedłszy do jelit, czepia się za pomocą przysawek i haczyków ścianki jelita i wyrasta w tę formę tasiemca, jaką widzimy na fig. 358 A i na Tab. XII, fig. 12, a — zmniejszony; b — kilka ogniw naturalnej wielkości.



Fig. 358. Tasiemiec (Sollner długogłowy) (A); są przejąć przez dwóch gospodarzy, z nim się rozwijają. (zmniejsz.).



Typ IV. Mięczaki (*Mollusca*).

258. Zwierzęta tu należące rzadko mieszą członki zewnętrzne. Ciało ich okryte jest zwykle utworem skórnym, t. zw. *plaszczem*, który bardzo często wydziela wapienną skorupę czyli *muszlę*. Pod względem organizacji wewnętrznej: organów trawienia, krążenia krwi, oddychania, układu nerwowego i narządów zmysłów, stoją one wyżej od owadów, zbliżając się bardziej do kręgowców. Oddychają przeważnie skrzelami, niektóre płucami. Rozmnażają się z jaj. Do tego typu należy kilkanaście tysięcy gatunków, które tworzą kilka klas.

259. Do klasy I-ej **głownogich** (*Cephalopoda*) należą mięczaki, mające ciało złożone z dwóch wyraźnych części: z tułowia i głowy, opatrzonej parą dużych oczu i licznymi chwytными ramionami, służącymi zwierzęciu jako nogi. Najpospolitsze z tej klasy są:

Żeglarek (*Argonauta argo*) (Tab. XII, fig. 21); ma on 8 długich nóg, zaopatrzonych w liczne przysawki. Muszla, w której zwierzę mieści się luźnie, ma wielkość do 20 cm. i perłowy połysk. Żyje w głębi morza Śródziemnego. Pływanie po powierzchni wody, mając dwa ramiona podniesione.

Mątwa (*Sepia officinalis*) (Tab. XII, fig. 22); znajduje się w morzach europejskich; żywi się rybami i rakami, na które czatuje w pobliżu brzegów. Skoro ją prześladuje nieprzyjaciel, ratuje się tem, iż z osobnego gruczołu wypuszcza ciecz brunatną, która zamąca wodę, pozwalając mątwie ukryć się między kamienie dna morskiego. Cieczy tej używają do przygotowania farby (*sepii*); mięso mątwy jest jadalne; znajdującą się pod skórą wapienną skorupą znana jest pod nazwą „kości sepii” (*Os sepiae*).



Fig. 359. Ośmiornica,
(znacznie zmniejszona).

Z głowonogów **Ośmionogi** (*Octopus*), mające ośm długich ramion, dosięgają znacznej wielkości; niekiedy bywają niebezpieczne dla człowieka, którego łatwo udusić mogą temi długimi i wijącemi się jak węże ramionami, zaopatrzonemi w niezliczone przysawki. Z tych **Ośmiornica** (fig. 359) zamieszkuje morze Śródziemne.

260. Do drugiej klasy, t. zw. **brzuchopełzów** (*Gastropoda*), należą **Ślimaki**, t. j. mięczaki pełzające, nieopatrzone nogami, o ciele mniej lub więcej wydłużonem, pokrytem zwykle skorupką skręconą, którą wydzielają gruczoły płaszcza (skóry). Część ślimaka, wystająca ze skorupy, nazywa się *nogą* albo *stopą*, w niej mieszczą się wszystkie wewnętrzne organa, jak: serce, żołądek i t. p. Na głowie znajdują się dwie pary rożków, w każdym z nich mieści się po jednym wysuwalnem oku; dalej paszcza, w której jest język i blaszka ostra, t. zw. *tarka*, do miażdżenia pokarmów. Ślimaki oddychają płucami albo skrzelami; rozmnażają się z jaj. Żyją w wodzie lub na lądzie. Żywią się przeważnie pokarmem roślinnym.

261. Ze *ślimaków* najbardziej pospolitym jest **Ślimak ogrodowy** (*Helix pomatia*) (Tab. XIII, fig. 1), spotykany wszędzie, zwłaszcza na wapnistym gruncie. W dzień słoneczny wypęła na drzewa i objada liście. Jest bardzo żarłoczny, a przez to szkodliwy. Skorupka jego szara jest śrubowato skręcona; łazi, wyciągnawszy się całkowicie i kręcąc skorupką na grzbiecie; podrażniony, chowa się w nią natychmiast. Ku jesieni zakleja otwór swego domku wapnistą zasklepką cz. wieczkiem, którą wydziela z podobnych gruczołków, jak skorupkę; tak zamknięty zimuje. Dochodzi do kilku centymetrów długości. Bywa jadany jako przysmak.

Ślimak maskowiec (*Triodopsis personata*) (Tab. XIII, fig. 2), znajduje się w lasach pod próchniejącem drzewem i w trawie; przeważnie spotyka się w krajach górzystych,

Blotniak stawowy (*Limnaea stagnalis*) (Tab. XIII, fig. 3) ma skorupę barwy żółtawej: jest bardzo pospolity w wodach stojących; trzymają go i w akwariach.

Żyworodka pospolita (*Paludina vivipara*) (Tab. XIII, fig. 4), rodzi żywe młode, które mają już małe skorupki na sobie; znajduje się w wodach stojących; dobrze się nadaje do hodowli w akwarjum.

Na Tab. XIII, fig. 5 widzimy muszlę **Skrzydłaka** (*Strombus*), jednego z największych ślimaków morskich.

Stożek marmurowy (*Conus marmoreus*) (Tab. XIII fig. 6) pospolity w morzach zwrotnikowych, odznacza się skorupą pięknie ubarwioną.

Stożek różowy (Tab. XIII, fig. 7), ma muszlę różową, z małym otworem. Stożki żywią się pokarmem mięsnym.

Mitra biskupia (*Mitra episcopalis*) (Tab. XIII, fig. 8) żyje w morzach u wybrzeży Indji wschodnich.

Rozkolec drobny (*Murex tenissima*) (Tab. XIII, fig. 9) spotyka się również w morzach okalających Indje; odznacza się muszlą wydłużoną z licznymi kolcami; żywi się innymi mięczakami.

Schodówka cenna (*Scalaria pretiosa*) (Tab. XIII, fig. 10) pospolita jest w morzach okalających Indje. Przywożą ją z Cejlonu. Muszle jej przed kilkudziesięciu laty ceniono tak wysoko, że płacono po parę tysięcy franków za ładne okazy. Dosięga 50 cm. długości.

Nieco podobna do niej, lecz mniejsza (35 cm.) jest **Schodówka pospolita** (*Scalaria communis*), znajdująca się w morzu Śródziemnem.

Janityna krucha (*Janthina fragilis*) (Tab. XIII, fig. 11), żyje w oceanie Atlantyckim i w morzu Śródziemnem. Na nodze ma pęcherz, do którego wydziela kleistą substancję i w nią składa jaja.

Śluchotka brodawkowata (*Haliotis tuberculata*) (Tab. XIII, fig. 12), ma bardzo ładną muszlę, wewnątrz z połyskiem konchy perłowej, na zewnątrz okrytą brodawkami, z szeregiem otworków wzdłuż brzegu. Znajduje się na wybrzeżach Hiszpanji i Portugalji.

Zajaczek morski (*Aplysia depitans*) (Tab. XIII, fig. 13), ma bardzo niewielką tylko muszlę na grzbiecie; pełza jak ślimak po skałach morza Śródziemnego; wydziela sok purpurowy, bardzo ostry, powodujący zapalenie skóry. Jest jadowity i w starożytności używano go do sporządzania napojów trujących.

262. Niektóre ślimaki nie mają skorupy tylko na grzbiecie małe stwardnienie. Do takich *nagich ślimaków* należy **Podrożec** (*Arion empiricorum*) (fig. 360), barwy czarnej; żyje w leśnistych i górzystych okolicach, gdzie po deszczu wypęza zwykle na ścieżki leśne. Podobnym do tego jest **Pomrowca** czyli **Slinik**, również nagi, barwy szarej.



Fig. 360. Podrożec.

263. Trzecia klasa **Małże** (*Lamellibranchiata*), obejmuje mięczaki o budowie podobnej do ślimaków, z tą głównie różnicą, że mają skorupę złożoną z dwóch części, czyli *muszli*. Skorupy te, połączone z sobą więzami i mięśniami, t. zw. *zamkiem*, zwierzę może dowolnie otwierać i zamykać, wysuwając nogę, przy pomocy której pełza, skacze i pływa. Małże oddychają skrzelami, rozmnażają się z jaj. Organ wzroku, słuchu i dotyku mają na brzegach *plaszczu*. Niektóre małże mają na nodze *gruczoł bisiorowy*, który wydzielają nico, t. zw. *bisior*, służący zwierzęciu do przyczepiania się.



Fig. 361. Skorupa omułka rzeczno.

Do *małżów* należą:

Omułek rzeczny (fig. 361), długi na 2—4 cm., żółtawy z fioletowymi pręgami; znajduje się w rzekach, gdzie przyczepia się do kamieni za pomocą bisioru.

Omułek jadalny (*Mytilus edulis*), (Tab. XIII, fig. 16), znajdujący się we wszystkich prawie morzach europejskich. Jedzą go gotowanego, smażonego i marynowanego. Ma smak przyjemny, przypominający mięso raka.




Fig. 362. Skójka perłorodna.

Skójka malarska (*Unio pictorum*) należy do najpospolitszych małżów w rzekach i stawach.

Również rozpowszechniona jest **Skójka perłorodna** (*Unio s. Maja margaritifera*) (fig. 362), o ładnej konsze, połyskującej wewnątrz świetnymi barwami, znana ogólnie pod nazwą *konchy perłowej*.

264. **Szczeżuja** (*Anodonta*) dochodzi do 20 cm. długości; skorupę ma cienką, kształtu jajowatego, barwy oliwkowej, brunatnej i t. p. Żyje przeważnie w wodach o dnie mulastem.

Skałotocz palczak (*Pholas dactylus*) (Tab. XIII, fig. 14), żyje we wszystkich morzach europejskich; świdruje otwory w drzewie i w skałach i tam przesiaduje. Podobne życie pędzi **Świdrak okrętowy** (*Toredo navalis*).

Odgiętek zw. **Śniednikiem** (*Tellina radiata*) (Tab. XIII, fig. 15), znajduje się w oceanie Atlantyckim, zagrzebany w piasku morskim; podczas odpływu wygrzebuje go i używają na pokarm.

Grzebień wielki (*Pecten maximus*) (Tab. XIII, fig. 17), znajduje się w morzach europejskich i jest jadalny; dosięga znacznej wielkości.

265. **Ostryga jadalna** (*Ostrea edulis*) (fig. 363) dochodzi do 12 cm., barwy z wierzchu szarej, wewnątrz biała jak porcelana; znajduje się we wszystkich morzach europejskich i w strefie gorącej, gdzie żyje przyczepiona zwykle do skał i korzeni na dnie morskiem. Ostrygi są bardzo cenione przez smakoszków. We Francji i Anglii w nadbrzeżnych miastach hodowane są ostrygi sztucznie w t. zw. *parkach*. Są to zbiorniki, do których doprowadzają wodę z morza; za pożywienie służą im wymoczki i t. p. Ostrygi sztucznie hodowane są jeszcze bardziej cenione.

Nadmienić tu należy jeszcze o **Perłopławce prawdziwej** (*Meleagrina margaritifera*) (fig. 364), dającej *perły prawdziwe*, które powstają jako wytwór chorobliwy wtedy, gdy pod skorupę dostanie się jakieś obce ciało, np. piasek; wtedy małż wydziela substancję krzepnącą i przybierającą zwykle kształt kulisty. Zamieszkuje morza strefy gorącej.



Fig. 363. Ostryga.




Fig. 364. Perłopławka.

Typ V. Szkarłupnie (*Echinodermata*).

266. Mają budowę promienistą, t. j. ciało ich nie daje się podzielić na dwie połowy, lecz na kilka równych części w kierunku promieni. Są to mieszkańcy mórz. Organizacja wewnętrzna doskonała. Ze skóry wydzielają wapnistą substancję, która tworzy na powierzchni oddzielne mikroskopowej wielkości ciała różnych kształtów, albo stanowi skorupę całkowitą, opatrzoną nieraz licznymi kolcami. Rozmnażają się z jaj. Młode są zupełnie do dorosłych niepodobne.

Do typu *szkarłupni* należą 4 klasy: pierwszą stanowią



Fig. 365. Jeżowiec pospolity.

Jeżowce, przedstawicielem których może być **Jeżowiec pospolity** (*Echinus esculentus*) (fig. 365). Ma on ciało kuliste, jak jabłko, okryte pancerzem, złożonym z 20-tu rzędów blaszek spojonych z sobą, barwy ceglasto - czerwonej. Blaszkę te opatrzone są ruchome kolce barwy białawej, które pomagają przy chwytaniu zdobyczy.

Pomiędzy kolcami są otworki, przez które jeżowiec wyciąga maleńkie nóżki z przysawkami i przy pomocy nich zwierzę pełza po dnie. Otwór gębowy znajduje się na spodniej stronie. Jeżowiec pospolity zamieszkuje morza europejskie, zwłaszcza południowe. Żywi się roślinami i drobnymi zwierzątkami.

Jeż morski (*Heterocentrotus mamillatus*) (Tab. XIII, fig. 18), różni się tem od poprzedniego, że ma kolce długie i szerokie, barwy brunatnej z białą. Żyje w oceanie Indyjskim i w morzu Czerwonym, skąd przez kanał Suezki wędruje do morza Śródziemnego.

Jeżowce znajdowały się dawniej w morzach w wielkiej ilości; w skałach, wytworzonych przez morza, np. w skałach kredowych, znajdują się liczne jeżowce skamieniałe.

267. Drugą klasę *szkarłupni* stanowią **Rozgwiazdy** (*Asterias*), mające ciało spłaszczone, podobne do gwiazdy, złożone z 5 lub 10 promieni, pokryte skorupą, na której są liczne kolce i kurczliwe nóżki. Nóżki te połączone są w zwierzęciu z kanalikami, do których dopływa woda; przy pomocy jej, nóżki kurczą się lub prostują, a wskutek tych ruchów zwierzę może pełzać. Rozgwiazdy żywią się ślimakami i innymi mięczakami.

Z rozgwiazd pospolitą jest **Gwiazda morska** czyli **Rozgwiazda czerwona** (fig. 366), znajdująca się w morzu Północnem.

Do tej klasy należą także **Wężowce** cz. **Wężowidła** (*Ophiura*) (Tab. XIII, fig. 19), różniące się od właściwych gwiazd morskich tem, że mają bardzo cienkie, długie i giętke ramiona.

268. Trzecią klasę stanowią **Liljowce** (*Cricoideae*), nazywane tak z powodu podobieństwa do kwiatów; żyją w głębi oceanów, np. **Lilja morska** (*Pentacrinus*) (fig. 367).



Fig. 366. Gwiazda morska.



Fig. 367. Lilja morska.




Fig. 368. Strzykwa.

269. Czwartą klasę stanowią **Strzykwy** (*Holoturiae*) (fig. 368) o ciele robakowato-wydłużonem; otwór gębowy mają na końcu ciała, otoczony wieńcem czułków, służących do chwytania zdobyczy; ciało pokryte nóżkami i wapnistymi blaszkami. Zamieszkują morza podzwrotnikowe; trzymają się bliskości brzegów, gdzie w mule szukają pożywienia. W Chinach używają strzykwy jako przysmaku.

Typ VI. Jamochłonne (*Coelenterata*).

270. Są to zwierzęta o bardzo niskiej organizacji; każde zwierzątko ma postać podobną do szklanki: zagłębienie wewnątrz ciała stanowi zarazem narząd trawienia, do którego zwierzę napędza rozmaite drobne istoty za pomocą chwytników, otaczających ten otwór. Z jamy tej pokarm przetrawiony rozchodzi się kanalikami po całym ciele i odżywia zwierzę. Żyją zwykle kolonjami, tworząc jedną zbitą masę, przyczem kanały rozprowadzające pożywienie są wspólne. Niektóre wydzielają wapnistą substancję, z której tworzą wspólne podłoże dla całej kolonji (koral).



Fig. 369. Meduza.

Rozróżniamy tu cztery klasy: **Polipy**, **Meduzy**, **Żywłogi** i **Gąbki**.

Meduzy są to formy swobodnie pływające po morzu, galaretowate, opatrzone zwykle ramionami chwytными.

Do polipów należą **Korale**; są to małe żyjątka (fig. 371), które wydzielają rogową lub wapnistą substancję, t. zw. *koralowinę*, białą lub czerwono zabarwioną, pokrytą miękką powłoką, w której żyją, wystając częścią na zewnątrz. Na koralowinie te polipy ciągle rozmnażają się, tworząc jakby pączki, które rosną i wytwarzają coraz nowe rozgałęzienia, podczas gdy w dolnej części koralowiny zamierają. W ten sposób powstają jakby ogromne krzewy, dołem coraz grubsze i coraz więcej rozgałęzione. Gdy budowa takiego polipnika dojdzie do powierzchni wody, polipy przestają budować ku górze, rozszerzając koralowinę pod spodem. Z niej powstają rafy podwodne, nader niebezpieczne dla żeglugi, — a gdy na nie morze i wiatr naniosą muł, muszelki, piasek, a wreszcie nasiona roślin, tworzy się

wkrótce jakby wał porosły roślinami, w środku którego znajduje się woda. Tego rodzaju wyspy koralowe noszą nazwę *atolów* (fig. 370). Korale zamieszkują morze Śródziemne i inne morza podzwrotnikowe.




Fig. 370. Atol.

Z koralu przedstawione są na *Tab. XIII, fig. 22*: koralowina **Koralowca czerwonego** (*Corallium nobile rubrum*) (fig. 371), którego gałązki czerwone używane są na rozmaite wyroby, paciorki, zw. koralami prawdziwymi i t. p.; na



Fig. 371. Korał czerwony z wystającymi polipami.



Fig. 372. Polip koralowy.



Fig. 373. Ukwiął.

fig. 21 Kwiatowiec (*Madraepora*) cz. **korał biały**; na *fig. 23 Piórówka czerwona* (*Pomatula rubra*).

Do rzędu polipów należą **Ukwiały** (*Actinia*) (fig. 373),

żyjątka podobne do koralu, żyjące pojedynczo i nie tworzące wspólnych polipników; dochodzą one do dość wielkich rozmiarów i przytwierdzone są zwykle do dna morskiego, albo żyją na muszlach mięczaków i na muszli raka *biernatka*. Ukwiły mają postać woreczków, z których wychodzą liczne chwytaki, są prześlicznie ubarwione i wyglądają w morzu, jak kwiaty różnokolorowe.



Fig. 374. Życie na dnie morskiem: u góry widać pływającego rekina i młota, niżej meduzę, mątwę, ośmiornicę: jedną pływającą, drugą leżącą na dnie; na lewo rybojeź, niżej gąbka, pławikonik, koral, rozgwieżdża; na samem dnie: gąbki, kraby, perłopław; na prawo jeżowce i koral; całe dno pokryte wodorostami morskiemi, morszczyznami, listownicami i t. p.

W wodach słodkich znajduje się należąca również do polipów **Stułbia zielona** (*Hydra viridis*) (Tab. XIII, fig. 24), przyczepiona czasem do rzęsy wodnej. Ma delikatne, nitkowate ciało, w górze rozgałęziające się, barwy zielonawej. Żywi się drobnymi żyłkami, które zabija ciałkami parzącymi, ukrytymi w skórze. Rozmnaża się za pomocą jajeczek, albo przez pączkowanie, wskutek czego każda ucięta część hydry może odrosnąć. Stąd powstało przysłowie; „kto łeb urwie hydrze, ten zdusi centaury.”

271. **Gąbki** (fig. 375), są to także małe miękkie zwierzątka, które wydzielają z siebie substancję gąbczastą, wapnistą, krzemienistą lub rogową, co stanowi niejako ich szkielet. Przez otwory gąbki woda wchodzi do wnętrza i pozostawia części pożywne. Gąbka, której używamy do mycia, jest to właśnie taki rogowy szkielet gromady gąbek. Gąbki zamieszkują przeważnie dna morskie, skąd wyławiają je nurkowie, albo wydobywają przy pomocy długich tyk z grabiami żelaznymi. Najwięcej cenione gąbki pochodzą z morza Śródziemnego. W wodach słodkich znajdują się też gąbki, ale nie dochodzące wielkich rozmiarów.




Fig. 375. Gąbka.

Żywłogi obejmują liczne gatunki, żyjące gromadami, a tak ułożone, że tworzą jakby jedną istotę dziwacznie rozgałęzioną, np. *Physophora hydrostatica* (Tab. XIII, fig. 20), znajdująca się w oceanie Atlantyckim i w morzu Śródziemnym. Jest to właściwie masa zwierzątek, stanowiąca jedną kolonię, w której każde, jakby członek tego ciała, pełni inną czynność i stosownie do tego jest przeobrażone. U góry tej kolonii jedna część jest woreczkiem z powietrzem; dalej idzie szereg zwierzątek przekształconych na pęcherze pławne, inne pełnią czynność żołądków, inne chwytników, inne służące do rozmnażania i t. p.

Typ VII. Pierwotniaki (*Protozoa*).

272. Są to istoty bardzo drobne, których zwykle gołym okiem dostrzedz nie można. Całe ciało ich składa się z mniej lub więcej jednostajnej masy śluzowatej czyli protoplazmy, która w pewnych miejscach przybiera kształt rzęśców lub długich nóżek i otoczona jest na zewnątrz błoną,



Fig. 376. Gregaryny.

lub wydzielonym przez nią pancerzem z rogu, albo muszelką wapienną. Żyją przeważnie w wodach stojących, zwłaszcza zawierających rośliny gnijące. Poruszają się wskutek skurczania się i wydłużania całego ciała. Niektóre żyją przytwierdzone do roślin, albo pasorzytują na innych zwierzętach, np. **Gregaryny** (fig. 376), powodując różne choroby. Żywią się drobnymi roślinami, napotkanymi na drodze, które otaczają swym ciałem i pochłaniają. Rozmnażają się w bardzo prosty sposób,

t. j. każde żyjątko dzieli się na dwie




Fig. 377. Ameba i jej podział.

rośnie oddzielnie, przyjmując pewien właściwy kształt, ta dzieli się znowu i t. d. Najprostszą postacią tego typu jest **Ameba** (fig. 377), widzialna tylko pod mikroskopem; ciało jej stanowi masa śluzowata, która może dowolnie zmieniać kształt i poruszać się.

273. Typ pierwotniaków dzielią na trzy klasy:

Pierwsza: **Wymoczki**, maleńkie żyjątka, widzialne tylko pod

szkłem powiększającym, otoczone zazwyczaj rzęskami, przy pomocy których poruszają się szybko i chwytają zdobycz. Żyją głównie w miejscach, gdzie są rośliny gnijące, tworząc na nich śliską białawą powłokę, a czasami na zwierzętach. Wymoczki mają kształt bardzo rozmaity, tak np. **Wirczyki** (*Vorticella*) (Tab. XIII, fig. 26 i 27, powiększona), mają ciało wydłużone dołem w nóżkę, którą przytwierdzają się, górą zaś w postaci kubeczka z rzęskami, którymi ciągle poruszają. Żyją gromadkami po kilka lub kilkanaście.




Fig. 378. Radiolaria (znacznie powiększona).

Drugą i trzecią klasę stanowią **Korzenionózki** (*Rhizopoda*), np. **Radiolaria** (*Stonecznica*) (fig. 378) i **Otwornice** (*Foramniifera*), również małeńkie istotki, pokryte wapnistą skorupką; żyją w morzu w wielkiej ilości; tu zamierając, padały na dno i z czasem utworzyły znaczne pokłady. Są to t. zw. pokłady kredowe, tak wielkie, że jako skały wysunęły się na powierzchnię morza. Na załączonym rysunku (fig. 379) widzimy, że kawałek kredy składa się wyłącznie ze skorupek i muszelek takich przedwiecznych zwierząt.



Fig. 379. Kawałeczek kredy, widziany pod mikroskopem.

Na pierwotniakach kończymy opis zwierząt, są to bowiem najniższe istoty zwierzęce. W następnym rozdziale przejdziemy do opisu *królestwa roślinnego*.

KRÓLESTWO ROŚLINNE.

274. Królestwo roślinne, zarówno jak i zwierzęce dzieli się na szereg odrębnych *typów* czyli *gromad*.

Przedewszystkiem rozróżniamy dwa wielkie *działy*: **rośliny kwiatowe i bezkwiatowe**.

Do pierwszego należą rośliny, mające kwiaty i owoce i rozmnażające się za pomocą *nasion*; mają one najwyższą organizację.

Rośliny *bezkwiatowe* nie mają kwiatów, owoców, nasion; rozmnażają się za pomocą t. zw. *zarodników*, które tworzą się w osobnych organach, zwanych *zarodnikami*. Za przykład takich zarodników służyć mogą zarodniki widłaków, proszek, znany powszechnie pod nazwą *likopodium*, lub proszek, wysypujący się, gdy pęka purchawka (rodzaj grzyba).

Wśród bezkwiatowych wyróżniamy rośliny **plechowe i naczyniowe**.

Do plechowych zaliczamy takie, które nie mają prawdziwych korzeni, ani łodygi, ani liści, lecz wyglądają jako mniej więcej bezkształtne masy. Za przykład ich mogą służyć *porosty*, rosnące na pniach drzew, kamieniach, parkanach, *grzyby* i t. d. Pośrednie stanowisko zajmują *mchy*; chociaż niektóre z nich mają łodygę i liście, lecz budowa ich wewnętrzna różni się od prawdziwych roślin naczyniowych.

Rośliny naczyniowe mają w korzeniach, łodygach i liściach *naczynia*, po których płynie woda z korzeni do liści. Wszystkie rośliny kwiatowe mają owe rureczki, należą więc do naczyniowych.

275. W królestwie roślinnem rozróżniamy następujące typy:

1. **Wodorosty:** są to przeważnie zielone, drobne bardzo roślinki, pokrywające często powierzchnię wód stojących zielonemi, zbitymi darninkami, które przy bliższem rozpatrzeniu okazują się złożonymi z cieniuchnych poplątanych z sobą nitek;




Fig. 380. Gałęzatką.

Fig. 381. Trzęsido.

Wodorosty wód stojących (powiększone).

Fig. 382. Wodorosty morskie (zmniejsz.).

rosną one także na wilgotnej ziemi, na korze drzew i t. d., większe zaś rosną w morzu (np. morskizyny) (fig. 382).

2. **Grzyby:** są to powszechnie znane rośliny, pozbawione




Fig. 383. Pieczarki.

Fig. 384. Pleśń.

zieleni, spotykane w lasach i t. p., w postaci trzona z kapeluszem (fig. 383); nierównie wszakże liczniejsze ich gatunki należą do istot mikroskopowych i składają się jedynie z drobnych włókienek bezbarwnych. Należą tu: pleśnie (fig. 384), drożdże, sporysz, śnieć, rdza i inne, sprawiające choroby roślin, a niekiedy zwierząt i ludzi.

3. **Porosty:** są to płaskie lub rozgałęzione twory, szare, żółtawe lub zielonawe (np. *Tarczownica*, fig. 385 i *Chrobotek*, fig. 386), okrywające korę drzew, parkany, kamienie lub ziemię (w gęstych lasach), często tak mało podobne do roślin, że gotowi jesteśmy wziąć je za plamy na kamieniu lub korze.




Fig. 385. Tarczownica (porost).

4. **Mchy.** Tu należą roślinki zielone, rosnące zwykle na wilgotnej ziemi lub na korze drzew (z północnej strony). Jedne z nich (**Wątrobowce**) mają postać bezkształtnych plech, lub też zaledwie ukształtowane mają liście. Na plesze wyrastają na nóżce organy rozmnażania. Za przykład ich



Fig. 386. Chrobotek (porost). |



Fig. 387. Porostnica: a—plecha z organami rozmnażania, b—tenże organ powiększony.



Fig. 388. Mech liściasty; B—puszka.

może służyć *Porostnica* (fig. 387), rosnąca w cienistych i wilgotnych miejscach.

Inne **Mchy liściaste** czyli **właściwe** (fig. 388) są ładnie ukształtowane; mają łodygę i liście podobne do roślin wyższych, zielonej barwy. W pewnym okresie wzrostu znajdujemy na szczycie ich łodyżek osobliwe utwory w kształcie *puszek*, umieszczonych na długich nóżkach. Są to *zarodnie*. Puszka taka ma zwykle nakrywaczkę, która przy dojrzewaniu odpada i z wnętrza wysypuje się drobny pyłek *zarodników*.

5. **Paprocie** (fig. 389), są to większe rośliny, mające postać krzewów lub drzew o liściach bardzo pięknie wycinanych. Na liściach tych w pewnym czasie możemy dostrzedz u spodu brązowe plamki; są to *kupki zarodni*, z których każda zawiera bardzo liczne *zarodniki* w postaci drobnego pyłku (fig. 390).



Fig. 389. Paproć, wyrastająca na murze.




Fig. 390. C—kawałek liścia paproci z kupkami; F — pękająca zarodnia i zarodniki powiększone.

6. **Skrzypy:** (fig. 391) rośliny zielne, niewysokie, odznaczają się osobliwym kształtem: zamiast liści mają gałązeczki promienisto ułożone.



Fig. 391. Skrzyp ulistniony (b) i zarodnio-nośny (a).

Łodyga i listki są szorstkie. Rosną na polach, w lasach, w miejscach wilgotnych. *Zarodnie* wyrastają tu na końcach pędów w postaci osobnych, tarczowato ułożonych woreczków, które razem tworzą buławiate rozszerzenie na wierzchołku.

7. **Widłaki** są to rośliny widlasto rozgałęzione, o liściach drobnych, łuskowatych; *zarodnie* tworzą się tu przeważnie na dolnej powierzchni osobnych listków, zgromadzonych u końca łodygi (fig. 392).



Fig. 392. Widłak z kłoskami zarodni.

276. 8. **Rośliny kwiatowe**, są to znane wszystkim rośliny, do których należy przeważna większość naszych **ziół, krzewów**

i drzew. Charakterystyczną ich cechą są *kwiaty* (fig. 393), składające się zwykle z 4-ch części: 1) *kielicha*, 2) *korony*, 3)



Fig. 393. Kwiat. A—pręciki; B—słupek z zalążkami w zawiązku.

pręcików *A*, 4) *słupka* *B*. Części kielicha nazywamy *działkami*; są one zwykle zielone, podobne do drobnych listków; części korony — *płatki*, są zwykle jaskrawo zabarwione. Na końcu *nici* pręcikowych znajdują się *pylniki*, z których wysypuje się pyłek. Pyłek ten musi dostać się na górną część słupka (*znamię*), ażeby kwiat mógł przemienić się na

owoc. Wewnątrz słupka, w dolnej jego części (*zawiązku*), znajdują się drobne zielone utwory (*zalążki*). Gdy pyłek upadnie na *znamię*, wyrasta z niego cienka rurczka (*l*), (niewidzialna gołym okiem) i rośnie ku zalążkom, aby się połączyć z jednym z nich. Skoro to nastąpi, słupek (fig. 394) zaczyna się rozrastać, przemieniając się w *owoc*, zalążki zaś — w *nasiona*. Pozostałe części kwiatu więdną i opadają. Części słupka przemienione w owoc nazywają się wogóle *obowocnią*; może ona być *soczystą*, *mięsistą* lub *suchą*.




Fig. 394. Słupek zapylony (powiększony), zn—znamię, s—szyjka, z—zalążki, sz—zawiązek, p—pyłek.

Nie wszystkie wszakże rośliny mają kwiat tak ukształtowany, jak opisaliśmy. Niektóre mają tylko zalążki, umieszczone na osobnych łuskach (fig.

395), a na innych podobnych łuskach—pręciki. Ponieważ zaś nie mają słupków, więc nie mogą mieć owoców, tylko nagie nasiona. Gromadę tę nazywamy roślinami *nagonasiennymi*: do tych należą wszystkie drzewa szyszkowe. Szyszki składają się właśnie z łusek, na których znajdują się zalążki, później przekształcające się w nasionka.



Fig. 395. Łuska z szyszki świerku z zalążkami.

Wszystkie pozostałe rośliny, mające słupek, z którego powstaje owoc, okrywający nasiona, nazywają się *okrytonasiennymi*; te

zaś, stosownie do tego, czy nasiona kielkują jednym, czy dwoma listkami, dzielimy na *jednoliścieniowe* i *dwuliścieniowe*.

277. Cały ten podział królestwa roślinnego przedstawia następująca tablica:

Królestwo roślinne.

Plechowe	I. Wodorosty.	}	Bezkwiatowe
	II. Grzyby.		
	III. Porosty.		
	IV. Mchy.		
	V. Paprocie.		
	VI. Skrzypy.		
	VII. Widłaki.		
Naczyniowe	VIII. Rośliny kwiatowe.	{	Kwiatowe
	{ Nagonasiennne.		
	{ Okrytonasiennne.		
	{ Jednoliścieniowe Dwuliścieniowe		

I. Drzewa owocowe.

278. Drzewa owocowe hodują w ogrodach dla owoców. Nie wiele jest wśród nich takich, które, będąc posadzone wprost, dają dobre owoce. Większość wymaga *uszlachetnienia*. Wykonywa się to za pomocą *szczeplenia* (fig. 396 i 397), które tak się od-



Fig. 396. Szczeplenie: A—zraz, B—płonka, C—szpara.



Fig. 397. Inny rodzaj szczeplenia, t. zw. oczkowanie.

bywa: na ściętym pieńku dzikiego gatunku (*płonki*) wycina się szparę, w którą wkłada się *zraz*, t. j. gałązkę z pączkami, odpowiednio wyciętą z udoskonalonej już rasy drzewa, czyli wydającego dobre owoce. Miejsce to smaruje się maścią i obwiązuje mocno; wkrótce *zraz* zrasta się z drewnem *płonki*, czerpie z niej pożywienie, rośnie, pączki się rozwijają i wydają gałęzie, które zwykle po kilku latach pokrywają się kwiatami, dającymi owoce lepsze, t. j. takie same, jak drze-

wo, z którego *zraz* był wzięty.

Rozróżniamy: 1) owoce soczyste, zawierające nasiona, otoczone skórzastym lub twardym nasiennikiem, jak np. jabłko, gruszka; są to *jabłczaki* (fig. 398); 2) owoce, zawierające ziarno w twardej skorupie (pestka), otoczonej soczystym mięsiwem np. śliwka lub wiśnia; są to *pestkowce* (fig. 399); 3) owoce, których nasienie zawarte w łupinie, otoczone jest skórzastą osłoną (*orzech*); są to np. orzech, kasztan.



Fig. 398. Gruszka (*jabłczak*), poprzecznie przecięta.




Fig. 399. Pestkowiec (*wiśnia*), A—pestka.

279. Najważniejsze z drzew owocowych są:

Jabłoń (*Pyrus Malus*) (fig. 400) rośnie dziko w gajach i zaroślach, i rodzi wtedy kwaśne, niezdatne do jedzenia jabłuszka. Przez uszlachetnienie wydaje niezliczoną ilość odmian, wśród których ważniejsze są: *renety*, *bursztówki*, *kalwile*, *papierówki*, *olbrzymki* i wiele innych. Liście ma kształtu jajowatego, śpiczaste, z brzegu piłkowane, o ogonkach dwa razy krótszych od liścia, zwykle gęsto omszone. Kwiaty białe, na zewnętrznej stronie różowe. Drewno jabłoni jest miękkie, kora gładka. Korona drzewa jest zaokrąglona, nadaje mu kształt ładny.



Fig. 400. Gałązka jabłoni z kwiatem.

Grusza (*Pyrus communis*) (fig. 401) wyższa jest od jabłoni i ma koronę kształtu bardziej wydłużonego. Drewno jej twarde, nadające się do robót stolarskich; kora chropawa, liście więcej wydłużone, niż u jabłoni, drobno piłkowane, równie długie jak ogonki. Kwiaty czysto białe. Grusza dzika jest u nas bardzo pospolita; owoce jej drobne i cierpkie, po ułożeniu jednak jadalne (*ułęgalki*). Przez wieloletnią uprawę, w łagodnych klimatach otrzymano z niej również jak z jabłoni, niezliczone odmiany: *bery*, *bonkrety*, *bergamoty*, *duanny*, *duszessy*, *kałebasy*, *sapieżanki*, *panny* i wiele innych.



Fig. 401. Kwiat i owoc gruszy.

280. Tegoż rodzaju owoce (jabłczaki) dają **Pomarańcze** (fig. 402), **Cytryny** (fig. 403), **Pigwy** (fig. 404) i **Granaty** (fig. 405), które nie mogą rosnąć u nas na otwartem powietrzu, tylko w cieplarniach, wymagają bowiem cieplejszego klimatu. Owoce



Fig. 402. Pomarańcza.

ich znane są pospolicie i przywożone w wielkiej ilości z Europy południowej, gdzie je zbierają parę razy do roku; u nas



Fig. 403. Cytryna.



Fig. 404. Pigwa.



Fig. 405. Gałązka granatu z kwiatem i przeciętymi owocami.

w cieplarniach wydają owoce, ale małe i nie dojrzewające. Owoce *pigwy* używane są tylko na konfitury, gdyż surowe są cierpkie. Owoc *granatu* zawiera w okrągłej, suchej powłoce liczne ziarenka, otoczone soczystym, słodkim mięsiwem barwy różowej; są smaczne i gaszą dobrze pragnienie.

281. **Wiśnia** (*Prunus avium*) (fig. 406) jest drzewem od 15—20 łokci wysokiem. Koronę ma piramidalną, korę gładką, odrywającą się poprzecznymi paseczkami; liście owalne, na końcu spiczaste, z brzegu podwójnie piłkowane; kwiaty białe, w baldaszki ułożone. Owoc pestkowy o słodkim lub kwaskowatym soczystym mięsiwie. Istnieje wiele odmian i podgatunków wiśni, utworzonych przez hodowlę; wi-



Fig. 406. Wiśnia; drzewo, kwiaty i owoce.

śnie *paryskie*, *papieskie*, *monmorency*, *gryolty*, *świętojanki*, *szklanki* i inne.

Zbliżone do wiśni są: **Czereśnia** (*P. cerasus*), która też w licznych odmianach hoduje się po ogrodach; ma owoce żółte, różowe lub czarno-fioletowe.

Czeremcha (*P. Padus*) o drobnych, białych, silnie pachnących kwiatach, zebranych w kitki i czarnych, cierpkich jagodach, które chętnie jedzą ptaki; pospolita w parkach i ogrodach; drzewo jej używane jest na wyroby tokarskie.

Wiśnia pachnąca (*Prunus Mahaleb*), rosnąca na południu Europy i znana pod nazwą drzewa Ś-tej Łucji. Owoce ma przykrego, gorzkawego smaku; z gałązek jej wyrabiają cybuchy, laski i t. p.

Śliwa (*P. domestica*) (fig. 407), drzewo dorastające kilkunastu łokci, o gałęziach rozłożystych, liściach eliptycznych, piłkowanych. Kwiaty białe rozwijają się wcześniej od liści. Owoce podługowate rozmaitej barwy. Liczne odmiany pochodzą prawdopodobnie ze Wschodu; z tych niektóre mają owoc prawie kulisty, np. *śliwki morelowe*, *mirabele*, inne okrągławe lub podługne: *renklody*, *dama-sceny*, *węgierki*, *katarzynki*, *brunele* i t. d. **Śliwka lubaszka** (*P. institita*) stanowi podgatunek domowej.



Fig. 407. Śliwa: gałązka z kwiatem i owocem.

Morela (*P. Armeniana*) pochodzi z Armenji. Dosięga wysokości 8—10 łokci; kwitnie już w marcu i w kwietniu. Liście są gładkie, jajowate, podwójnie piłkowane. Kwiaty białe w małych wiązeczkach; owoc - pestkowiec o smacznem mięsiwie i przyjemnym zapachu; nasienie trujące. Rozróżniają odmiany: *morelę wczesną*, *czerwoną*, *zwyčajną*, *morelo-brzoskwinię*.

Brzoskwinia (*Persica vulgaris*) (fig. 408), o kwiatach różowych, rozwijających się bardzo wcześnie; daje bardzo smaczne owoce z bruzdką z jednej strony; pestka chropawa z krętymi zagłębieniami; ma również liczne odmiany; nasienie jest gorzkie, trujące.



Fig. 408. Brzoskwinia.



Fig. 409. Gałązka orzecha włoskiego z kwiatami i owocami—jeden rozłupany.

Orzech włoski (*Juglans regia*) (fig. 409) osiąga 25—30 łokci; koronę ma rozpostartą, korę popielatą, liście nieparzysto-pięrzaste. Kwiaty rozwijają się wcześniej od liści. Pręciki i słupki są na oddzielnych kwiatach; kwiaty pręcikowe zebrane są w *bazie*, słupkowe po 2—4 na końcach gałązek. Pierwsze opadają po wysianiu pyłku; drugie rozwijają się w owoce—znane powszechnie *orzechy włoskie*; skórzasta ich osłona (*obowocnia*) również jak i li-



Fig. 410. Kwiatki leszczyny: słupkowe (u góry) i pręcikowe (u dołu).




Fig. 411. Owoc leszczyny (wielkość naturalna).

ście znajdują zastosowanie w lecznictwie i farbierstwie. Orzech włoski jest bardzo rozpowszechniony w Europie południowej. Drewno jego jest cenione przez stolarzy.

Leszczyna (*Corylus Avellana*) (fig. 410 i 411) jest większym krzewem, spotykającym się w lasach, zarosłach i ogrodach; liście ma kształtu sercowatego, nierówno piłkowane.

Kwiaty pręcikowe i słupkowe osobne; pierwsze w baziach, słupkowe ukryte są w pączku, z którego wystają tylko purpurowe znamiona. Orzeszki otoczone są liściastą osłoną w postaci kielicha. Są jadalne, wyciskają też z nich olej.

II. Drzewa leśne.

282. W skład lasów naszych wchodzi drzewa zarówno *liściaste* jak i *szpilkowe*; pierwsze mają liście płaskie i tracą je w jesieni, a na wiosnę rozwijają nowe z pączków; u drzew szpilkowych liście są wąskie i z wyjątkiem modrzewiowych, nie opadają na zimę, na wiosnę jednak rozwijają się również świeże. Drzewa szpilkowe mają owoce w postaci *szyszek*.

Dąb (*Quercus*) (fig. 414) należy do największych i najpiękniejszych drzew; rośnie nadzwyczaj wolno i dopiero w 200 lat

dosięga zupełnego rozwoju, a żyć może do 1,000 lat. Są dęby, mające w obwodzie do 40 stóp. Kora dębu w młodym wieku jest gładka, w starszym popękana; konary szeroko rozpostarte, węzłowe; korona szeroka. W naszych lasach rosną głównie dwa gatunki: **Dąb**



Fig. 412. Gałązka dębu z kwiatami pręcikowymi.



Fig. 413. Gałązka dębu z żołędziami.

szypułkowy (*Quercus pedunculata*), mający liście krótkogonkowe, o falisto wycinanym zarysie, żołędzie na długich szypułkach—i **Dąb krótkoszypułkowy** cz. **zwyczajny** (*Q. Robur*) o krótkoszypułkowych żołędziach i liściach na długich ogonkach. Kwiaty pręcikowe u obu gatunków oddzielne są



Fig. 414. Dąb.



Fig. 415. Kwiaty słupkowe dębu.

od słupkowych; pręcikowe zebrane w baziach (fig. 412), słupkowe drobne po kilka razem (fig. 415), u 1-szego gatunku wiszą na końcu młodych pędów, u drugiego siedzą w kątach

substancję, t. zw. *garbnik* i używa się do garbowania skór i w lecznictwie; owoce — *żołędzie* otoczone *miseczkami* (fig. 413) — używają się na mąkę, kawę i do karmienia nierogacizny.



Fig. 416. Buczyna.

Drewno dębu jest bardzo twarde, mocne i ciężkie; używa się na budowle i różne wyroby. Gdy długo leży w wodzie, czernieje.



Fig. 417. Gałązka buku z kwiatami.

W krajach południowych znajduje się *Dąb korkowy*, mający korę grubą, gąbczastą, używaną na korki i inne wyroby; korę tę ścinają pasami, tak, że nanowo kilkakrotnie odrosnąć może.

Buk (*Fagus silvatica*) (fig. 417), rośnie przeważnie na pochyłościach wązkich dolin, które zamienia w prawdziwe świątynie natury: pod nogami posadzka brunatna, utworzona z masy zwiedłych liści; dokoła, gładkie, srebrzysto-szare pnie tworzą jakby kolumnadę; nad głową sklepienie z ciemnozielonych, zaokrąglonych koron, po-



Fig. 418. Kwiat i owoc grabu.

między którymi gdzieniegdzie prześwieca błękit nieba. Buk ma liście skórzaste kształtu jajowatego; kwiaty pręcikowe znajdują się w kątach liści, słupkowe na końcu gałązek; orzeszki trójgraniaste (*buczyna*) (fig. 416), po dwa i trzy razem w drzewiastych łupinkach. Wyciskają z nich dobry olej, a wyciśnięte służy na karm drobiu i nierogacizny. Buk dosięga 80 — 120 stóp wysokości; kwitnie w kwietniu i w maju.

283. **Grab** (*Carpinus Betulus*) (fig. 418) jest drzewem średniej wielkości, o pniu prostym, pokrytym szaro - popielatą korą; kwitnie w kwietniu lub w maju. Z grabów robią piękne szpa-

lery w parkach i ogrodach. Drzewo grabu używane jest na opał i na narzędzia stolarskie.

Brzoza (*Betula alba*) (fig. 419) łatwa jest do poznania



Fig. 419. Brzoza.



Fig. 420. Gałązka i bazia brzozy.

po białej korze i cienkich wiszących pędach. Kwiaty przecinkowe ma oddzielnie od słupkowych; owoce są skrzydlate, drobne, zebrane w ogromnej ilości w kotkę (fig. 420), które wiatr roznosi daleko. Drewno używa się na wyroby i na opał; daje dobry węgiel; gałązki używane są na miotły.

U nas jest kilka gatunków brzozy; z tych **Brzoza płacząca** ma najbardziej zwisłe gałązki.

Lipa (*Tilia*) jest to jedno z najbardziej ulubionych drzew, bardzo rozpowszechnionych w naszym kraju. Mamy też bardzo stare lipy, słynne ze swego wieku i wielkości. Są to drzewa rozłożyste o białem, miękkim, lekkim drewnie. Kwiaty ich o pięciu działkach kielicha, pięciu płatkach, licznych pręcikach i słupku kulistym, zebrane są po kilka na szypułce, zaopatrzonej w długi listek, zw.



Fig. 421. Liść i orzeszki lipy.



Fig. 422. Kwiat lipy.

przykwiatkiem (fig. 422). Owocem są drobne *orzeszki* (fig. 421).

Rozpowszechnione są u nas dwa gatunki:

Lipa wielkolistna, rosnąca przy wsiach i w miastach w parkach i ogrodach; może żyć do 1,000 lat i dochodzi do 40 stóp w obwodzie. Liście ma większe, pod spodem omszone.

Lipa małolistna (*Tilia parvifolia*) ma liście mniejsze i gładkie i więcej kwiatów na wspólnej szypułce. Kwiat lipowy, wysuszony, pije się jako herbatę dla wywołania potów.



Fig. 423. Liście, kwiaty i owoc klonu.

284. **Klon** (*Acer pseudo-platanus*) (fig. 423) kwitnie w maju. Pień ma prosty; korę brunatno-szarawą, liście duże, pięciopalcowe; kwiataki jasno-zielone w gronach; owoc jest skrzydlaty, podwójny. Dosięga 100 stóp wysokości.

Jesion (*Fraxinus excelsior*) korę ma szarą, łatwo pękającą, liście nieparzysto-pierzaste, kwiaty (fig. 424 b), drobne ukazują się przed liśćmi w kwietniu i w maju; owoc skrzydlaty

(fig. 424 a). Wysokość drzewa dosięga 120 — 150 stóp. Drewno mocne jest cenione przez stolarzy.

Wiąz (*Ulmus*) dosięga wysokości 60 do 70 stóp; kwitnie przed rozwinięciem liści w marcu i kwietniu. Kwiaty i owoce zebrane w pęczki. **Wiąz pospolity** (*Ulmus campestris*) ma kwiaty na krótkich szypułkach (fig. 425 i 426), **Wiąz szypułkowy** (*Ulmus effusa*) przeciwnie—na długich. W naszych lasach często spotyka się trzeci gatunek, zwany pospolicie *brzostem* (*Ulmus suberosa*).



Fig. 424. Gałązka je-sionu z owocami (a), b i c—kwiat.

Olcha (*Alnus glutinosa*) (fig. 427), rośnie zwykle wzdłuż strumyków i strug. Kwiaty pręcikowe ma w długich walcowatych baziach, słupkowe w małych, okrągłych; owoce znajdują się w małych zdrewniałych szyszkach (fig. 428).

Kwitnie w kwietniu i w maju; drewno olchy, lekkie i kruche, nadaje się tylko do budowli wodnych.

Prócz tej, pospolitej u nas *Olchy* zwyczajnej, spotyka się niekiedy i *Olcha biała* (*Alnus incana*), rosnąca gdzieś nad Wisłą.

285. *Osina* (*Populus tremula*) ma korę szaro-zielonawą; liście jej (fig. 429), okrągławe, zawieszane są na bardzo długich, sple-



Fig. 425. Gałązka wiązu z owocami.



Fig. 426. Kwiat wiązu.

szczonych ogonkach, wskutek czego wprawiane są w ruch za najłżejszym powiewem wiatru. Kwiaty pręcikowe i słupkowe, zebrane są w kotki; ale nie są umieszczone na tem samym drzewie, tylko kotki pręcikowe są na jednym, słupkowe zaś na innem. (Rośliny, któ-



Fig. 427. Gałązka olchy. Fig. 428. Szyszki olchy. Fig. 429. Liść osiny.

rych kwiaty są w ten sposób rozmieszczone, nazywamy *dwu-piennymi*, wszystkie zaś wyżej opisane drzewa, mające kotki

pręcikowe i słupkowe na tem samym drzewie, nazywamy *jednopiennymi*). Osina dosięga wysokości 50—100 stóp, kwitnie w marcu i w kwietniu, jeszcze przed rozwinięciem liści.

Pokrewne gatunki stanowią; **Topola biała** zw. **Białodrzewem** (*Populus alba*) (fig. 431) o li-

ściach 3—5 kłapowych, z dołu biało omszonych.

Topola czarna nadwiślańska (*P. nigra*) lub **sokora**, rosnąca w miejscach wilgotnych, zwłaszcza nad Wisłą.

Topola piramidalna (*P. pyramidalis*) (fig. 430), wysokie, wysmukłe drzewo, sadzone wzdłuż gościńców i w ogrodach.



Fig. 430. Topola piramidalna.



Fig. 431. Gałązka topoli białej.

286. **Wierzba iwa** (*Salix caprea*), dosięga wysokości 25 do 30 stóp, rośnie w lasach, na brzegach rzek. Liście mają jajowate (fig. 433), na brzegach nieco faliste; kotki pręcikowe żółte, słupkowe zielonawe (fig. 432) znajdują się na osobnych drze-



Fig. 432. Kotka słupkowa wierzby
A—pojedynczy kwiatek słupkowy.



Fig. 433. Liście wierzby iwy.

wach (wierzba jest rośliną dwupienną). Kwiaty jej zawierają

miód i zwabiają pszczoły i trzmiele, które, ocierając się o pylniki kwiatów pręcikowych, zbierają z nich pyłek na łapki i tułów, a siadając potem na kwiatach słupkowych, zapylają je *). Wierzba iwa kwitnie w marcu i kwietniu; gałązki jej z kotkami znane są pod nazwą „palm” święconych w palmową niedzielę.

Wierzba biała (*S. alba*) (fig. 434), rośnie nad brzegami wód.

Istnieje prócz tego wiele gatunków wierzby; z cienkich gałązek niektórych wyplatają kosze, np. z *Wierzby koszykarskiej* zw. *wiciną*, rosnącej krzewiasto nad wodą. **Wierzba płacząca** (*S. babylonica*) (fig. 435), także spotyka się nad brzegami rzek, stawów i t. p.

Kasztan dziki (*Aesculus Hippocastanum*) (fig. 436), spotyka się rzadko w lasach, bardzo często w parkach. Jest to piękne drzewo o gałęziach rozłożystych, dosięgające 80 stóp wysokości, o pniu grubym,



Fig. 435. Wierzba płacząca.

liściach dużych, złożonych z 5 do 7 listków dłoniasto ułożonych; kwiaty białe o czerwonych pręcikach albo całe czerwone, w pięknych wzniesionych wiechach. Owoce kasztana są, to okrągłe, zielone pokryte kolecami torebki, które pękają w jesieni, wyrzucając brunatne nasiona; niejadalne.

Drzewo to pochodzi z Azji. Drewno używane na różne wyroby.



Fig. 434. Liście wierzby białej.



Fig. 436. Kasztan dziki: liść, kwiat i owoc.

*) Takie rośliny, u których pyłek przenoszą zwiedzające je owady, nazywają się *owadopylnymi*; u innych przenosi je wiatr—są to rośliny *wiatropylne*; są wreszcie takie, u których pręciki i słupki, znajdując się w jednym kwiatku, są przytem tak urządzone, że pyłek z pierwszych sam się dostaje na znamię: są to kwiaty *samozapylające się*.

Kasztan jadalny (*Castanea vulgaris*) sadzony gdzieś w ogrodach, dziko zaś rosnący w Europie południowej, ma liście lancetowate (fig. 438), owoce gęsto pokryte kolcami (fig. 437), jadalne; ulepszone odmiany nazywają *maronami*.

Jawor (*Platanus*) (fig. 439), spotyka się w ogrodach, pochodzi z Azji i Ameryki, ma liście podobne do klonowych, pokryte pod spodem białym puszkim (fig. 440). Drzewo używane na wyroby tokarskie.

287. **Jodła** (*Abies pectinata*) (fig. 441) tworzy lasy przeważnie na górach, w Karpatach, Tatrach, Pieninach.




Fig. 437. Owoce kasztana jadalnego, a—cały, b—otwarty.



Fig. 438. Liść i kwiat przecikowy kasztana jadalnego.

Dosięga wysokości 120 — 160 stóp; korę ma gładką, jasno-



Fig. 439. Jawor.



Fig. 440. Gałązka jaworu z baziarni.

srebrzysto-szarą, igły jodły płaskie, z rowkiem pod spodem, ułożone są w ten sposób, że rozpościerają się na obie strony gałązek. Szyszki duże, wzniesione na gałązkach (fig. 442), jakby świeczki, rozpadają się na drzewie. Nasionka są skrzydlate



jak u większej części szyszkowych. Wygląd jodły jest bardzo charakterystyczny: stopniowo zężająca się ku górze i ostro zakończona korona, składa się z prostopadłych, jednostajnie we wszystkie strony rozchodzących się gałęzi. Drewno jej używa się na maszty okrętowe, na instrumenty muzyczne i inne wyroby. Żywica na terpentynę.



Fig. 441. Jodła.

Świerk (*Picea excelsa*) (fig. 443) ma ogólny wygląd podobny do jodły, lecz gałązki ma zwisłe, igły czterograniaste o-



Fig. 442. Gałązka jodły z szyszką.

taczają dookoła łodygę; szyszki wiszące w dół, opadają całe po dojrzeniu; młode są czerwone. Bywa wysoki na 140 stóp, korę ma czerwono-brunatną. Drewno używane jest na budowlę, wyroby stolarskie i opak; z żywicy otrzymuje się terpentynę i smołę. Świer-



Fig. 443. Gałązka świerku z szyszką.



Fig. 444. Sosna.



Fig. 445. Gałązka sosny z kwiatem i szyszką.

ki rosną w Europie północnej i środkowej, tworząc lasy rozległe. W Tatrach nazywają je górale „smerekami.”

Sosna (*Pinus silvestris*) (fig. 444 i 445) wyglądem różni

się znacznie od innych drzew szpilkowych; gałęzie ma nieregularnie powyginane, korę czerwonawą, popękaną; wysoka 60—80 stóp. Szpilki sosny długie do 2 cali, stoją po dwie w pęczkach, które są małemi gałązkami. Szyszki pręcikowe żółte obejmują dookoła młode gałązki, nad niemi na szczycie wznoszą się słupkowe czerwonawe. Po dojrzeniu zwieszone wysypują nasiona; same opadają, są niewielkie, złożone z łusek czterokańczastych. Sosny rosną w Europie północnej i środkowej na gruncie piaszczystym, nawet w samym piasku, również i na niewysokich górach. Drewno dobre na opał i wyroby stolarskie.

Modrzew (*Larix europea*) (fig. 446) jest jedynem z ro-



Fig. 446. Gałązka modrzewiu z szyszką.



Fig. 447. Gałązki jałowcu z szyszkami pręcikowemi i słupkowemi.

snących u nas drzew szpilkowych, których liście opadają na zimę. Są one miękkie, po kilkanaście w pęczkach. Kora chropawa i popękana. Kotki słupkowe czerwone, mieszczą się obok żółtych pręcikowych. Szyszki niewielkie, jajowate. Modrzew pospolity jest w naszych lasach. Drewno jego bardzo cenione.

Jałowiec (*Juniperus communis*) (fig. 447) jest to niewielki krzew o ostrych, kolących szpilkach zebranych po trzy w pęczkach; kotki pręcikowe znajdują się w kątach liści. Szyszka jest mała, mięsista, nazywają ją pospolicie „jagodą jałowcu.” Jagody te używają się w medycynie i jako przyprawa.

288. Wspomnimy tu jeszcze o niektórych drzewach

szyszkowych, zdobiących nasze parki: **Cis** (*Taxus baccata*), kształtne drzewo, którego nasiona otoczone są czerwoną, mięsistą miseczką (fig. 448); **Sosna amerykańska** (*Pinus strobus*), o cienkich długich igłach, zebranych po 5 w pęczki, drzewo duże, rozłożyste; **Cyprys** (*Cupressus sempervirens*),



Fig. 448.
Gałązka cisu
z owocami.

drzewo o wyglądzie posępnym, uważane u wszystkich narodów za emblemat smutku, sadzone bywa najczęściej na cmentarzach; **Tuja cz. Żywotnik** (*Thuja*), podobna do cyprysu, pochodzi z Azji i Ameryki, gdzie tworzy lasy; u nas



Fig. 449. Cedr libański.

hodowana nie dochodzi wielkich rozmiarów; szyszka jej niewielka, kańczasta.

Cedr libański (*Cedrus Libani*) (fig. 449), należy do najokazalszych drzew szpilkowych; rośnie w górach Azji mniejszej i Afryki północnej.

III. Drzewa olbrzymie.

289. Niektóre drzewa mogą osiągać bardzo późnego wieku, a rosnąc ustawicznie, przybierają olbrzymie rozmiary, tak na wysokość, jak i na grubość.

Zanim przejdziemy do opisu drzew olbrzymich, odpowiadźmy z początku na pytanie: w jaki sposób i czy zawsze można poznać wiek drzewa?

W drzewach *dwuliścieniowych* i *szyszkowych*, do których należą wszystkie nasze drzewa, możemy z łatwością ocenić wiek przeciętego pnia, licząc t. zw. *warstwy zgrubienia* czyli *słoje roczne*; są to warstwy drewna, które powstają co roku, zaczynając się na wiosnę, a kończąc w jesieni. Ponieważ co roku powstaje jedna warstwa, a zatem ilość ich przedstawia wiek drzewa. Grubość pnia zależy więc od ilości

tych warstw. Naodwrot zatem, możemy, wiedząc jaka jest grubość każdej warstwy rocznej, mniej więcej obliczyć i wiek nawet niezrąbanego drzewa (fig. 450).



Fig. 450. Przecięcie pnia drzewa:
A—kora, B—tkanka twórcza, C—biel,
D—twardziel, E—rdzeń.

Trudniej jest poznać wiek drzew *jednoliścieniowych*, do których należy wiele olbrzymów zwrotnikowych, gdyż rośliny te nie tworzą słoików rocznych. Tu botanicy radzą sobie za pomocą różnych ubocznych wskazówek.

290. Teraz powiemy kilka słów o znanych najstarszych drzewach. Z europejskich gatunków, zdaje się, że **Lipa** ma wiek najdłuższy. Są też lipy prawdziwie olbrzymie. Do takich należy np. *neusztadska* (w królestwie Wirtembergkiem). Korona jej ma w obwodzie przeszło 500 stóp, a konary wspierają się na 106 kolumnach kamiennych, z których dwie przednie mają datę 1558 r. W tym roku więc potrzebowała już owa lipa podpórki!

Dokładnie znany jest wiek lipy, posadzonej we Freiburgu (w Szwajcarji), podczas walki o niepodległość w r. 1476, na pamiątkę zwycięstwa pod Morątem. Pień jej ma 20 stóp w obwodzie. Niedaleko stamtąd, w wiosce Villars-en-Moing rośnie lipa, która już w owym roku 1476 słynęła z niezwykłej grubości, a obecnie ma 48 stóp obwodu. Jest ona zupełnie zdrowa i mocna.

291. Jeden z największych **Dębów** europejskich znajduje się we Francji niedaleko Saintes (w departamencie Charente-Inférieure). Ma on u podstawy 36 stóp średnicy. W ogromnej dziupli jego pnia znajduje się pokój, wysoki na 12 stóp, a szeroki od 12—16 stóp. Ściany jego wystlane są porostami i paprocią. Wiek tego olbrzyma obliczają na 1,800 do 2,000 lat; to znaczy, że może on pamiętać czas narodzenia Chrystusa Pana.

Podania podobne chętnie przywiązują do starych drzew. W Karpatach, po drodze od Rabki do Jordanowa, znajduje się dąb, o którym opowiadają, że został posadzony na pa-



Fig. 451. Kasztan «stu koni».

miątkę posiłku, który brał w tem miejscu król Jan Kazimierz, będąc tu podczas najazdu szwedzkiego.

Niedaleko od Beresteczka są olbrzymie brzosty, które pamiętają stoczoną tam bitwę z kozakami.

W parku Wilanowskim pod Warszawą znajdują się trzy olbrzymie lipy, które są podobno sadzone ręką Jana Sobieskiego.

Słynny był na Litwie z wieści dąb Baublis, o którym wspomina Mickiewicz:

«Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie
Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mogło wieszczyć za stołem?»

Był to jeden z dębów świętych, pod którym długo jeszcze po przyjęciu chrześcijaństwa lud okoliczny składał ofiary. Rósł on w gaju dębowym, należącym do wsi Bardzie w powiecie rosińskim (gub. kowieńskiej) o 6 mil od Rosień

i liczył przeszło 1,000 lat, gdy przestał żyć, a właściciel owego majątku przed 70 laty kazał przenieść ścięty pień już obumarłego drzewa do swego ogrodu. Miał on wówczas około 12-u stóp wysokości i 22 w obwodzie. Wyjęto zeń rdzeń i wydrążono okna, a nakrywwszy dachem, utworzono rodzaj altanki, w której znajdował się okrągły stół i 6 krzeseł. Było to muzeum zabytków pogańskiej Litwy, zawierające także odpowiednio dobraną bibliotekę. Starannie ułożone zbiory te wszakże zostały po jego śmierci zrabowane przez odwiedzających gości i sąsiadów; dziś zaś i sama komnata znajduje się w stanie dość opłakanym.



Fig. 452. Cis z Haye de Routot.

292. Na górze Etnie w Sycylii rośnie olbrzymi **Kasztan** zw. *kasztanem stu koni* (fig. 451). Ma on w obwodzie 52 metry (przeszło 100 łokci) i jest wewnątrz wydrążony; w tem wydrążeniu zbudowany jest domek

z piecem do suszenia kasztanów. Nazwa pochodzi od podania, jakoby Joanna Aragońska, podróżująca w otoczeniu szlachty na 100 koniach, miała się schronić od burzy pod tym olbrzymim kasztanem. Wiek jego obliczają na 3,000 do 4,000 lat (fig. 451).

Z innych drzew, dosiegają bardzo późnego wieku: **orzech włoski, jawor, cis.**

W departamencie Eure w Haye de



Fig. 453. Smocze drzewo na wyspie Teneryfie.

Routot znajduje się *cis*, którego wiek obliczają na 1,400 lat. W obwodzie ma 24 łokcie i w spróchniałym jego pniu urządzono kapliczkę (fig. 452).

293. Najpotężniejsze wszakże olbrzymy leśne spotykamy w krajach gorących.

Na wyspie Teneryfie niezbyt dawno podziwiano **Smocze drzewo** (*Dracena Draco*) (fig. 453), którego pień wznosił się na 72 stopy, a dziesięciu ludzi nie mogło go objąć; w roku 1402, w czasie pierwszej wyprawy Béthencourt'a na tę wyspę, było ono już tak olbrzymie i tak wydrążone, jak w 1799 roku, gdy je oglądał Humboldt. Biorąc pod uwagę niezwykle powolny wzrost tego gatunku, przyjąć należy, iż wiek jego wynosił kilka tysięcy lat. Drzewo to zostało zdruzgotane przez huragan w r. 1867. (*Dracena* należy do drzew jednoliścieniowych; hodowana u nas w cieplarniach, ma postać przedstawioną na fig. 454).



Fig. 454. *Dracena*.

Cedry, drzewa oliwne i figowe dochodzą również olbrzymich rozmiarów. Ze wszystkich wszakże drzew, największej wysokości i grubości dosięga **Sosnogron olbrzymi** (*Wellingtonia gigantea*) (fig. 455), rosnący w Kalifornji na górach Sierra-Nevada, na wysokości 1665 metrów nad powierzchnią morza.

Wysokość dochodzi do 500 stóp, przy średnicy 40 stóp, a wiek jego wynosi 3,000—4,000 lat. Kora zdjęta całkowicie do wysokości 21 stóp z jednego takiego drzewa, utworzyła pokój, w którym umieszczono, oprócz fortepjanu, krzesła dla 40 osób. Drzewo to, nazwane *drzewem mamutowem* należy do *szyszkowych*.

W muzeum botanicznem w Brukselli widział autor skrawek Sosnogronu przedstawiający wyraźnie warstwy na odpolowanej powierzchni. Daty wypadków historycznych, które przeżył ten olbrzym (liczący przeszło 1000 lat wieku) są oznaczone na odpowiednich warstwach rocznych. Widzimy więc jaką grubość posiadał w czasie, gdy Karol Martel wstrzymywał najazd hunnów, jaką wtedy, gdy Mahomet sze-

rzył nową religję; kiedy pochody krzyżowe wychodziły wal-



Fig. 455. Pień Sosnogronu olbrzymiego.



Fig. 456. Baobab.

czyć o grób Chry-
stusa; kiedy Luter
obwieszczał
swoje punkta i t.
d. Wiele wypad-
ków przeszło nad
tem drzewem,
krzepkiem jesz-
cze i zdrowem za-
nim ścięła go pi-
ła białego przy-
bysza w puszc-
zach Kalifornji.

294. W Afry-
ce zwrotnikowej
rośnie **Baobab**

(*Adansonia digitata*) (fig. 456), zadziwiający grubością swą

i kształtem. Pień jego niewysoki (zaledwie 16 — 20 stóp), może dosięgać 120 stóp w obwodzie, przytem gałęzie są niezwykle długie (do 80 stóp) i schylają się końcami ku ziemi, tak, iż całe drzewo wygląda zdaleka jak olbrzymia kopuła zielona, mająca przeszło 200 stóp obwodu. Podług obliczeń Adansona, baobaby dosięgają 6,000 lat wieku. W wydrążonym pniu baobabu negrzy chowają ciała swoich poetów-czarowników. Owoce tego olbrzyma, podobne do tykwy na długich ogonkach, są jadalne.

W starożytnej stolicy królów Cejlonu, Anuradhapura, znajduje się **Figowiec świątnicowy** (*Ficus religiosa*) (fig. 457),



Fig. 457. Figowiec świątnicowy.

który wyrósł z gałązki, zerwanej z drzewa, pod którem spoczywał Guatama w dniu, gdy doszedł do bezwzględnej doskonałości i stał się wcieleniem Buddy. Drzewo to słynie pod nazwą „Bo-gaha” czyli „świętego drzewa.” Posadzone w osiemnastym roku panowania Dwenipiatissa ma ono obecnie 2192 lata. Zdaje się tedy sprawdzać przepowiednia tego króla, który rzekł sadząc własnoręcznie Bo-gaha: „rosnąć i kwitnąć będzie aż do końca wieków.”

Wszystkie dynastje czcily Bo i wszyscy najezdniczy je uszanowali, zapewne pod wpływem zabobonnego strachu, jaki wzbudza „drzewo święte.” W ciągu dwudziestu dwu wieków napływają pielgrzymi z całych Indji, aby uklęknąć u stóp

odwiecznego drzewa; w jego cieniu odbywały się najwspialsze ceremonje, na jakie zdobyć się mogła fantazja kapłanów i królów. Dziś jeszcze pielgrzymi pobożnie zbierają opadłe liście i chowają je jako relikwie. Na całej kuli ziemskiej nie znajdziemy drugiej rośliny, któraby tyle hołdów odebrała, była świadkiem tylu wydarzeń i posiadała równie długą i skrzętnie w stu kronikach opisaną historję.

IV. Krzewy leśne i ogrodowe.

295. *Krzewami* nazywamy rośliny o łodydze drzewnej, która wszakże nie przybiera postaci pojedynczego pnia, jak u drzew, lecz od samego korzenia rozgałęzia się w formę krzaczastą. Do krzewów krajowych należą:



Fig. 458. Winorośl.

Winorośl (*Vitis vinifera*) (fig. 458) czyli *krzew winny*; ma łodygę czepną, rozgałęzioną, sięgającą długości 40 do 60 stóp. Liście są 3—5 kłapowe, ząbkowane; kwiaty małe, zielonawe, zebrane w wiechy; owoce—jagody, stanowiące znane wszystkim *winogrona*, w niezliczonych odmianach, rozmaitej barwy i wielkości, jakie wytworzyła od niepamiętnych czasów hodowla. Krzew winny uprawia się na wielką skalę w cieplejszych krajach Europy: w Niemczech południowych, Francji, Hiszpanji, we Włoszech, na Węgrzech i t. d. U nas nie daje dojrzałych owoców. Tam, gdzie warunki klimatyczne nie pozwalają uprawiać go na otwartem powietrzu, hodują go w wielkich, osobiwie urządzonych cieplarniach (fig. 459).



Fig. 459. Uprawa winorośli w cieplarniach.

Z winogron otrzymuje się wino w ten sposób, że sok z dojrzałych owoców wyciska się i poddaje *fermen-*

tacji, polegającej na tem, że pod wpływem grzybków drożdżowych, dostających się z powietrza, zawarty w nim cukier zamienia się na spirytus. W ten sposób otrzymuje się wino. W celu wyciśnięcia soku, albo wrzucają winogrona do ogromnego płaskiego naczynia (fig. 460), gdzie je tłoczą nogami, albo też wyciskają go osobną prasą (fig. 461). Sok,



Fig. 460. Zrzucanie winogron do kadzi fermentacyjnych.



Fig. 461. Prasa do tłoczenia winogron.

wyciśnięty w ciągu pierwszych dni, burzy się bardzo silnie, gdyż podczas fermentacji wydziela się gaz (kwas węglowy); później piana opada i fermentacja idzie wolniej. Wtedy zlewają sok, który już nabrał smaku wina, do ogromnych beczek, w których fermentacja trwa jeszcze kilka tygodni. Wino przytem wystaje się, t. j. osadzają się z niego wszelkie domieszki i otrzymuje się czysty napój—młode wino.

Strasznym wrogiem winorośli jest *Filoksera*, o której była mowa na str. 202. Szkody, jakie ten owad robi w winnicach, obliczają na miljarde franków w ciągu kilkunastu lat.

296. **Porzeczka czerwona** (*Ribes rubrum*) (fig. 462)

ma liście dłoniasto wcięte, kwiatki drobne zielonawe, jagody czerwone lub białe, zebrane w gronka; **Porzeczka czarna** (fig. 463), ma jagody czarne o silnej woni, uży-



Fig. 462. Porzeczka czerwona.



Fig. 463. Porzeczka czarna.

wane do wyrobu wódki i na konfitury.

Agrest (*Ribes grossularia*) (fig. 464), jest to krzew z rodzaju porzeczki, o gałęziach kolących i liściach szorstkich; jagody ma zielone, żółte lub czerwone, zwykle pokryte szorstkimi włoskami; spotyka się w wielu odmianach. Jagody jedzą surowe lub robią z nich powidlą i konfitury.



Fig. 464.
Gałązka agrestu
z owocami.

Z porzeczek i agrestu otrzymują się dobre wina owocowe.

297. **Malina** (*Rubus Ideus*) (fig. 465) ma pod ziemią krótki pień, z którego wychodzą dwuletnie gałązki proste lub pokładające się. W pierwszym roku na gałązkach tych wyrastają liście pierzasto złożone, mechate, spodem białawe, dopiero w drugim roku rozwijają się kwiaty białe, duże, zebrane w małe wiechy. Owoce są złożone z małych pestkowców, co razem wokoło wspólnego osadnika wygląda jak jagoda. Są



Fig. 465. Gałązka
maliny z owocami.



Fig. 466. Gałązka
jeżyny z owocami.



Fig. 467. Poziomka:
a—wąg i b—owoc.

różne odmiany malin, prawie wszystkie mają gałęzie kolące. Maliny rosną dziko w lasach, zaroślach i hodowane są wszędzie w ogrodach; różnią się między sobą głównie wielkością owocu.

Do malin należy też **Jeżyna** (fig. 466), dziko rosnąca w lasach, nad parowami i t. p.; ma owoce duże, po dojrzeniu prawie czarne.

Wspomnieć tu należy i o **Poziomce** (*Fragaria vesca*) (fig. 467),

rosnącej wszędzie w lasach, w gajach i na wzgórzach; kwitnie od kwietnia do lipca; gdziekolwiek w górzystych okolicach wydaje owoce do późnej jesieni. Jest to niewielka roślina o liściach wychodzących z krótkiego pieńka, trójdzielnym, gęsto owłosionym; z łodygi wychodzą wypustki t. zw. *wąsy* (*a*), które w pewnych miejscach wydają korzonki i liście, a same rosną w dalszym ciągu. Kwiaty ma białe, owoce mięsiste, smaczne. Powstają one z rozrośniętego osadnika kwiatowego, na którym siedzą ziarenka, t. j. suche owocki (niełupki).

Truskawka jest to gatunek poziomki, hodowanej w ogrodach, różni się wielkością i smakiem owocu.

298. **Czarna jagoda** zw. **Czernicą** albo **Borówką czarną** (*Vaccinium Myrtillus*) spotyka się przeważnie w lasach szyszkowych; maleńki to krzew o liściach jajowatych, piłkowanych; kwiatki ma drobne, dzwonkowate, białawe; jagody czarne, bardzo smaczne.

Oprócz tej, pospolitą jest **Borówka czerwona** o listkach białobrzegich, brudno-zielonych, owocach czerwonych, i **Żórawina**. spotykana zwłaszcza w gęstych lasach wilgotnych na Litwie; ma jagody na długich szypułkach, duże, czerwone, wewnątrz białe, kwaskowate, używane na soki.



Fig. 468. Bez czarny.

Bez czarny (*Sambucus nigra*) (fig. 468), spotyka się często w zaroślach, koło płotów w parkach; osiąga niekiedy wysokości 24 stóp. Liście ma pierzaste o niemiłej woni, kwiatki białe zebrane w tarcze i drobne czarne jagody. Napar kwiatu suszonego bzu używa się na poty.

299. **Tarnina** (*Prunus spinosa*) ma gałęzie cierniste, liście eliptyczne, piłkowane; kwiaty pojedyncze, białe, rozwijają się wcześniej od liści; owoc pestkowiec czarno-niebieski, bardzo cierpki. Używa się na żywopłoty.



Fig. 469. Głóg.

Głóg (*Crataegus Oxyacantha*) (fig. 469), ma korę jasno-szarą, gałęzie cierniste. Liście 3 do 5 klapowe są podwójnie piłkowane. Kwiaty białe lub czerwone, zebrane w bukiety; owoc czerwony, pestkowiec.

Głóg używany jest na żywopłoty i sadzą go w ogrodach dla ozdoby.

Berberys (*Berberis vulgaris*) (Tab. XIV, fig. 1), liście ma odwrotnie jajowate w pęczkach, z kolcami u nasady; ilość tych kolców jest tem większa, im bardziej suche powietrze, w którym się rozwija roślina; w powietrzu zupełnie wilgotnem na miejscu kolców rozwijają się liście. *Kolce* te uważamy więc za *przekształcone liście*. Kwiaty ma żółte w wiszących gronkach, jagody czerwone, podługne, mają smak kwaśny i używają się na konfitury. Na liściach berberysu rozwija się grzybek „rdza,” która przenosi się potem na zboża i niszczy je; berberys jest więc na polach szkodliwy.



Fig. 470. Kruszyna.

Kruszyna (*Rhamnus frangula*) (fig. 470) ma liście eliptyczne, kwiaty drobne, białe, jagodę czarną. Kora używana jest w medycynie.

Trzmielina zwyczajna (*Evonymus europaeus*) (fig. 471) rośnie u płotów, w zaroślach i lasach; gałązki ma prawie czworograniaste, kwiatki drobne zielonawo-białe; owoc torebka czworograniasta, czerwona, trująca.



Fig. 471. Trzmielina. Fig. 472. Dereń właściwy.

Dereń świdwa (*Cornus sanguinea*) ma kwiaty białe, zebrane w baldaszki, rozwijające się przed liśćmi, owoce — pestkowce, czarne, okrągłe. **Dereń właściwy** (*Cornus mas*) ma kwiaty żółte, a owoce czerwone podługowate (fig. 472), używane na konfitury. Drewno bardzo twarde, używa się na laski.

Bez perski cz. Li-lak (*Syringa vulgaris*), znany wszystkim krzew o miłownych kwiatach, barwy liljowej lub białej, zebranych w wiechy; kwitnie w maju.

300. **Róża dzika** (*Rosa canina*) (fig. 473), krzew kolczasty o liściach pierzastych i kwiatach różowych lub żółtych; owoce powstają przez rozrastanie się osadnika kwiatowego. Od róży dzikiej pochodzą odmiany hodowanych po



Fig. 473. Róża dzika.



Fig. 474. Róża ogrodowa.

ogrodach róż pełnych, których liczą do 6,000. Przekształcenie kwiatu róży dzikiej na pełną następuje w ten sposób, że z licznych pręcików powstają płatki korony. Róża taka owoców nie wydaje. Z róży dzikiej można otrzymać **Różę ogrodową** (fig. 474) przez szczepienie (ocz-kowanie).

Kalina (*Viburnum opulus*) (fig. 475), o liściach trójkłapowych, kwiatach białych, drobnych, zebranych w tarczę, jagodach czerwonych. Jedna z odmian kaliny ma kwiaty zebrane w duże bukiety i nosi nazwę *kuli śnieżnej* (*Boule de neige*), owoców nie wydaje. Kalina jest to krzew bar-



Fig. 475. Gałązka kaliny z kwiatami a; b—owoc.

dzo lubiany i często spotyka się w pieśniach naszego ludu.

A któż nie zna prześlicznego wiersza Lenartowicza, zaczynającego się od słów:

Rosła kalina z liściem szerokim,
Nad modrym w gaju rosta potokiem:
Drobny deszcz piła, rosę zbierała,
W majowym słońcu liście kapąta;
W lipcu korale miała czerwone,
W cienkie z gałązek włosy wplecione.
Tak się stroiła, jak dziewczę młode,
I jak w lustro, patrzyła w wodę.
Wiatr co dnia czesał jej długie włosy,
A oczy myła kroplami rosy...

V. Drzewa i krzewy stref gorących.

301. Do najpiękniejszych drzew zwrotnikowych, a wielce użytecznych dla człowieka należą **Palmy**. Wyróżniają się



Fig. 476. Pień palmy: A—na powierzchni widać ślady dawnych liści; B—przecięcie poprzeczne; C—przecięcie podłużne, wykazujące przebieg wiązek.

one postacią swoją od naszych drzew. Pień ich (fig. 476) wysoki, jednostajnej grubości, nierozgałęziony, zakończy się u szczytu pękiem liści najczęściej bardzo wielkich.

Na przecięciu poprzecznym pnia (*kłodziny*)

palm, również jak i innych drzew jednoliścieniowych, nie widzimy słoików rocznych, jak u drzew naszych; cała powierzchnia jego usiana jest punkcikami; są to wiązki, utworzone z naczyń i włókien, które od korzenia do liści płynnie woda, niosąca pożywne części z gruntu. Fig. 476, C pokazuje na przecięciu podłużnym spleciony przebieg tych wiązek skierowany ku śladom dawnych liści, które opadały stopniowo, w miarę tego, jak palma rosła na wysokość; ślady te możemy dostrzedz

na jej powierzchni (fig. 476, A). U roślin dwuliścieniowych wiązki naczyniowe zebrane są w jedną masę drewna, tu zaś rozrzucone zosobna w całym pniu (fig. 476, B).

Następujące opowiadanie da najlepsze pojęcie o tem, jak wielostronne korzyści z palm odnoszą mieszkańcy podzwrotnikowi:

„Pewien wędrowiec przebiegał te krainy pod niebem pałacem, gdzie świeżość i zieloność są tak rzadkie i gdzie tylko w znacznych odległościach spotykają się mieszkania ludzkie, w których można znaleźć spoczynek, tak konieczny po utrudzającej podróży. Zmordowany i zadyszany spostrzega chatkę, otoczoną kilku drzewami o pniu prostym, wysokim, zakończonym obszerną wiechą bardzo wielkich liści, z których jedno wzniesione, drugie zwisłe, sprawiały miły widok. Nie zresztą nie oznajmiało, iżby około tej chatki zajmowano się uprawą ziemi.

Na widok ten ożyła w nim nadzieja; dobywa więc ostatnich sił i wkrótce znajduje się pod gościnnym dachem. Gospodarz częstuje go naprzód napojem kwaskowym, który go orzeźwia i gasi pragnienie. Gdy cudzoziemiec wypoczął, gospodarz prosi go, aby z nim podzielił posiłek; zastawił przed nim kilka potraw w naczyniach brunatnych, gładkich i lśniących, częstował go następnie winem, nadzwyczaj przyjemnego smaku, a ku końcowi biesiady podał gościowi swemu soczyste konfitury, i prosił go, aby również skosztował wybornej wódki.

Zdziwiony tem wędrowiec zapytuje gospodarza swego, ktoby mu wśród tej pustyni dostarczył tylu wybornych rzeczy?

— Kokosy moje! — odpowiedział. — Napój, którym ugasiłeś pragnienie, skoroś przyszedł, otrzymuje się z owocu, nim ten dojrzeje, a z kilku takich orzechów można go dostać trzy do czterech kwart. Ten migdał tak wytwornego smaku jest dojrzałym owocem kokosu; mleko zaś, które piłeś, znajduje się w jego wnętrzu. Ta kapusta delikatna — jest to młodo-ciany wierchołek kokosu; lecz nie często się jej używa, gdyż palma, z której się to ścina, prędko umiera. Wino, które piliśmy, otrzymuje się z nacięć młodych pochwic kwiatowych; płynie z nich w podstawione naczynie czysty sok, znany pod nazwą *wina palmowego*. Wystawiony na działanie słońca, kwaśnieje i daje ocet, przez dystylację otrzymuje się

zeń wyborna wódka. Z tegoż soku wyrabiam cukier do konfitur, które otrzymuję z orzecha. Wreszcie te wszystkie naczynia stołowe zrobione są ze skorupy orzecha. Lecz nie dość na tem: całe mieszkanie moje zawdzięczam tym szacownym palmom. Drzewo ich posłużyło mi do zbudowania tej chaty, liście zeszcłe i splecione stanowią jej dach; ułożone w kształcie parasola, zabezpieczają mnie od skwaru słonecznego w moich przechadzkach; odzież moja utkana jest z włókien tych liści; te maty, do tylu użytków służące, również z nich pochodzą. Sita, które tu widzisz, znajduję już gotowe w tej części kokosu, z której liście wychodzą; z tychże liści, właściwie splecionych, otrzymuję żagle do statków; mocne włókna, pokrywające orzech, są daleko lepszym materiałem od zwyczajnych kłaków do zatykania szpar w łodziach, nie pęcznieją i nie gniją tak łatwo od wody. Wyrabiam z nich także szpagat, powrozy i wszelkiego rodzaju liny. W końcu dodać winienem, że delikatna oliwa, którą przyprawiono nasze potrawy i która także pali się w lampie, otrzymuje się przez wytłaczanie świeżych jąder kokosowych.”



Fig. 477. Palma kokosowa.




Fig. 4.8.
Owoc palmy
kokosowej.

Cudzoziemiec słuchał z podziwieniem, jak ubogi ten człowiek, mający jedynie palmy kokosowe, otrzymywał z nich przecież wszystko, co tylko było mu potrzebne. Gdy podróżny odchodził, gospodarz rzekł mu: — „Chciałbym napisać parę słów do przyjaciela mego w pobliższym miasteczku; proszę abyś mu doręczył mój list.” — „Bardzo chętnie, a zapewne kokos dostarczy ci materiałów do pisania?” — „Tak jest — odpowiedział tenże — z trocin gałęzi wyrabiam atrament, a z liści pargamin; niegdyś używano go wyłącznie do spisywania aktów publicznych i do zapisywania pamiętnych wydarzeń” *).

Palma kokosowa (*Cocos nucifera*) (fig. 477), jest owem

*) Z Botaniki B. Guizota.

cudownem drzewem, z którego gośpodarz naszego wędrowca otrzymał wszystko, co mu potrzeba. Dosięga ona 20 stóp wysokości; orzechy (fig. 478) są wielkości głowy ludzkiej. Palma kokosowa uprawia się we wszystkich krajach zwrotnikowych.

Niemniej liczne korzyści przynosi człowiekowi **Palma daktylowa** (*Phoenix dactylifera*), należąca przytem do najkształtniejszych drzew (fig. 479). Rośnie przeważnie w Afryce północnej i Arabji, w oazach pustyni „ką-



Fig. 479. Palma daktylowa.



Fig. 480. Owoc palmy daktylowej.



Fig. 481. Palma sagowa.

piąc swe stopy w wodzie, a głowę zanurzając w ogniu niebieskim,” jak mówią Arabowie w swym malowniczym języku. Prócz owoców, które w stanie suszonym znane są u nas jako *daktyle* (fig. 480), a które jadane w przeróżnej formie, stanowią często całe pożywienie Araba i jego wielbłąda, otrzymuje się z palmy, za nacięciem pnia, płyn słodki zwany *mlekiem palmowem*, który przy fermentacji daje alkohol. Drzewo i liście używane są na rozmaite wyroby.

Palmy sagowe (*Sagus Rumphii* i *S. laevis*) (fig. 481), rosnące na wyspach oceanu Spokojnego, zawierają w pniu rdzeń obfity w mączkę bardzo pożywną, która przyrządzona w kulki podobne do kaszy perłowej, znana jest w handlu pod nazwą *sago* i ugotowana używa się na potrawę.

Słocza cukrowa (*Arenga saccharifera*) rośnie na wyspach Sundzkich. Nacięte jej pochwy kwiatowe dają słodkie i przyjemne wino; z rdzenia otrzymuje się mąkę.

Zbliżony do palm jest **Banan** (*Musa*) (fig. 482), drzewo o liściach olbrzymich, zwykle poszarpanych i mączastych, o słodkich, smacznych owocach, wielkości i kształtu ogórka, które w rozmaity sposób przyrządzane, dają wyborne pożywienie i napój orzeźwiający. U nas hodowany w cieplarniach.



Fig. 482. Banan; *a*—drzewo z gronem owoców, *b*—owoc pojedynczy.

303. Z innych drzew zwrotnikowych niezrównane jest pod względem użyteczności **Drzewo chlebowe** (*Artocarpus incisa*) (Tab. XIV, fig. 6), pochodzi ono z wysp oceanu Spokojnego, a uprawia się obecnie w wielu krajach podzwrotnikowych. Owoce jego wielkości głowy ludzkiej, ważące 3 — 4 funt., jadane są smażone lub gotowane; mają smak podobny do chleba. Zmieszane z mlekiem kokosowym dają ciasto, które jadane jest su-

rowe lub wypiekają z niego chleb. Z drewna budują domy; z łyka tkają odzienie, sok mleczny jego daje rodzaj kleju, wielkie liście służą za obrusy, a wysuszone kotki kwiatowe są doskonałą hubką. Trzy drzewa wystarczają na wyżywienie dorosłego człowieka w ciągu roku.



Fig. 483. Otrzymywanie soku z pnia mleczodrzewu.

Zbliżony do chlebowca jest **Mleczodrzew gujański** (*Galactodendron utile*), zwany także *krowiem drzewem*; za nacięciem pnia sączy się z niego smaczny płyn mleczny (fig. 483), z którego robią sery, będące głównem pożywieniem mieszkańców.

Tu należy także **Figowiec** (*Ficus Carica*), pochodzący z Azji mniejszej, lecz od niepamiętnych czasów uprawiany w Europie południowej

dla owoców, które jadamy suszone pod nazwą *fig* (fig. 484), owoce te są zrosniętym osadnikiem kwiatowym z licznymi owockami (niełupkami) w środku. Jeden z gatunków figowca t. zw. **Fikus** cz. **Figowiec**

elastyczny (fig. 485) zawiera w łodygach sok mleczny, zastygający w powietrzu, znany w przemyśle pod nazwą *kauczuku* albo *gutaperki*. U nas pospolicie hodowany w wazonach. Liście ma duże, całe, skórzaste. Inny znowu gatunek figowca t. zw. **świętnicowy** (*Ficus religiosa*) (fig. 457, str. 265), dostarcza żywicy zw. *szellakiem*, używanej do poligrafii. Drzewo to dochodzi wielkich rozmiarów i odznacza się tem,



Fig. 484. Gałązka figowca zwyczajnego z owocem.



Fig. 485. Figowiec elastyczny.

że z gałęzi wypuszcza mnóstwo *korzeni przybyszowych* (podobnie jak znany wszystkim hodowany u nas *filodendron*), korzenie te wrastają w ziemię, tworząc bardzo rozległą kolumnadę, i w cieniu jej Indjanie budują sobie świątynie.

304. Wiele też innych drzew stref gorących dostarcza przeróżnych produktów codziennie przez nas używanych.

Tak np. **Pieprz czarny** (*Piper nigrum*) (Tab. XIV, fig. 2) rośnie w całej strefie podzwrotnikowej, głównie zaś uprawiany jest w Indjach. Jagody jego zebrane po 20 — 30 w kłos, są początkowo zielone, później czerwone, nareszcie czarne. Pieprz czarny otrzymuje się z niedojrzałych jagód; biały zaś z dojrzałych, które moczone są w wodzie, aby utraciły czarną skórkę.

Goździkowiec korzenny (*Caryophyllum aromaticum*) (Tab. XIV, fig. 3), rośnie przeważnie na wyspach Moluckich; liście ma nieopadające, kwiaty białe z kielichem czerwonym. Zbierają je jeszcze nierozwinięte i suszą w celu otrzymania t. zw. „goździków” znanych każdemu jako przyprawa kuchenna,

Handel goździkami wynosi wiele milionów rocznie; niegdyś prowadzili go wyłącznie Holendrzy i do tego stopnia byli chciwi na zyski, że owałdnawszy Mollukami, spalili wszystkie, wspaniale utrzymane przez mieszkańców tych wysp plantacje goździków i zapasy towaru gotowego, wartości milionów, ażeby nie dopuścić do sprzedaży innym kupcom (zwłaszcza angielskim). Potem przeznaczili każdemu plantatorowi pewną ilość drzew goździkowych i ile rocznie ma zbierać goździków, i nikt pod surową karą, nie śmiał mieć więcej.

305. **Drzewo kawowe** (*Coffea arabika*) (fig. 486) ma liście zawsze zielone, jajowate, siedzące: dosięga 30 — 40 stóp wysokości. Rośnie w Azji i w Afryce półn. Kwiaty wonne, białe, siedzą w kątach liści. Owoc—jagoda czerwona wielkości wiśni, zawierająca po dwa ziarna, które znane są pod nazwą *kawy*; napar z nich używany jest jako napój orzeźwiający. Produkcja roczna kawy wynosi przeszło 1000 milionów funtów, z których połowa zużywa się w Europie, gdzie wprowadzoną w użycie została w XVII stuleciu. Najlepsza kawa jest arabska (mokka).



Fig. 486. Gałązka drzewa kawowego z kwiatami i owocami, i owoc odstępiony do połowy.

Krzew herbaciany (*Thea chinensis*) (Tab. XIV, fig. 5), rośnie dziko i uprawiany w Chinach i Japonji. W celu otrzymania lepszych liści wstrzymują sztucznie wzrost krzewu, aby nie przewyższał wysokości 4-ch stóp. Kwiaty ma białe bezwonne, owoc jest torebką, zawierającą 2—3

ziarna wielkości pestki wiśniowej. Z owocu tego wyciska się dobry olej. Głównym celem hodowli krzewu herbacianego są liście, napar których używany jest pospolicie jako napój (herbata). Liście te zbierają i suszą na słońcu kilka razy do roku. Po wysuszeniu skrecają je rękami i w tej postaci wysyłają do handlu. Od sposobu suszenia i skrecania liści zależą gatunki herbaty. Z bardzo delikatnych listków, rozwijających się w lutym i marcu, otrzymuje się naj-

droższa herbata „królewska.” Używanie herbaty rozpowszechnione jest w Azji od niepamiętnych czasów. Przed 280 laty Holendrzy wprowadzili ją do Europy, która teraz zużywa herbaty około 100 milionów funtów rocznie.

Kakaowiec (*Theobroma cacao*) (fig. 487), drzewo rosnące w Ameryce, ma duże liście i owoce kształtu podobnego do ogórków, w nich znajdują się wewnątrz liczne duże ziarna, zawierające tłuszcz, znany pod nazwą *masła kakaowego*. Odtłuszczone i zmielone ziarna dają *kakao w proszku*, używane jako napój pożywny; z nich też przez dodanie cukru i wanilii otrzymuje się *czekoladę*. Łupinki kakaowe służą również do przygotowania napoju podobnego do kakao.




Fig. 487. Gałązka kakaowca: A—kwiaty B—owoce, C—owoc przecięty.

Cynamonowiec Cejloński (*Cynamonum zeylanicum*) (fig. 488) jest drzewem, rosnącym na Ceylonie, w Chinach południowych i innych krajach gorących. Kora młodych gałązek jego, wysuszona, używana jest jako przyprawa do potraw pod nazwą *cynamonu*. Zdzieranie tej kory odbywa się dwa razy do roku z drzew starszych nad 3 lata. Po wysuszeniu wiążą kawałki kory w pęczki i wysyłają do handlu. Z odpadków robi się *olejek cynamonowy*.

Wanilja (*Vanilla planifolia*), roślina pnąca się, rośnie w krajach zwrotnikowych Ameryki i Azji; owoce jej, długie torebki, mają bardzo silny zapach i dlatego, wysuszone, używane są jako przyprawa.



Fig. 488. Cynamonowiec cejloński.

VI. Rośliny warzywne.

306. Najważniejszą z roślin warzywnych, stanowiącą podstawę pożywienia ubogiej ludności u nas, stanowi **Ziemniak**



Fig. 489. Krzak kartofli z bulwami.

czyli **Kartofla** (*Solanum tuberosum*) (fig. 489). Jadalne części *bulwy* są nabrzmieniami podziemnej łodygi i zawierają obficie nagromadzoną mączkę. Bulwy te służą i do rozmnażania kartofli, zawierają bowiem *oczka*, które są pączkami i gdy bulwa znajduje się w wilgotnym i dość ciepłym miejscu, pączki te wyrastają w pędy; z każdej bulwy można otrzymać tyle nowych roślinek, ile ona ma oczek.

Ziemniak ma kwiaty brudno-białe, zebrane w wiechę; wyglądają one jak 5-o ząbkowe tacki, na których sterczą żółte pręciki do siebie przytulone (fig. 490). Owoc jest jagodą barwy sinawo-zielonej, dochodzi czasem dość dużych rozmiarów (fig. 491), jest niesmaczny i gorzki, a nawet trujący. Z owocu rzadko rozmnaża się kartofle, gdyż o wiele prędszym i lepszym jest rozmnażanie za pomocą bulw.



Fig. 490. Gałązka z kwiatem ziemniaka.



Fig. 491. Owoc ziemniaka.

Z bulw kartoflanych otrzymuje się *mączkę* czyli *krochmal*; dość jest w tym celu zetrzeć ziemniaki na tarce, (ażeby rozmiadzić ich tkanki) i następnie miazgę przepłukać kilkakrotnie wodą na gęstem sitku. Woda wypłukuje mączkę, która następnie z niej osiada na dno. Przepłukawszy ją kilka razy

stępnie z niej osiada na dno. Przepłukawszy ją kilka razy

wodą, którą zlewać trzeba ostrożnie, po odstaniu otrzyma się czystą mączkę. Mączka ta czyli krochmal składa się z ziarenek bardzo drobnych, widzialnych wyraźnie tylko pod mikroskopem. Oprócz pożywienia i krochmalu z bulw kartoflanych, otrzymuje się jeszcze spirytus.

Nie odrazu jednak kartofle zostały przyjęte do powszechnego użytku; zanim oswojono się z tą nową potrawą, upłynęło dużo czasu. Ojczyzną ziemniaka jest Ameryka. Przy odkryciu Ameryki spotykano tę jarzynę we wszystkich jej krajach umiarkowanych, a zwłaszcza w Chili i Peru pod nazwą *papas*. Przywiezione do Europy w końcu XVI stulecia, były przyjęte z wielkiem niedowierzaniem, tak, że dopiero w 1616 r. podano je jako osobliwość na stół Ludwika XIII we Francji. Gdy przekonano się wreszcie o dobroci i pożywności kartofli, zaczęto je w drugiej połowie XVIII stulecia i u nas uprawiać; a gdy głód, który nastąpił podczas Rewolucji francuskiej zmusił lud do szukania nowych środków pożywienia, kartofle zastąpiły nieurodzaj zboża i stały się podstawą pożywienia ubogiej ludności, tak dalece, że gdy w r. 1845 ukazała się w Irlandji choroba tej rośliny, spowodowana przez grzybek pasorzytny (*Zarazik kartoflowy*—*Peronospora infestans*), niszczący plantacje jej ze straszną szybkością, było to prawdziwą klęską dla ludności tej wyspy.

Do tegoż rodzaju roślin, co kartofle, należy **Pomidor** (*Solanum Lycopersicum*), którego duże, czerwone, kwaskowate jagody służą do sporządzania zup, sosów i t. p.

307. **Marchew** (*Daucus carota*) (fig. 492), jest rośliną dwuletnią, to znaczy, że w pierwszym roku wydaje tylko korzenie, łodygi i liście nagromadza w korzeniu materiał zapasowy, a dopiero w drugim roku na wiosnę wydaje kwiaty i owoce, przyczem zużywa materiał zapasowy korzenia, który wskutek tego cienieje. Kwiaty ma drobne, zebrane w baldachy, liście duże, złożone z drobnych listków gęsto powycinanych. Korzeń wrzecionowaty, soczysty. Są liczne odmiany marchwi; jedna z nich (czerwona) uprawiana jest pospolicie na jarzynę. Odmiana biała używana jest na paszę dla bydła.



Fig. 492. Korzeń, liść i kwiaty marchwi.

Do tej samej rodziny roślin należą: **Pietruszka**, roślina także dwuletnia, uprawiana dla pachnących liści i korzeni, służących za przyprawę do potraw.

Seler (*Apium*) o korzeniu białym i grubym (fig. 494),



Fig. 493. Seler z rozwiniętymi ogonkami liściowymi.



Fig. 494. Seler z rozwiniętym korzeniem.



Fig. 495. Koper.

kształtu kulistego, używany również na przyprawę do potraw; ogonki liściowe selera (fig. 493) są także jadalne.

Kminek (*Carum carvi*) o listkach pierzastych, całych.

Koper (*Anethum graveolens*) (fig. 495), ma listki drobne, gęsto powycinane, silnie pachnące. Obydwa gatunki używane są jako przyprawa do potraw, jak również i ich nasiona; koper ma kwiatki żółte, kwitnie od lipca do września.

Anyż cz. Biedrzeniec (*Pimpinella*) rośnie w Europie połudn.; u nas uprawiany dla nasion, używanych jako przyprawa do chleba, wódki i t. p.

308. **Kapusta** (*Brassica oleracea*) jest także rośliną dwuletnią: w pierwszym roku nagromadza tylko zapas pożywienia bądź w liściach, bądź w korzeniu lub w pąkach, w drugim roku wydaje kwiat i owoc



Fig. 496. Kapusta brukselska.

(luszczyne). Wtedy kapusta, nazwana przerośniętą, jest niezdatną do jedzenia. Kapusta obejmuje wiele gatunków, uprawianych jako rośliny pokarmowe. W tym celu starają się ogrodnicy otrzymać albo silnie rozwinięte pączki liściowe, jak u wielu odmian *kapusty głowiastej* (fig. 497), do których należy np. *kapusta kolorowa*, *kapusta brukselska* (fig. 496), *kapusta włoska*; albo też jadalne są pączki kwiatowe jak np. w *kalafjorze* (fig. 498), lub wielki mięsisty korzeń, jak w *brukwi* (fig. 499), lub wreszcie dolna część łodygi rozrasta się bardzo silnie i służy jako pożywienie, np. *kalarepa* (fig. 500).



Fig. 497. Kapusta głowiasta. Fig. 498. Kalafjor

Do tej samej rodziny należą jeszcze:

Rzepa (*Rapa*) (fig. 501), której niektóre odmiany uprawiają głównie dla nasion, zawierających olej.

Rzepak (*Brassica napus*) (fig. 502) z którego nasion tłoczą olej rzepakowy. Kwitnie żółto.

Gorczyca (*Sinapis nigra*), mająca nasiona olejiste, z których wyrabiają musztardę i przygotowują z nich synapizmy.

Chrzan (*Cochlearia armoracea*) rośnie dziko po ogrodach i na polach; ma liście duże, siedzące. Korzeń jego zawiera sok gryzący i dla tego używają go jako przyprawy do potraw.



Fig. 499. Brukiew. Fig. 500. Kalarepa.

Rzodkiew (*Raphanus sativus*) (fig. 503), o korzeniu długim, białym; odmianę jej stanowi *rzodkiewka*, mająca ko-



Fig. 501. Rzepa. Fig. 502. Rzepak: kwiat i owoc. Fig. 503. Rzodkiew.

rzeń bardziej kulisty, czerwony. Obie odmiany są jadalne, a ostry smak korzenia przyczynia się do trawienia i dodaje apetytu.

309. **Burak** (*Beta vulgaris*) jest również, jak marchew, rośliną dwuletnią, nagromadzającą w soczystym korzeniu ma-



Fig. 504. Groch. Fig. 505. Strączek grochu. Fig. 506. Soczewica.

terjały zapasowe, które służą w drugim roku za pożywienie rozwijającym się wtedy kwiatom i owocom. Korzenie te są bardzo pożywne i w tym celu wrywają je w pierwszym roku, nie dopuszczając do rozwoju kwiatów i owoców. Odmianę

buraka stanowi *burak cukrowy*, zawierający w soku swoim wielką ilość cukru i dla tego używany do fabrykacji cukru. (Ob. niżej: Rośliny przemysłowe).

Fasola (*Phaseolus vulgaris*), **Groch** (*Pisum sativum*) (fig. 504 i 505) i **Soczewica** (*Ervum lens*) (fig. 506), również jak i **Bób** (*Vicia faba*) (fig. 507) należą do obszernej rodziny roślin strąkowych, których owoce mają kształt strączków (fig. 505).



Fig. 507. Bób.



Fig. 508. Cebula.



Fig. 509. Cebula
hijacynta w przecięciu.

Są one bardzo pożywne: ziarna ich bowiem zawierają wiele substancji białkowej, ale są trudne do strawienia. Rośliny te różnią się pomiędzy sobą tak zewnętrznym wyglądem, jak kształtem i wielkością strąków i nasion.

310. **Czosnek** (*Allium sativum*) i **Cebula** (*Allium cepa*) (fig. 508), są to rośliny warzywne, należące do roślin jednoliściennych; cebule ich są jadalne. Cebula ta jest to podziemna łodyga, zaopatrzona w mięsiste, gęsto leżące jeden na drugim liście (łuski cebuli), w których nagromadzają się materiały pożywne i które otulają pęczek, znajdujący się w samym środku u szczytu. Skoro tylko na wiosnę posadzimy cebulę, puszcza ona korzonki, a pęczek ten rozwija się kosztem materiałów zapasowych łuski cebuli i wyrasta w kwiat i nasienie. Przekroiliśmy cebulę wzdłuż (fig. 509), łatwo dostrzeżemy łuskowaty układ jej liści i wyrastającą wypustkę kwiatów. Cebulę ma wiele roślin jednoliściennych.

wych, jak *hjacynt*, *liłja*, *tulipan* i t. p., również **Pory** (fig. 510) używane jako przyprawa do potraw, podobne z liści do cebuli, o słabym zapachu.

Szparagi (*Asparagus*) mają podziemną łodygę t. zw. *kłą-*



Fig. 510. Por.




Fig. 511. Wiązka szparagów.



Fig. 512. Ulistniona łodyga szparaga z owocami.

cze, z którego na wiosnę wyrastają młode pędy w postaci paluszków (fig. 511). Tę postać rośliny znamy powszechnie pod nazwą szparagów i używamy na jarzynę. Z pędów tych wyrastają gałązki pokryte drobnymi zielonemi gałązeczkami (fig. 512); na nich rozwijają się drobne kwiatki i jagody czerwone. Szparagi uprawiane są na wielką skalę w tak zw. *szparagarniach*, gdzie je sadzą szeregi.



Fig. 513. Salsefja.

311. Do pospolitych warzyw należy także **Salata** (*Lactuca*), która hodowana jest w różnych odmianach dla smacznych liści, niektóre z tych odmian tworzą głowę (podobnie jak kapusta), ze środka której ku jesieni wyrastają kwiaty; wtedy salata jest niezdatną do jedzenia. Salata należy do rodziny roślin *złożonych*, o czem mowa będzie później.

Z tej samej rodziny używana jest na jarzynę i **Salsefja** cz. **korzonki owsiane** (fig. 513), której korzenie ugotowane mają smak podobny do szparagów.

Do roślin warzywnych zaliczamy też: **Kawony** cz. **Arbuzy** (fig. 514), uprawiane w wielkiej ilości w południowej Rosji, gdzie rosną też dziko; **Melony** (fig. 515) sprowadzane prze-



Fig. 514. Kawony.



Fig. 515. Melony.



ważnie z krajów południowych, u nas także hodowane, ale tylko w inspektach; **Ogórki** (fig. 516), u nas uprawiane na wielką skalę, na marynowanie, na *korniszony*, które są małymi ogórkami lub na *nasienniki*, t. j. zupełnie dojrzałe ogórki, służące do rozsiewania. Ogórki mają kwiaty duże, dzwonkowate, żółte. **Dynie** (fig. 517) pochodzą z Indji, gdzie



Fig. 516. Ogórek.



Fig. 517. Dydia.

wyrabiają z nich żółte naczynia i znane są jako *tykwy* maczugowatej postaci, lub *banie* wielkie, okrągłe, używane na paszę dla bydła. Wszystkie te rośliny należą do rodziny *dyniowatych*; mają one łodygę czołgającą się po ziemi, niektóre z wąsami do czepiania się, liście szorstkie, kwiaty dzwonkowate, owoce *jagody* o twardej grubej skórce i soczystym mięsiwie, w którym są liczne pestki.

VII. Rośliny przemysłowe.

312. Prócz roślin, których owoce, korzenie, liście lub inne części, a także w całości, człowiek spożywa, znaczną ich ilość uprawia dla pewnych produktów, które otrzymuje przez przeróbkę ich części. Takie rośliny nazywamy *przemysłowymi*. Główne produkty, otrzymywane wogóle z roślin, są: 1. *mąka* z ziarn lub *mączka* z innych części roślin; 2. *cukier*; 3. *oleje*; 4. *drewno*; 5. *włókna*. Prócz tego z wielu roślin otrzymuje się *barwniki* (*rośliny farbierskie*), z innych składniki trujące i lecznicze (*rośliny lekarskie*), używane w medycynie. Rośliny uprawiane dla ziarn, nazywamy *rolniczymi*; *drzewa leśne* dostarczają wogóle drzewa na budulec, na opał i na wyroby stolarskie. Do przemysłowych właściwie zaliczamy rośliny włókniste, cukrowe, oleiste i farbierskie; rośliny włókniste odznaczają się tem, że mają pod zieloną korą liczne włókna, towarzyszące wiązkom naczyniowym i stanowiące *łyko*. Te włókna bardzo mocne dają najlepszy materiał do tkanin.



Fig. 518.
Gałązka lnu.

313. **Len** (*Linum sativum*) (fig. 518) roślina zielna o niebieskich kwiatach, uprawiana od niepamiętnych czasów, dostarcza włókien, z których tkają włókna na bieliznę. Włókna te są delikatne, żółtawe, a po bieleniu przyjmują barwę białą czystą. W celu otrzymania włókien wrywają rękami z ziemi roślinki lnu, po okwitnieniu i wymłacają nasienie za pomocą uderzeń kijanką, albo czesząc na żelaznych grzebieniach t. zw. *dzierzglicy*; potem układają go wiązkami w wodzie, gdzie moknie, aby włókna łykowe oddzieliły się od części drzewnych, które w wodzie gniją. Następnie suszą len na słońcu i w celu zupełnego oddzielenia włókien od przegnitych części czyli *paździorów*, miazdzą go na tak zwanej *międzicy*. Jest to deska z rowkiem,

w którą kładzie się wiązki lnu; w środku przymocowany jest ruchomy miecz drewniany, którym się len tłucze. Wskutek tego drewno wypada, a pozostają czyste włókna, które następnie *czeszą* za pomocą żelaznych szczotek. To co zostaje



na szczotkach, idzie na grubsze tkaniny; z cienkich zaś i długich włókien *przędą* nici, z których następnie tkają lepsze gatunki płócien. Z nasion lnu wyciskają olej.

Konopie (*Cannabis sativa*) (fig. 519) roślina pochodząca z Indji, jednoroczna, dochodzi do 2 m. wysokości, liście ma duże, palczasto - dzielne. Kwiaty pręcikowe i słupkowe umieszczone są na osobnych roślinkach. Rośliny z kwiatami pręcikowymi nazywają się *płoskun-kami*, ze słupkowymi — *głowatkami*. Owocem jest mały orzeszek, z którego wyciskają olej konopiany. Z łodygi otrzymuje się włókna mocniejsze niż lniane, lecz mniej delikatne. Używają ich na grube płótna (żaglowe), na liny, papier i t. d. Przyrzadzanie przędzy z konopi odbywa się podobnie jak z lnu.



Fig. 519. Konopie i gałązka głowatki; obok na lewo kwiat ploskunki.

Krzew bawełniany (*Gossypium herbaceum*) (Tab. XIV, fig. 7), jest jedną z najważniejszych roślin przemysłowych, uprawianą w krajach gorących. Jest to krzew wysoki do 2 m. Na tkaniny używa się nie włókien z łodygi, jak w poprzednich roślinach, lecz nasion. Owocem bowiem jest tu torebka, w której nasiona opatrzone są włosiem białym, miękkim, wychodzącym w postaci *waty* z pękającej dojrzałej torebki. Watę tę oddziela się od nasion za pomocą osobnej maszyny i przyrządza się z niej watę zdatną do użytku; przerabiają ją też w *przędzalniach* na nici, z których następnie tkają tkaniny bawełniane (perkale, barchany i t. p.). Z nasion wyciskają olej.

314. Do dobywania cukru u nas używany jest wyłącznie **Burak cukrowy** (fig. 520). Buraki te muszą być w maszynie pokrajane i stłuczone na miazgę; miazgę tę wyciskają następnie w wor-



Fig. 520. Burak cukrowy.

kach płóciennych za pomocą silnej prasy. Ze stu funtów buraków otrzymuje się do 80 funtów soku, który następnie oczyszczają, gotując go z niewielką ilością wapna i przecedzając przez węgiel kostny. Otrzymaną ciecz bezbarwną zagęszcza się szybko w osobnych kotłach i z niej osiadają kryształy cukru. Kryształy te nie są zupełnie czyste; dla oczyszczenia (rafinowania) znowu rozpuszczają je w wodzie i mieszają z węglem kostnym i krwią wołową, a następnie przesączają przez bawełniane sączki i zagęściwszy na ogniu, wlewają do form. W ten sposób otrzymuje się głowy cukru.

W krajach zwrotnikowych otrzymują cukier z **Trzciny cukrowej** (*Tab. XV, fig. 16*), rośliny trawiastej, podobnej nieco z wyglądu do naszej trzciny pospolitej. Trzinę cukrową



Fig. 521. Zbiór trzciny cukrowej.



Fig. 522. Kwiat maku, pączek i niedojrzała makówka.

uprawiają tam na wielką skalę; przed kwitnieniem ścinają ją (fig. 521) i prasują między dwoma walcami metalowymi, które wyciskają z niej sok. Następnie sok ten oczyszczany jest w podobny sposób jak buraczany.

W Ameryce północnej a zwłaszcza w Kanadzie, otrzymuje się cukier z **klonu cukrowego**, drzewa, które za nacięciem kory daje wielką ilość słodkiego soku. Podobnie w Indjach wyrabiają cukier z soku **palmy cukrowej**. W Stanach Zjednoczonych Ameryki uprawiają w tym celu **Sorgo** czyli **Prosian-**

kę cukrową (*Sorgho saccharatum*); wyciskają z niej sok podobnie jak i z trzciny cukrowej.

315. Z roślin olejnych poznaliśmy już niektóre: *leszczynę*, *len*, *konopie*, *rzepak*. Prócz tych otrzymuje się u nas olej z nasion **Maku ogrodowego** (*Papaver somniferum*) (fig. 522) hodowanego często w ogrodach; wyrasta on przeszło na dwa łokcie wysokości. Liście ma sino-zielone, mięsiste, kwiat duży o delikatnych płatkach korony, różnobarwnych, prędko opadających; owocem jest torebka (*makówka*) pełna nasion i otwierająca się po dojrzeniu u góry otworkami (fig. 523). Pączki kwiatowe maku są zwieszane i wyprostowują się wtedy, gdy kwiat ma się rozwinąć.

Olej wyciskany z nasion maku używa się do potraw i farb olejnych, również jak i poprzednio wymienione gatunki oleju. Ten sam gatunek maku rosnący w strefach gorących, zawiera w torebkach niedojrzałych sok mleczny z substancją trującą, działającą usypiająco. Sok ten skrzepły stanowi lekarstwo, znane pod nazwą *opjium*. Dla otrzymania go nacinają niedojrzałe makówki: sok wypływa i zgęszcza się w niewielkie kropelki, które następnie zbierają.

U nas rośnie dziko w zbożach i na polach **Mak polny** (*P. rhoeas*) o kwiatach czerwonych.

Oliwka cz. **Drzewo oliwne** (*Olea europaea*) (fig. 524) rośnie na południu Europy; owoce jej kształtu małych śliweczek, przywożone do nas pod nazwą *oliwek*, dają przy wyciskaniu *oliwę*, którą używamy do potraw. Drewno używa się na różne wyrcby.

Wiele też olejów roślinnych dostarczają rośliny zwrotnikowe, jak palma kokosowa i inne. Używane są one przeważnie na mydła.

316. **Chmiel** (*Humulus lupulus*) (fig. 525) jest rośliną wijącą się: kwiaty pręcikowe i słupkowe są na oddzielnych roślinach. Kwiaty słupkowe mają postać szyszek o łuskach zielonawych, pokrytych substancją żywiczną, gorzką, w po-



Fig. 523. Makówka dojrzała, której ściankę otwarto dla pokazania wnętrza.



Fig. 524. Gałązka drzewa oliwnego z owocem

staci żółtego proszku. Dla tej to żywicznej substancji uprawiają chmiel na wielką skalę w t. zw. chmielarniach, gdyż szyszki takie, dodane do piwa, nadają mu przyjemny smak i woń. Chmiel był rośliną świętą u Słowian dawnych i Litwinów, i przez nich prawdopodobnie został przyswojony reszcie Europy; wzmiankę o nim spotyka się często w pieśniach i obrzędach weselnych ludu naszego.



Fig. 525. Gałązki chmielu z kwiatami pręcikowymi i słupkowymi.

Tytuń (*Nicotiana Tabacum*) (Tab. XIV, fig. 8), pochodzi z Ameryki, a teraz uprawiany jest w wielu krajach dla liści, z których robią cygara, papierosy i tabakę. Używanie tytoniu rozpowszechniło się nadzwyczaj szybko, pomimo zaka-

zu niektórych rządów, a z ogromną szkodą dla ludzi; palenie bowiem tytoniu oddziaływa bardzo szkodliwie na zdrowie, zwłaszcza na mózg i na serce.

Przyrządzanie tytoniu do palenia odbywa się w ten sposób: skoro zakwitnie, obrywają kwiaty, aby liście lepiej się rozwinęły, potem zielone liście obrywają i układają w kupki, następnie suszą na słońcu; całkowite liście zwijane są na cygara; krajane w paski idą na papierosy, a z odpadków robią tabakę. Dobroć tytoniu zależy od gatunku liści i od sposobu przyrządzania. Najlepsze gatunki rosną w krajach gorących. Najgorsze, używane na machorkę, w strefach umiarkowanych. U nas hodowany bywa w ogrodach dla ozdoby, gdyż ma ładne, duże, lejkowatego kształtu kwiaty białe lub różowe.

316. Cykorja czyli Podróżnik (*Cichorium Intybus*) (Tab. XIV, fig. 9), rośnie po drogach i pustkowiach; kwitnie jasnoniebiesko. Korzeń jej suszony i spalony, a następnie utarty, stanowi powszechnie używany dodatek do kawy.

Lukrecja (*Glycyrrhiza glabra*) (Tab. XIV, fig. 10); rośnie dziko w Europie południowej, kwiaty ma różowe, podobne z kształtu do fasoli, zebrane w grona; uprawiają ją gdzieniegdzie dla otrzymania słodkiego soku z korzenia,

z którego przyrządzają masę znaną pod nazwą *lukrecji*, używaną w lecznictwie.

Krokosz barwierski (*Carthamus tinctorius*) (Tab. XIX, fig. 11), pochodzi z Indji; uprawia się obecnie w Europie. Z kwiatów jego otrzymuje się barwnik żółty i czerwony; z nasion wyciskają olej.

Szafran (*Crocus sativus*) jest również uprawiany dla kwiatów, których potrójne znamiona słupka zasuszone, stanowią produkt znany w handlu pod nazwą *szafranu*. Zawierają one sok barwiący na żółto, oraz wonny olejek. Używają szafranu przeważnie jako przyprawy do potraw i farbowania tkanin. Do ozdobnych roślin naszych ogródków należy inny gatunek szafranu t. zw. **Krokus** (*Crocus vernus*) (Tab. XIV, fig. 13), kwitnący bardzo wcześnie na wiosnę.

Do roślin przemysłowych należy także **Dąb korkowy**, o którym była mowa na str. 250 i **Figowiec elastyczny**, dostarczający kauczuku (p. str. 277).

VIII. Rośliny pastewne.

317. Prócz ziół naturalnie rosnących na łąkach i pastwiskach, zasiewają umyślnie niektóre gatunki, należące przeważnie do roślin strąkowych; stanowią one dobrą paszę dla bydła. Wymienimy tu ważniejsze:

Koniczyna czerwona (*Trifolium pratense*), **K. biała** (*Tr. repens*) i **K. cielistą** (*Tr. incarnatum*) (fig. 526) niewielkie roślinki o liściach złożonych z trzech listków i drobnych kwiatkach, zebranych w główki.

Lucerna cz. Koziorożec siewny (*Medicago sativa*) (fig. 527), kształtem



Fig. 526. Koniczyna.



Fig. 527. Lucerna.

kwiatów i potrójnemi listkami zbliżona do koniczyny, różni

się owocami, które są różnie skróconemi strąkami; stanowi doskonałą paszę, wymaga jednak do uprawy nieco cieplejszego klimatu.

Esparseta czyli **Kokosznica siewna** (fig. 528), ma liście nieparzysto-pierzaste, złożone z wielu listków, kwiaty różowe, zebrane w kłos. Jest to roślina trwała, raz zasiana daje w ciągu kilku lat po dwa zbiory rocznie.



Fig. 528.
Esparseta.



Fig. 529.
Wyka.

Wyka siewna (*Vicia sativa*) (fig. 529) stanowi dobrą paszę, zwłaszcza dla wołów roboczych. Liście pierzaste, o wielu listkach, zakończone są wąsami, którymi wyka czepia się innych roślin; kwiatki fioletowe po dwa w kątach liści.

Komonica różkowata (*Lotus corniculatus*) (Tab. XIV, fig. 14), należy do bardzo cenionych naturalnych roślin łąkowych.

Gryka (*Fagopyrum esculentum*) (Tab. XIV, fig. 15), zasiewana w miejscowościach piaszczystych, niezdatnych dla zbóż; nasiona jej używane są na kaszę (*kasza czarna grecka*) i mąkę, również i do fabrykacji piwa lub wódki. Daje przytem bardzo pożywną paszę dla bydła. Kwiaty jej dostarczają pszczołom doskonałego materiału na miód.

IX. Rośliny trujące.

318. Na łąkach i w gajach naszych spotyka się niemało roślin, zawierających silne trucizny i mogących spowodować wypadki otrucia przy nieostrożnem z nimi obęjściu. Najlepszym środkiem zabezpieczenia się od podobnych wypadków, jest unikać brania do ust jagód lub jakich innych części roślin nieznanych. Znajomość ważniejszych roślin trujących jest również ważną. Przytoczymy niektóre.

Jaskier ostry (*Ranunculus scellaratus*) (Tab. XIV, fig. 16), o łodydze wzniesionej, liściach głęboko wycinanych

i kwiatach (fig. 530), ze złocisto-żółtymi błyszczącymi płatkami, prędko opadającymi. Zawiera sok bardzo ostry, powodujący przy natarciu zapalenie skóry. Użyty wewnątrz powoduje śmierć. Inne gatunki jaskrów są również trujące w mniejszym lub większym stopniu.

Ciemiernik czarny (*Helleborus niger*) (Tab. XIV, fig. 17), kwitnący w zimie; rośnie dziko na górach, a często hodują go w ogródkach. Korzeń jego nazewnątrz czarny, wewnątrz zaś biały, jest trujący. Trujące są i inne gatunki ciemiernika. **C. czerwony** (*H. purpurescens*) i **C. zielony** (*H. viridis*).



Fig. 530. Jaskier ostry.

319. **Cykuta** czyli **Szalej** (*Cicuta virosa*) (Tab. XIV, fig. 18), rośnie na bagnach i łąkach wilgotnych. Korzeń jej, próżny wewnątrz, podzielony jest przegródkami poprzecznymi na komórki. Łodyga wzniesiona próżna i goła. Liście potrójnie pierzaste. Wszystkie części tej rośliny zawierają nadzwyczajnie silną truciznę, zwłaszcza zaś korzeń, który wyglądem swoim przypomina seler. To właśnie i zewnętrzne *podobieństwo do pietruszki* staje się przyczyną nieszczęśliwych wypadków otrucia szalejem.

Szczwół plamisty (*Conium maculatum*) (Tab. XIV, fig. 19), rośnie wzdłuż płotów, przy gościńcach i t. p. Dosięga wysokości trzech łokci i więcej. Łodyga próżna wewnątrz, zielna, pokryta jest delikatnym pyłkiem niebieskim i usiana krwisto-czerwonemi plamami; liście potrójnie pierzaste; kwiatki drobne, białe, w baldaszkach. Podobny jest do pietruszki, od której łatwo go odróżnić, gdyż liście jego, potarte w palcach, wydają woń bardzo niemiłą. Jadowity szczególnie jest korzeń.



Fig. 531. Blekot ogrodowy.

Blekot ogrodowy (*Aethusa Cynapium*) (fig. 531), spotyka się często w ogrodach warzywnych, w zaroślach i na polach. Często biorą go za pietruszkę; łatwo wszakże odróżnić go po niemiłej woni ziela.

320. **Tojad wilczybój** (*Aconitum Lycoctonum*) (Tab. XV, fig. 1), rośnie w lasach, dosięga dwóch łokci wysokości, liście ma 3—7 klapowe, dłoniaste, kwiaty żółte w postaci hełmów. Zawiera silną truciznę w nasionach i korzeniu. W ogrodach hodują często **Tojad mordownik** (*Aconitum Napellus*) o kwiatach białych z niebieskim; jest on również trujący. Bulwy jego mają zastosowanie w medycynie.

Wilczojagoda właściwa (*Atropa belladonna*) (Tab. XV, fig. 2), spotyka się w lasach; łodyga soczysta, do dwóch łokci wysoka; liście jajowate, wełnisto omszone, brudno-zielone. Kwiaty zwieszane z koroną dzwinkową, brudno-szkarłatno-cisawą, wpadającą w fioletową. Jagody czarne, lśniące, osadzone w kielichu. Jest to jedna z najsilniejszych trucizn. Z liści wilczojagody otrzymują *atropinę*, używaną w chorobach oczu.

Lulek czarny (*Hyoscyamus niger*) (Tab. XV, fig. 3) rośnie u płotów i na gruzach. Cała roślina jest lepka i omszona, nieprzyjemnej woni. Łodyga na łokieć wysoka; liście zatokowo wycinane; kwiaty brudno-żółtawe, fioletowo-żyłkowane; owoc torebka, otwierająca się odskakującą nakryweczką. Jest bardzo jadowity; z liści jego i nasion otrzymuje się *olejek hyoscyamowy*—środek leczniczy.

Bieluń dziędzierzawa (*Datura stramonium*) (Tab. XV, fig. 4), pochodzi z Indji; rośnie na gruzach, u płotów, w ogrodach. Dosięga dwóch łokci wysokości; liście ma zatokowo wycinane, kwiaty białe, owoc—koląca torebka o wielu czarnych nasionach. Cała roślina wydaje bardzo niemiłą woń i jest silnie trująca.

321. **Psianka czarna** (*Solanum nigrum*) (fig. 532) i **Psianka słodkogorz** (*S. dulcamara*), są to zioła rosnące w zaroślach i nad strumykami, o kwiatach bardzo



Fig. 532. Psianka czarna.

podobnych do kartoflowych, fioletowych; pierwsza ma kwiaty białe, jagody czarne, kuliste, druga—kwiaty fioletowe, jagody czerwone, jajowate, słdkawo - gorzkie. Obie są trujące.

Wawrzynek wilczełyko (*Daphne mesereum*) (Tab. XV, fig. 5), rośnie w lasach cienistych, kwiaty różowe, miło wonne, rozwijają się w pierwszych dniach wiosny; jagody czerwone, trujące, mogą nawet spowodować śmierć. Korzeń i kora również zawierają ostre soki.

Naparstnica czerwona (*Digitalis purpurea*) (Tab. XV, fig. 6), rośnie w lasach, osiąga trzech łokci wysokości, liście ma opuszone, kwiaty wielkie, purpurowe, zebrane są w grono jednostronne, tworzące zakończenie łodygi. Owoc torebka. Wszystkie części naparstnicy są jadowite. Liście jej są ważnym lekiem w chorobach sercowych.

Wilczypieprz czworolistny (*Paris quadrifolia*) (Tab. XV, fig. 7), ziele wysokie na kilka cali, o czterech liściach siatkowo-żyłkowych na krótkich ogonkach, w jednym miejscu łodygi okółkowo ułożonych; ze środka ich wyrasta jednokwiatowa szypułka; kwiat zielonawy; owoc jagoda czarnosinawa, oszroniona, zawierająca kilka nasionek. Zjedzona sprawia nudności i wymioty.

Zimowit jesienny (*Colchicum autumnale*) (Tab. XV, fig. 8), roślina cebulkowata, kwitnąca we wrześniu i październiku na suchych łąkach, kwiaty ma rurkowe z bladoliljowym brzegiem. Dopiero w następną wiosnę rozwijają się liście, a wśród nich dojrzewa torebka z nasionami. Cebula jej zawiera silną truciznę (*kolchicynę*).

Ciemierzycza biała i czarna (*Veratrum album* i *V. nigrum*) o szerokich, eliptycznych, wzdłuż fałdowanych liściach; pierwsza ma kwiaty zielonawe, druga brunatne. Bulwiaste korzeniaki zawierają silną truciznę *weratrynę*, używaną też jako środek leczniczy.

Życica odurzająca (*Lolium temulentum*) (Tab. XV, fig. 9), jest trawą o kłosach ościstych; rośnie po polach między zbożem; ziarna jej sprawiają zawrót głowy i odurzenie.

X. Niektóre zioła krajowe.

322. W gajach i na łąkach, w lasach, na urwiskach, znajdujemy zioła od dawien dawna rosnące w naszym kraju, a wytępione na ogromnej przestrzeni pól przez uprawę. Każda z tych miejscowości: las, łąka, zarośle, drogi i miedze, mają swoją roślinność odrębną.

Zaczynamy od roślinności *leśnej*. Tu w cieniu drzew lub po brzegach lasów, na miejscach огоłoconych spotykamy następujące rośliny:

Konwalja (*Convallaria majalis*) (fig. 533), kwitnąca w maju uroczemi białymi dzwoneczkami o miłej woni, zebranymi w grono wznoszące się nad dwoma eliptycznymi, podłużnie żyłkowanymi liśćmi. Znajduje zastosowanie i w medycynie.



Fig. 533. Konwalja.

Konwalijka (*Majanthemum bifolium*) o drobnych kwiatkach białych i dwóch listkach, rośnie przeważnie w lasach jodłowych. Podobna nieco z wyglądu do konwalji, ale o wiele drobniejsza.

Przylaszczka gajowa (*Hepatica triloba*) (fig. 534), o liściach trójkłapowych, kwiatkach fioletowych, rozpięszczonych, kwitnących

z początkiem wiosny; **Miodunka lekarska** (*Pulmonaria officinalis*) kwitnąca wcześniej niebiesko i fioletowo; **Marzanka**



Fig. 534. Przylaszczka gajowa.



Fig. 535. Marzanka wonna.

wonna (*Asperula odorata*) (fig. 535), **Przytulja leśna** (*Gallium silvaticum*) o drobnych białych kwiatkach i liściach szorstkich w okółkach po 6—8. **Niezapominajka leśna** (*Myosotis silvatica*), **Nieśmiertelnik** (*Gnaphalium dioicum*) o białych kwiatkach. **Pięciornik wzniesiony** (*Potentilla Tormentilla*) o kwiatkach żółtych.

Czerwieńec centurja zwany **Tysiącznikiem** (*Tab. XV, fig. 10*), o kwiatach różowych, używany w lecznictwie na ziółka. Późno w jesieni za-

kwita **Wrzos** (*Calluna vulgaris*) (fig. 536) o drobnych zielonych listkach i małych kwiatkach liljowych.

323. W zaroślach i gajach pospolite są rośliny: **Fiołek wonny** (*Viola odorata*) już w kwietniu kwitnący o kwiatkach fioletowych; **Zawilec gajowy** (*Anemone nemorosa*) o liściach głęboko wycinanych i kwiatach białych, kwitnie w maju; **Szczawik** (*Oxalis acetosella*) (Tab. XV, fig. 15), o potrójnych listkach i białych kwiatkach fioletowo-żyłkowanych; z liści jego otrzymywano dawniej kwas szczawiowy. W cieniu zarośli spotyka się **Obrazki plamiste** (*Arum maculatum*) (Tab. XV, fig. 12), o grubym bulwiastym korzeniaku, z którego wyrastają 3—4 liście długoogonkowe, błyszczące. Wśród nich na długiej szypułce wyrasta kwiatostan otoczony zieloną pochwicą; kwiaty pręcikowe zebrane są wyżej, słupkowe niżej, a pierwsze dojrzewają dopiero wtedy, gdy drugie już więdnąć zaczynają. Przy zapyleniu podają tu wielką pomoc owady; drobne muszki dostawszy się raz w głąb pochwicy nie mogą się z niej wydostać, gdyż nie dopuszczają tego okrywające ją i skierowane ku dołowi włoski. Muszki te przynoszą zwykle na ciele swoim pyłek innych, wcześniej rozwiniętych kwiatów tegoż gatunku, a teraz uwięzione, przenoszą ten pyłek na słupki i zapylają je, ale i po zapyleniu nie są jeszcze wolne, muszą czekać, żywiąc się słodkim sokiem kwiatów, aż dojrzeją kwiaty pręcikowe i wypadający z nich pyłek obsypie ich skrzydełka, wtedy dopiero pochwica zaczyna więdnąć i uwolnione muszki lecą przenosić pyłek na inne kwiatki.

324. Zielone kobierce łąk upstrzone są ogromną ilością rozmaicie zabarwionych kwiatów, zdobiących je przez całe lato. Tak np. niebieska **Goryczka** (*Gentiana verna*), rozmaite **Dzwonki** (*Campanula*) (fig. 537) jasno-liljowe główki **Drjakwi** (*Scabiosa*) (fig. 538); liczne okółki



Fig. 536. Wrzos.



Fig. 537. Dzwonek krągłolistny.

niebieskich kwiatów wargowych **Szałwi** (*Salvia*), powiązane tu są z białymi i różowymi główkami **Koniczyny** (*Trifolium*), ze **Stokrotkami** (*Bellis perennis*) i podobnymi do nich lecz znacznie większymi **Chryzantynami** (*Chrysanthemum leucanthemum*) o żółtych kwiatach z białymi brzeźnami języczkami. Żółte główki **Mniszka lekarskiego** zw. **Dmuchawcem** albo **Brodawnikiem mlecznym** (*Taraxacum officinale*) (fig. 539) za-



Fig. 538. Drakiew. Fig. 539. Mniszek. Fig. 540. Kaczeniec błotny.

mieniają się, gdy dojrzeją jego nasiona, na kule z puszku, rozwiewające się za lekkim podmuchem; każdy zaś taki puszek unosi nasiona, które w ten sposób rozsiewają się nadzwyczajnie szybko.



Fig. 541. Babka.

Kmin (*Carum Carvi*), **Podagrycznik pospolity** (*Aegopodium podagraria*), **Trybula leśna** (*Anthriscus silvestris*) i **Barszcz pospolity** (*Heracleum barbatum*) odznaczają się wysokimi łodygami, drobnymi w baldaszki zebranymi kwiatami i liśćmi złożonymi. **Jaskry** (*Ranunculus*) rozmaite (p. str. 295) i rosnące w wilgotnych miejscach **Kaczeniec błotny** (*Caltha palustris*) (fig. 540), należące do roślin jadowitych, wyróżniają się

złocisto-żółtymi, kwiatami błyszczącymi. Na suchych wzgórzach rośnie **Babka** (*Plantago*) (fig. 541), o kwiatach szarawych, zebranych w kłos. **Macie-**

rzanka (*Thymus serpyllum*) (fig. 542), drobne wonne ziółko, którego używają na herbatę i kąpiele dla dzieci. Bardzo rozpowszechniona jest **Rzeczucha łąkowa** (*Cardamine pratensis*) o kwiatach liljowych lub białych; rośnie na łąkach wilgotnych. Koło lasów i w lasach znajdujemy różne gatunki **Storczyków** (*Orchis*), o kwiatach różnobarwnych dziwacznej postaci, zebranych w kłos. Od-



Fig. 542. Macierzanka.

znaczają się i tem, że mają łodygę podziemną w postaci bulwek, których zawsze posiadają trzy, z tych jedna stara zeszłoroczna, obok świeża, z której wyrasta łodyga, a trzecia maleńka, mająca się



Fig. 543. Storczyk samczy.

rozwinąć dopiero w następnym roku. Ze storczyków pospolite u nas są: **S. plamisty** (*O. maculata*), o kwiatach czerwonych i liściach plamistych, **S. samczy** (*O. morio*) (fig. 543) i **Podkolan biały**, silnie pachnący.

Pospolitą także rośliną na łąkach jest **Szczaw zwyczajny** (*Rumex acetosa*) (Tab. XV, fig. 13), o liściach strzałkowatych i kwiatach czerwonych.

325. Wzdłuż gościńców, po miedzach, na śmieciach i gruzach rosną: **Tasznik** (*Capsella bursa pastoris*), którego łatwo poznać po kwiatach białych i owocach w postaci trójkątnych małych łuszczynek kształtu sakiewki; **Muchotrzew zwyczajny** (*Stellaria media*) (fig. 544), bardzo pospolity, o kwiatach białych, listkach małych szorstkich; **Jasnota biała** (*Lamium album*) (fig. 545) o łodydze czworograniastej, liściach podobnych do liści pokrzywy lecz nie parzących i kwiatach białych, u ludu znana pod nazwą *głuchej pokrzywy*; **Lebiodka pospolita** (*Origanum vul-*



Fig. 544. Muchotrzew.

gare), o liściach jajowatych i kwiatach ciemno - różowych;
Dziewanna pospolita (*Verbascum nigrum*) o wysokiej łody-



Fig. 546. Jasnota biała,
 obok kwiat i pręciki.

dze, liściach okrytych włoskami; żółte
 jej kwiaty, gęsto skupione wokoło łodygi, zazwyczaj lepniste o szybko opadającej koronie, używane są w lecznictwie; **Żmijowiec pospolity** (*Echium vulgare*) (fig. 546), o łodydze okrytej szorstkim włosem, ma kwiaty prawie dzwonekowane, najczęściej niebieskie z długimi czerwonymi pręcikami i słupkami wystającymi, zebrane w kwiatostany ślimakowato skręcone; owocki złożone z 4 orzeszków. **Wrotycz pospolita** (*Tanacetum vulgare*) (Tab. XV,

fig. 11), o żółtych półkulistych główkach kwiatowych; **Wilżyna ciernista** (*Ononis spinosa*) (fig. 547) z kolcami i **W. polna** (*O. arvensis*) bez kolców, o różowych kwiatkach motyl-



Fig. 546. Żmijowiec. Fig. 547. Wilżyna ciernista. Fig. 548. Śláz pospolity.

kowych; liście omszone, lepiące; cała roślina wydaje woń przykłą, **Śláz pospolity** (*Malva rotundifolia*) (fig. 548), o liściach okrągłych, ma kwiaty duże, brudno - różowe, owocki płaskie, zebrane w krążki; używany jest w lecznictwie, gdyż działa łagodząco przy kaszlu; **Łopian większy i mniejszy** (*Lappa major et minor*) o liściach okrągłych, kwiatach ze-

branych w główki, otoczone kolcami, dla tego czepiają się odzieży; **Pokrzywa parząca i zwyczajna** (*Urtica urens* i *U. dioica*) (fig. 549) o liściach szorstkich, kwiatach zielonych,



Fig. 549.
Pokrzywa.

drobnych, zebranych w kłoski; wszystkim znane są te rośliny z niemiłych doświadczeń oparzenia, spowodowanego przez ostry sok, wypływający z drobnych i łatwo łamiących się za dotknięciem włosków, pokrywających łodygę i liście; **Glistewnik** czyli



Fig. 550. Glistewnik.

Jaskółcze ziele (*Chelidonium majus*) (fig. 550) o kwiatach żółtych; przy nadłamaniu wypływa z łodyg i liści sok żółty, zawierający substancje ostre, lecznicze.

326. *Wśród zbóż rosną rozmaite rośliny nie bardzo*



Fig. 551. Chaber.



Fig. 552. Ostróżka.



Fig. 553. Rumianek.

pożądane dla rolnika, ale mile urozmaicające swą barwą jednostajność pól uprawnych. Należy tu przedewszystkiem niebieski **Chaber modry** czyli **Modrak** (*Centaurea cyanus*) (fig. 551) znany także pod nazwą **Bławatka**; dalej **Ostróżka** (*Delphinium Consolida*) (fig. 552) o kwiatach fioletowych z ostrogami; **Rumianek** (*Matricaria Chamomilla*) (fig. 553),

łatwo dający się poznać po silnej aromatycznej woni i małych żółtych główkach kwiatowych, o białych promieniach brzeżnych; jest ziołem leczniczem; **Kąkol** (*Agrostema Gita-go*) (fig. 554) o kwiatkach różowych; **Bratki** (*Viola tricolor*) o kwiatkach żółtych, rosną po ścierniskach i między zbożami.



Fig. 554.
Kąkol.

wodnych,

327. Na brzegach wód i w samej wodzie znajdujemy roślinność opisaną już przy omówieniu akwarjum (str. 172); prócz tego żyje tam wiele odrębnych gatunków, jak np. **Grzybień biały** (*Nymphaea alba*) (fig. 555) o kwiatach białych i dużych owalnych liściach, pływających na powierzchni stawów, a przymocowanych do dna długimi ogonkami — jedna z najpiękniejszych roślin

znana też pod nazwą *lilji wodnej*; **Grażel żółty** (*Nuphar luteum*) z liści podobny do poprzedniego, kwiaty

ma żółte, również pływające na powierzchni wody. **Przęstka pospolita** (*Hippuris vulgaris*) (Tab. XV, fig. 14), rosnąca na bagnach i moczarach, ma



Fig. 555. Grzybień biały; w górze kwiat pojedynczy.

kwiaty zupełnie pozbawione korony, o jednym tylko pręciku. Charakterystyczne są dla moczarów **Wełnianki** (*Eriophorum*) (fig. 556) których nasiona otoczone są puszką białą i zebrane w gęste wiechy; **Turzyce** (*Carex*) (fig. 557) rosną często na łąkach mokrych; długie ich *korzeniaki*, t. j. łodygi




Fig. 556.
Wełnianka.



Fig. 557 Turzyca.



podziemne wypuszczają ku górze pęczki liści i kwiatów, ku dołowi zaś korzonki.



Rzęsa (*Lemna*) (fig. 558) pokrywa często całą powierzchnię stawów swą okrągłą łodygą, mającą kształt liści; korzonki jej wiszą swobodnie w wodzie. Zjadają ją chętnie kaczki.

Fig. 558. Rzęsa.

XI. Trawy.

328. Bardzo liczne rośliny, które obejmujemy wspólną nazwą **traw**, tworzą naturalną rodzinę roślin trawiastych. Wygląd ich tak charakterystyczny, a tak odrębny od innych roślin, że nawet nieświadomy botaniki z trudnością się pomyli pod tym względem. Łodyga traw jest wewnątrz próżna i ma na sobie szereg kolanek; nazywamy ją *żdźbłem*. U każdego kolanka zaczyna się długi wązki liść, który z początku obejmuje żdźbło w postaci *pochwy*, a później dopiero odgina się w *blaszkę* (Tab. XV, fig. 17). Kwiaty (fig. 559), zebrane w *kłosa* lub *wiechy*, składają się z 2 słupków ze znamionami piórkowatymi i 3 pręcików o dużych stosunkowo pylnikach, zawieszonych na cienkich niciach. Części te otoczone są łuskami zw. *plewami*. Pyłek przenoszony jest na słupek przez wiatr. Owoc — *ziarno*, to jest owoc suchy, w którym cienka obowocnia, cz. zewnętrzna część owocu zrosnięta jest całkowicie z nasieniem.

329. Do traw należą nasze rośliny zbożowe.

Żyto (*Secale cereale*) (fig. 560—d), uprawiane nawet w wielu krajach północno-wschodnich, ma kłosa obustronne, nieco ościste. Uprawia się w 2 odmianach:



Fig. 559. Kwiat traw: A—zawiązek z dwoma znamionami; B, C, D—pylniki.

jako *oziminę*, którą sieją w jesieni, a młode jej pędy zimują pod śniegiem, na wiosnę zaś rozwijają się dalej; *żyto jare* wysiewają na wiosnę (u nas rzadko uprawiane).

Pszenica zwyczajna (*Triticum vulgare*) (fig. 560—b) jest mniejsza od żyta, lecz ma żdźbło mocniejsze, a kłos grubszy, najczęściej nieościsty, złożony z drobniejszych kłosek,



Fig. 560. Zboża: a—Jęczmień, b—Pszenica, c—Owies, d—Żyto, e—Pszenica orkisz (kwitnąca).

z których każdy zawiera zwykle po 4 kwiatki. Z ziarna jego otrzymuje się mąka, z której pieką bułki; ze słomy plotą kapelusze. Główne odmiany są: *pszenica jara*, *ozima*, *sandomierka*—o dużych ziarnach, dających delikatną mąkę, *angielska* czyli *egipska* o kłosie kosmatym, *polska*, odznaczająca się wysoką słomą i ogromnym kłosem, dochodzącym do ćwierci łokcia, ziarnem grubem, obfitem w mąkę, do pół cala niekiedy długiem. **Pszenica orkisz** (*Triticum Spelta*) (fig. 560—e), z niedojrzałych jej ziarn przyrządza się „kaszę orkiszową.”

Wszystkie te odmiany pszenicy pochodzą od jednego gatunku pierwotnego i wytworzone zostały sztucznie przez uprawę; jeśli wysiewać je w nieodpowiednich warunkach—na gorszych gatunkach ziemi lub niestaranie uprawianych—wszystkie po kilku latach tracą swoje przymioty i wyrażają się.

Jęczmień (*Hordeum*) uprawiany bywa w licznych gatunkach; kłosa jego opatrzone są mniej lub więcej długimi, szorstkimi ośmi, łatwo odłamującymi się. Używa się przeważnie do warzenia piwa i pędzenia wódki; chleb z mąki jęczmiennej jest ciężki i prędko czerstwieje. Z ziarn jęczmienia otrzymuje się „kasza perłowa.”

Owies (*Avena sativa*) (fig. 560—c), kłoski ma w szerokich wiechach, każdy kłosek składa się z dwóch kwiatków; ziarno jego używa się przeważnie na paszę dla koni.

Proso zwyczajne (*Panicum miliaceum*) (Tab. XV, fig. 18), uprawia się przeważnie w Europie południowej; ziarno ma drobne, prawie kuliste; kwiaty w wiechach rozpięrzchłych.

330. **Ryż** (*Oriza sativa*) (Tab. XV, fig. 17), uprawia się we wszystkich krajach stref gorących, ziarna jego białe i delikatne służą za pożywienie wielu ludziom. Uprawa ryżu wymaga ogromnej ilości wody stojącej, co jest niekorzystnym dla zdrowia mieszkańców. Pola ryżowe są tak urządzone, ażeby po zasianiu (w kwietniu) można było je zatopić (fig. 561), woda utrzymuje się na pewnej wysokości przez cały czas, dopóki kłosa nie dojrzeją; wtedy ją spuszcza się i przystępuje do żniwa.



Fig. 561. Uprawa pola ryżowego.

było je zatopić (fig. 561), woda utrzymuje się na pewnej wysokości przez cały czas, dopóki kłosa nie dojrzeją; wtedy ją spuszcza się i przystępuje do żniwa.

Kukurydza (*Zea Maïs*) (fig. 562) pochodzi z Ameryki; obecnie uprawia się w Europie południowej. Kwiaty pręcikowe zebrane są na wierzchołku łodygi, słupkowe zaś umiesz-

czone poniżej, zebrane w *trzonek* (gęsty kłos) i otoczone pochwicami, z których wystają tylko długie znamiona słupków,



Fig. 562. Kukurydza: A— kwiaty pręcikowe, B—słupkowe.



Fig. 563. Trzonek kukurydzy.

wiszące w postaci włókien (fig. 562 — B). Ziarna duże, wrosnięte są w mięsistą oś trzonka (fig. 563). Kukurydzę jedzą gotowaną, robią z niej mąkę, służy także do tuczenia drobiu, fabrykacji spirytusu i t. d.

331. *Trawy pastewne*. Dziko rosnące na łąkach trawy stanowią zwykle dobrą paszę dla bydła. Do najlepszych pod tym względem należą: **Niestrawa kupkowa** (*Dactylis glomerata*), **Wyczyniec łąkowy** (lisi ogon) (*Alopecurus pratensis*)

o kłosach zbitych, **Brzanka Tymotka** (*Phleum pratense*), **Żyznica owsowata** (*Arrhenatherum avenaceum*), zwana **Rajgrasem francuskim** i **Żyznica trwała** (*Lolium perenne*) czyli **Rajgras angielski**, używane są na trawniki. **Drżączka średnia** (*Briza media*) (Tab. XV, fig. 19), ma ładny serduszkowaty kształt kłosek. **Tonka wonna** (*Anthoxantum odoratum*) nadaje sianu miłą woń.



Fig. 564. Trzcina zwyczajna.

Do uciążliwych do wytopienia chwastów zalicza się **Rolnica perz** (*Triticum repens*), należąca do rodzaju pszenicy; rozmnaża się nadzwyczajnie szybko, zwłaszcza na zaniebanych nieco rolach, przy pomocy łodygi podziemnej (rozłogów), szeroko rozgałęziającej się pod ziemią, wskutek tego perz jest bardzo trudny do wypłenienia.

332. Do traw należy też dość u nas pospolita **Trzcina zwyczajna** (*Phragmites communis*) (fig. 564) o dużych ładnych wiechach używanych do bukietów; silne jej źdźbła uży-

wane są przy budowlach do krycia dachów, na maty i t. p. **Trzcina laskowa** (*Arundo donax*), rosnąca w Europie południowej, służy do wyrobu lassek, cybuchów, instrumentów muzycznych i t. p.

W krajach zwrotnikowych trawy dosięgają znacznej wysokości i grubości; tworzą one w Indjach nieprzebyte zarośla zwane *dżunglami*. Za przykład traw zwrotnikowych, o olbrzymim drzewiastym źdźble, służyć mogą **Bambusy** (*Bambusa arundinacea*) (fig. 565), z których w Indjach budują domki, wyrabiają sprzęty, kryją niemi dachy i t. d.; młode łodygi bambusa są w Chinach jadalne.



Fig. 565. Bambusy.

XII. Rośliny bezkwiatowe.

333. Podajemy tu opisy tylko niektórych roślin bezkwiatowych najbardziej pospolitych.

Skrzyp polny (*Equisetum arvense*) (Tab. XVI, fig. 1), rośnie na wilgotnych piaszczystych łąkach. Na wiosnę wyrasta nierozgałęziony pęd koloru cielistego, na wierzchołku którego są zebrane w kłos zarodnie. Na fig. 1 *b* mamy przekrój poprzeczny łodygi, 1 *c*—przedstawia letnią rozgałęzioną roślinkę. Skrzyp zawiera w tkance wiele krzemionki i używa się do polerowania metalów.

334. Do **Paproci** należą:

Ruta murowa czyli **Śledzionka zanokcica** (*Asplenium Ruta muraria*) (Tab. XVI, fig. 2). Rośnie na murach. Kupki zarodni na dolnej stronie liścia w szeregach po obu stronach nerwu środkowego. **Paproć słodyszka** (*Polypodium vulgare*) (Tab. XVI, fig. 3), rośnie na murach i skałach; **Nere-**

cznica samcza (*Nephrodium Filix mas*) ma duże złożone liście; **Zgasiewka zwyczajna** (*Pteris aquilina*) dosięga prawie trzech łokci wysokości.

335. Z mchów są pospolite w lasach:

Płonnik (*Polytrichum commune*) (Tab. XVI, fig. 4); mniejszy od niego **Meszek** (*Mnium*); **Rokiet** (*Hypnum*), rozgałęziony; **Torfowiec** (*Sphagnum*) (fig. 566) w wilgotnych lasach, na bagnach, trzęsawiskach, stanowi główny materiał *torfu*, który powstaje w ten sposób, że podczas gdy górne części mchu ciągle rosną i wydłużają się, dolne zamierają i gniją, a pomieszane z innymi gnijącymi materiałami roślinnymi tworzą zbite masy i rozległe *torfowiska*. Wogóle mchy bardzo ważne są dla lasów, gdyż mają zdolność wchłaniania wody i przyczyniają się do utrzymania wilgoci w lasach.



Fig. 566. Torfowiec.

Z mchów **wątrobowców** najczęściej spotyka się u nas **Porostnica** (*Marchantia polymorpha*) (fig. 567), rosnąca na ziemi wilgotnej w postaci płatków, z góry ciemno - zielonych, z dołu białawych, przymocowanych drobnymi *chwytnikami* (rodzaj



Fig. 567. Porostnica.



Fig. 568. Płucnica islandzka.

korzonków) do ziemi. Organa rozmnożenia tworzą się na wyrastających z tej plechy nóżkach.

336. Wśród **porostów** na wzmiankę zasługuje **Chrobotek renożywny** (*Cladonia rangiferina*) (Tab. XVI, fig. 5), krzaczasty, szaro-biały. W krajach północnych stanowi on głów-

wne pożywienie reniferów, które wygrzebuja go z pod śniegu. **Płucnica islandzka** (*Cetraria islandica*) (fig. 568) pospolicie zwana **Mchem islandzkim**, używa się w lecznictwie; w latach głodowych, zmielona i zmieszana z mąką zbożową, służyła ludziom za pożywienie.

337. **Grzyby** są najbardziej znanymi z roślin bezkwiatowych, a wygląd ich jest zupełnie różny od innych roślin. Należy tu mnóstwo gatunków, z których najpospolitsze są:

Muchomor (*Agaricus muscarius*) (Tab. XVI, fig. 6), rośnie w lasach szpilkowych. Kapelusz ciemno-czerwony usadzony jest licznymi brodawkami białymi; wydaje niemiłą woń i ma smak ostry, jest silnie trujący. Używa się jako truczna na muchy.

Pieczarka (*Agaricus campestris*) (Tab. XVI, fig. 7), znajduje się na polach i w ogrodach, zwłaszcza tam, gdzie zakopany jest nawóz. Kapelusz ma biały z czarnym spodem. Jest to bardzo smaczny grzyb. Hodują go sztucznie w piwnicach (fig. 569) na kupach nawozu końskiego.

Purchawka (*Lycoperdon*) (Tab. XVI, fig. 8), jest cała okrągła; wewnątrz tworzą się zarodniki, które po dojrzeniu wysypują się z pękającej osłony w postaci proszku ciemno-brunatnego.

Smardz jadalny (*Morchella esculenta*) (Tab. XVI, fig. 9) rośnie w lasach górzystych, ukazuje się na wiosnę; świeży i suszony używany jest na pokarm.

Sromotnik smrodliwy (*Phallus impudicus*) (Tab. XVI, fig. 10), podobny jest do poprzedniego i trudno go odróżnić. Gdy wyrasta z ziemi ma wygląd jaja kurzego; następnie błona zewnętrzna pęka i występuje z niej trzonek z kapeluszem, otoczony początkowo śluzem; gdy ten spłynie, u góry ukazuje się otwór; jestto główna cecha wyróżniająca ten gatunek od smardza. Jest to grzyb trujący.

Rydz (*Agaricus deliciosus*) (fig. 570) odznacza się poma-



Fig. 569. Hodowla pieczarek w piwnicach.



Fig. 570. Rydz.

rańczowym płaskim kapeluszem o brzegach nieco podwiniętych; zawiera sok pomarańczowy. Bardzo smaczny i różnie przyrządzony, powszechnie bywa jadany.

Pieprznik czyli **Lisica** (*Cantharellus cibarius*) (Tab. XVI, fig. 11), jest to smaczny grzyb jadalny; rośnie w borach jodłowych w dużych gromadach. O tym to grzybie pisze Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”:



Fig. 571. Borowik.

„Chłopey biorą krasnolice
Tyle w pieśniach litewskich sławione *lisice*,
Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada
I dziwna. żaden owad na nich nie usiada.“

Borowik czyli **Grzyb prawdziwy** (*Boletus edulis*) (fig. 571) o grubym, twardym, białym trzonku i cisawo kasztanowatym kapeluszu z jasnym spodem: jest jadalny i powszechnie u nas znany. Rośnie u nas w lasach szpilkowych. I o nim też wspomina Mickiewicz:

„Panienki za wysmukłym gonią *borowikiem*,
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem.“

Przypominamy tu opis grzybów w „Panu Tadeuszu” zarówno poetyczny jak wierny:

„Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi
Naczyń stołowych, sterczą tu z krągłemi brzegi
Surojadki, srobrzyste, żółte i czerwone;
Niby czareczki, różnem winem napełnione!
Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe,
Lejki, jako szampańskie kielichy wysmukłe;
Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie,
Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie.
I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona
Purchawka, jak pieprzniczka; zaś innych imiona
Znane tylko w zajęczym lub wilożym języku,
Od ludzi nie ochrzczone — a jest ich bez liku.

338. Prócz tych i wielu innych znanych powszechnie gatunków, należy do grzybów bardzo wiele roślin drobnych; z tych np. znamy jedne jako **Pleśnie**, obrastające chleb, owoce lub inne przedmioty, leżące w wilgotnem miejscu. Ba-

dając pleśń pod mikroskopem, przekonamy się, że składa się ona z drobnych niteczek (fig. 572); są to tak zwane *strzępki*, tworzące *grzybnię*; wśród nich wyrastają grubsze nieco strzępki, wznoszące się do góry i tu buławiaście nabrzmiałe. Można je widzieć gołym okiem, kiedy okrywają jakby drobnym puszkciem przedmioty zapleśniałe. Te nabrzmienia są to zarodnie, na których tworzą się zarodniki.




Fig. 572. Pleśń: 1) powiększona; 2) bardziej powiększona; *m* — grzybnia; *st* — strzępki, na których tworzą się zarodnie *s*.

Inne znów grzyby rosną na roślinach zwłaszcza uprawnych, psując je i przyczyniając wielkie szkody gospodarzom. Są to bowiem pasorzyty, żywiące się sokami roślin żywych. Do takich należą: **Głownia** (*Ustilago carbo*), ukazująca się na zbożach; **Śnieć** (*Tilletia carres*) (fig. 573), niszcząca ziarno rozmaitych zbóż; ziarno takie jest zupełnie stoczone i wypełnione wewnątrz czarnym pyłkiem; **Sporysz** (*Claviceps purpurea*), który rozwija się w ziarnach żyta, powodując ich nienormalny rozrost, t. zw. **Rożki** (*Secale cornutum*) (fig. 574).



Fig. 573. Kłos pszenicy zniszczony przez śnieć.



Fig. 574. Kłos żyta ze sporyszem.

339. Są też grzyby nierównie prostszej budowy do takich należą **Drożdże** (*Saccharomyces cerevisiae*) (fig. 575), składające się z drobnych, widzialnych tylko pod mikroskopem pęcherzyków, które mnożą się za pomocą *pączkowania*, t. j. na pęcherzyku takim wyrasta mały guziczek, który oddziela się od niego błoną i wyrasta niebawem do wiel-

kości pierwszego. Pęcherzyki te zostają w połączeniu, tworząc łańcuszki lub oddzielają się od siebie. Drożdże żywią




Fig. 575. Drożdże, powiększone 500 razy.

się cukrem zawartym w rozmaitych płynach i przemieniają go przytem na spirytus i gaz — kwas węglany. Na tem właśnie polega *fermentacja* wina, piwa i t. d. Dodają też drożdży do ciasta dlatego, żeby wydzielany kwas węglany nadał mu pulchności—wtedy to ciasto rośnie. Drożdże kupne —

jest to właśnie masa drobnych tych grzybków pomieszanych z małą ilością mąki i odpowiednio sprasowanych.

Inne drobne grzybki, powodujące podobne fermentacje, nazywamy *fermentami*. Na fig. 576




Fig. 576. Bakterja mleczna (powodująca kwaśnienie mleka).

przedstawiony jest silnie powiększony ferment, powodujący kwaśnienie mleka, t. zw. *bakterje mleczne*, zamienia bowiem cukier mleczny, zawarty w mleku na kwas mleczny; inne fermenty powodują innego rodzaju fermentacje, np. kwaśnienie kapusty, ogórków i t. p.

Do fermentów zbliżone są jeszcze drobniejsze organizmy, które można dostrzedz tylko przy najsilniejszych powiększeniach. Nazywamy je **bakterjami**, **mikrokokami** i t. d. Znajdują się

one wszędzie w wielkiej ilości: w powietrzu, w wodzie, niektóre są szkodliwe; inne gdy dostaną się do wnętrza ciała ludzkiego, stają się przyczyną różnych chorób, np. tyfusu, dyfterytu, suchot, zapalenia płuc i t. p.



Fig. 577. Morszczyny.

340. Do najniżej uorganizowanych roślin należą narówni z grzybami i **Wodorosty** (*Algae*). Są to rośliny przeważnie mikroskopowe, składające się z drobnych, zielonych nici lub pęcherzyków. Niektóre wszakże są dość wielkie; do takich np. należą rosnące w morzu **Morszczyny** (*Fucus*) (fig. 577) brunatno zabarwione. Szczególniej liczne są

wodorosty morskie w niektórych miejscowościach oceanu Atlantyckiego, gdzie rosną tak gęsto, że stanowią przeszkodę dla żeglugi (t. zw. „Morze Sargasowe”). Wodorosty wód słodkich znajdujemy przeważnie na powierzchni stawów i innych wód stojących, gdzie tworzą darniny z cienkich nici, albo też przymocowane są do kamieni na dnie bystro płynących potoków; są to zwykle rozgałęzione nici, ciemno lub brudno zielone.

Szczególną gromadę wśród wodorostów tworzą **Okrzemki** (*Diatomaceae*) (fig. 578); są to istoty tak drobne, że nie można ich widzieć gołym okiem; mają one postać członków, pręcików i t. p. Jedne z nich są przymocowane na nóżkach do ziarn piasku lub kamyków; inne są wolne i wykonywają ruchy pławne w jedną i w drugą stronę. Niektóre są spojone we wstążki lub zygzaki i tworzą kolonie. Błona tych wodorostów nasiąknięta jest obficie krzemionką; widać na niej najrozmaitsze rzeźby; prążki poprzeczne lub podłużne, kropczki i t. d. Gdy okrzemka umiera, błona krzemionkowa zostaje, zachowując kształt i urzeźbienie żywej i opada na dno. Z czasem z takich „pancerzy” tworzą się całe pokłady skał t. zw. „ziemia okrzemkowa.”




Fig. 578. Okrzemki.

Rośliny niezwykłe.

341. W królestwie roślinnym tak jak i wszędzie, znajdują się „dziwolągi” a przynajmniej „oryginały,” które odbiegają bądź kształtem, bądź zachowaniem się od typu ogólnego tak dalece, że mimowoli zwracają na siebie uwagę.

Jedne uderzają nadzwyczajną budową kwiatów, do takich należą niektóre gatunki **Storczyków**, **Męczennica** (*Passiflora coerulea*), o kwiatach białych, ozdobionych wieńcem z niebieskich promieni (*Tab. XIV fig. 21*) i wiele innych. Widzimy je dość często na wystawach sklepów ogrodniczych, ale trudno je tak opisać, iżby czytający powziął dokładne o nich wyobrażenie.

Odrębne są pod względem kształtu **Kaktusy** (fig. 579), tworzące osobną rodzinę. Są to rośliny o grubych, soczystych łodygach najrozmaitszego kształtu, pozbawionych zupełnie liści, których miejsce zastępują kolce. Rosną one zwykle w suchych pustyniach krajów zwrotnikowych Ameryki. Na niektórych z nich żyją koszenile (patrz str. 207).



Fig. 579. Kaktusy.




Fig. 580. *Welwitschia mirabilis*: a—cała roślina; b—przecięcie podłużne pnia; c—szyszki.

Najdziwniejszą wszakże pod względem kształtu jest roślina, znaleziona niezbyt dawno w Afryce zachodniej. Jest to **Welwitschia** (*Welwitschia mirabilis*) (fig. 580). Pień jej ma kształt płaskiego stołu o średnicy dochodzącej do 4-ch stóp i wystaje zaledwie na parę cali z gorącego piasku pustyni, gdzie ten dziwoląg rośnie. Od pnia idą dwa liście naprzeciwległe, długie na 6 do 8 stóp, mocne jak rzemień. Są to liścienie tej rośliny, rozpostarte na ziemi i trwające tak długo jak i sama roślina, t. j. kilka stuleci. Kwiaty i owoce podobne do szyszek, powstają na obwodzie tego pieńka. Roślina ta zbliżona jest do rodziny szyszkowych.

Wśród roślin wodnych zwraca uwagę olbrzymia **Wiktorja** cz. **Koroniarka** (*Victoria regia*) (fig. 581). Jej liście okrągłe mają kilka łokci w obwodzie; są przytem bardzo mocne i mają brzeg tak zagięty, iż wielkie ptaki wodne stają na nich, czatując na swoją zdobycz. Kwiaty jej, mające do jednej stopy średnicy, wznoszą się ponad wodą, mają do 100 płatków barwy białej, przechodzącej w ciągu 24 godzin wszystkie odcienie, od różowego do jaskrawo-czerwonego. Na trzeci dzień kwiat już więdnie i zanurza się pod wodę, gdzie owoce dojrzewają.

342. Niektóre rośliny odznaczają się niezwykłą wrażliwością, odpowiadając na każde podrażnienie pewnemi ru-



Fig. 581. Wiktorja.

chami. Do takich zwłaszcza należy **Czułek** (*Mimosa pudica*) (fig. 582); którego liście złożone, podobne do liści akacji, stulają same na noc pojedyncze swe listki; przy potrąceniu zaś, nie tylko stulają się listki, ale i ogonki ich opuszczają się ku dołowi; przytem podrażnienie stopniowo przenosi się od dotkniętego liścia na inne, które kolejno przyjmują to samo położenie.

U **Wahadlika** (*Desmodium gyrans*) (fig. 583), liście są złożone z trzech listków, z których dwa parzyste mniejsze, trzeci końcowy większy. Wszystkie trzy odbywają samowolnie ruchy wahadłowe, tak, iż gdy jeden z mniejszych się podnosi, drugi opuszcza się; większy zaś opisuje wydłużone

elipsy. Ruchy te odbywają się tylko w powietrzu dość ciepłym i wilgotnym (w 22° — 25° C.).



Fig. 582. 1—Czułek w stanie normalnym; 2—po dotknięciu; 3—w nocy.

343. Najbardziej wszakże zastanawiające są rośliny, których rozmaite części tak są urządzone, iż chwytają siadające na nie owady. Nazywają je zwykle *owadożernymi*, chociaż



Fig. 583.
Wahadlik.





Fig. 584. a) Rosiczka okrągłolistna. —



b) Liść Rosiczki powiększony.

nie jest ściśle dowiedzionem, iżby rośliny te żywiły się schwytanymi owadami.

Z krajowych należą tu *Rosiczki* (*Drosera*) *R. okrągłolistna* (*D. rotundifolia*) (fig. 584) i *R. długolistna* (*D. longifolia*)

rosnące na torfowiskach. Niewielkie te roślinki mają liście pokryte dużymi włoskami, kształtu maczugowatego, o różowym soku. Skoro muszka jakaś siądzie na liściu, przykleja się nóżką lub skrzydełkiem do lepkiej wydzieliny włosków, a jednocześnie zaczynają one jeden po drugim nachylać się ku niej (fig. 584, b) i otaczają ją ze wszystkich stron; wtedy z włosków wydziela się sok, rozpuszczający stopniowo ciało muszki, które prawdopodobnie zostaje wchłonięte przez liść i służy roślinie za pożywienie.

Amerykańska **Muchołówka** (*Dionea muscipula*) (fig. 585) ma liście utworzone z dwóch połówek i zaopatrzone na brzegu ostrymi kolcami. Gdy owad usiądzie na liściu, obie jego połówki zamykają się; przytem kolce brzeżne wchodzą między siebie tak, że owad zostaje uwięziony, a liść otwiera się dopiero po zupełnem jego strawieniu w wydzielonym przez swe gruczołki soku.



Fig. 585. Muchołówka.

Kwiaty i owady.

344. Widzieliśmy już, że dla wytworzenia owocu potrzebne jest opylenie słupka przez pyłek pręcików. Doświadczenie wykazuje, że dla większej części roślin, które mają w jednym kwiatku pręciki i słupki, niekorzystnem jest, gdy pyłek opyla słupkę tego samego kwiatu: nasiona powstające przytem są słabe, albo czasem wcale się nie wytwarzają. Przeciwnie zaś, ten sam pyłek przeniesiony na inny kwiat tego samego drzewa lub krzewu, albo nawet innego osobnika, wytwarza zdrowe i silne nasiona. To też w wielu roślinach daje się widzieć, że chociaż i słupki i pręciki znajdują się w każdym kwiecie, jednak urządzone są tak, aby pyłek nie mógł dostać się na słupki tego samego kwiatu. Zapobiega temu zwykle niejednoczesne dojrzewanie pyłku i zaląż-

ków: pylniki otwierają się wtedy, gdy jeszcze zalążki tegoż kwiatu nie są dojrzałe, a znamiona nie gotowe do przyjęcia pyłku, który musi być więc przeniesiony na wcześniej rozwinięty kwiat tej samej rośliny, lub też jest odwrotnie (jak tego przykład widzieliśmy u **Obrazków** p. str. 299).

W kwiatkach innych roślin słupek jest znacznie wyższy od pręcików, tak, że pyłek może być tylko sztucznie przeniesiony na znamię. Najciekawszym objawem pod tym względem jest następujące przystosowanie, jakie spotykamy np. u **Pierwiosnka** (fig. 586). Jedne kwiaty tej samej rośliny



Fig. 586. Kwiaty pierwiosnka: S—pręciki, G—słupki.

mają słupki wysokie, a pręciki niżej położone, inne znów pręciki wysoko leżące, a słupki krótkie. Przytem pręciki tych drugich znajdują się na tej samej wysokości, co znamiona pierwszych. Gdy jakikolwiek owad siada na kwiatkach o pręcikach wysoko położonych, pyłek z nich czepia się jego ciała; gdy zaś później siądzie na kwiecie o wysokim słupku, ocierając się o jego znamię, przenosi na nie pyłek.

Jak w tych, tak i w poprzednio opisanych wypadkach pośrednikami w przenoszeniu pyłków jednych kwiatów na słupki drugich—są owady, przeważnie zaś takie, jak pszczoły, osy, trzmiele i t. d. Jaskrawa barwa kwiatów czyni je widocznymi dla tych owadów, zwabia zaś je obecność słodkiego soku, który znajduje się w osobnych gruczołkach, zwanych *miodnikami*, umieszczonych w głębi kwiatów. Sok ten

służy po części za pożywienie tym owadom, po części jako materiał do wyrabiania miodu.

Niektóre kwiaty są jakby umyślnie przystosowane do tego, aby jak najwięcej skorzystać z odwiedzin owadów dla celu opylenia. Tak w kwiatach: jasnoty białej, szałwi (fig. 587) i wielu innych podobnych roślin, t. zw. *wargowych*, pręciki ukryte są w górnej części kwiatu, mającej kształt wargi; są przytem tak urządzone, że gdy owad chce dostać się do głębi kwiatu, gdzie znajdują się miodniki, musi potrącić o blaszkę, przez co pręciki wychylają się i wytrząsają pyłek na grzbiet jego włosom pokryty. Gdy następnie ten sam owad przenosi się na inny kwiat, ociera się przede-




Fig. 587. Kwiat szałwi zwiedzany przez trzmieła.

wszystkiem o wystający długi słupek (fig. 587, 2), zostawiając na nim część zebranego pyłku.

Nie wszystkie wszakże rośliny potrzebują pośrednictwa owadów dla roznoszenia pyłku; u bardzo wielu roślin roznosi go wiatr, przenosząc z jednych kwiatów na drugie. Do takich należy większa część naszych drzew leśnych i traw, u których przytem zwykle pręciki i słupki są na osobnych kwiatkach. Wszystkie takie rośliny mają kwiaty drobne, niepozorne i nie zabarwione jaskrawo. Nazywamy je *wiatropylkami*.

Niektóre rodziny roślin.

345. Spróbujmy teraz ugrupować przynajmniej część poznanych roślin w rodziny, według ich naturalnego powinowactwa. Za podstawę do podziału na rodziny służy podo-

bieństwo w budowie kwiatu, które istotnie jest cechą pewnego naturalnego pokrewieństwa; rzeczywiście—rośliny, których kwiaty jednakowo są zbudowane (należące do jednego rodzaju), mogą się z sobą zrastać, a niekiedy i mieszać. Tak np. zraz jabłoni może być zaszczerpiony na płożce pigwy, gruszy lub jarzębiny, a zrastając się z nią, daje jakby jedno drzewo. Pyłki jednego gatunku, padając na znamiona pokrewnego mu, dają niekiedy nasiona, z których wyrastają mieszańce, t. j. rośliny, łączące w sobie cechy obu gatunków.

Z rodzin jednoliścieniowych poznaliśmy już **Palmy** i **Trawy**. Wspomnieć tu należy jeszcze o rodzinie **Liljowatych** (*Liliaceae*), obejmującej wiele ozdobnych roślin, do których należą: **Lilje**, **Tulipany**, **Narcyzy**, **Hjacynty**, znane już nam: **Konwalja**, **Konwalijska**, **Szafran** i wiele innych. Należą tu prócz tego: **Czosnek**, **Cebula** i pewna ilość trujących, jak np. **Zimowit**, **Ciemierzycza**, **Wilczypieprz czworolistny**. Cechy tej rodziny są następujące: w skład kwiatu wchodzi sześć listków, tak samo zabarwionych jak płatki korony; trzy z nich wszakże są tylko zmienionymi działkami kielicha. Pręcików jest tu sześć w dwóch rzędach po trzy i w słupku znajdują się trzy oddziały (*komory*). Wszystkich więc części mamy tu po trzy. Ta liczba wogóle powtarza się najczęściej wśród roślin jednoliścieniowych. Do palm bardzo zbliżone są **bananowate** (*Musaceae*) (należy tu **Banan**), do traw — **cyperowate** (*Cyperaceae*), z których poznaliśmy **Turzyce** i **Wełnianki**. Ostatnią rodzinę stanowią **storczykowate** (*Orchideae*).

346. Z pośród bardzo licznych roślin dwuliścieniowych wymienimy tylko kilka rodzin:

1. **Jaskrowate** (*Ranunculaceae*) mają kwiaty (fig. 588), złożone z pięciu działek kielicha, pięciu płatków oddzielnych (*wolnych*) bardzo wielu pręcików i wielu słupków zebranych na wypukłym osadniku kwiatowym (fig. 589). Każdy z tych słupków daje zwykle oddzielny owoc—*niełupkę*. Należy tu wiele roślin trujących: **Jaskier**, **Tojad**, **Ciemiernik**; z ziół pospolitych: **Przylaszczka** i **Zawilec**, **Kaczeniec**, **Ostróżka** i inne.



Fig. 588. Kwiat jaskra w przekroju.

Fig. 589. Słupki jaskra.

2. **Różowate** mają podobnie kwiaty o pięciu działkach kielicha, pięciu oddzielnych płatkach i licznych pręcikach, lecz słupki (jeden lub wiele) mieszczą się tu we wklęsłym osadniku kwiatowym (fig. 590), który najczęściej przemienia się w owoc.



Fig. 590. Osadnik kwiatowy róży w przekroju; widać liczne słupki; u brzegu osadnika zwiisa kielich.

Tu należy większa część naszych drzew owocowych: **Gruszka, Jabłoń, Śliwa, Wiśnia, Pigwa, Migdał, Morela** i t. d., również i niektóre krzewy jak: **Głóg, Jarzębina, Róża, Malina, Poziomka, Jeżyna**; z ziół dziko rosnących **Pięciornik** i inne.

3. **Krzyżowe** (*Cruciferae*) (fig. 591), mają cztery działki kielicha i cztery płatki; pręcików jest sześć, z których dwa krótsze, cztery dłuższe, (t. zw. *czterosilne*). Słupek jeden, przemieniający się na owoc podobny do strączka, z przegódką podłużną w środku, który zwany jest *łuszczyną* albo *łuszczynką* (jeśli jest krótki i szerszy).

Należy tu wiele roślin warzywnych: **Kapusta, Rzepa, Rzodkiew, Brukiew, Kalarepa**, także **Gorczyca**; z ziół: **Rzeczucha, Tasznik** i inne.



Fig. 591. Kwiat i owoc krzyżowych, cały i otwarty.

4. **Makowate** (*Papaveraceae*), mają również po cztery płatki, lecz kielich z dwóch działek, pręcików zaś wiele; należy tu prócz **Maku, Jaskółcze ziele**, cz. **Glistownik**.



5. Rośliny **bal-** Fig. 592. Trybula.
daszkowate (*Um-*

belliferae), łatwo je poznać po drobnych kwiatach zebranych w *baldaszki złożone*, i po liściach złożonych, oraz po łodydze wzdłuż bruzdowanej. Należą tu rośliny trujące, jak **Szałaj, Szczwół, Blekot**, oraz użyteczne: **Pietruszka, Marchew, Koper, Kmin, Kolendra, Trybula** (fig. 592) i inne.

6. **Strąkowe** (*Leguminosae*), charakteryzuje je owoc w postaci *strąka* (fig. 593). Najważniejszą z tej rodziny jest podrodzina **motylkowatych** (*Papilionaceae*). Charakterystyczna budowa kwiatu (fig. 594), przypominającego kształt motylka, jest przyczyną nazwy tej rodziny. Korona złożona tu jest z pięciu płatków, z których dwa dolne zrosnięte razem, tworzą *czołenko*, dwa boczne nazywają się *skrzydełkami*, a górny *chorągiewką*. Pręcików jest dziesięć, z których dziewięć zrosniętych niemi swemi u spodu, dziesiąty zaś wolny; wśród nich widać słupek wygięty.



Fig. 593. Strączek grochu otwierający się podłużnie.

Do tej rodziny należy bardzo wiele roślin siewnych: **Bób, Fasola, Groch, Groszek, Soczewka, Wyka, Konieczyna, Esparseta, Lucerna** i t. d. Z dziko rosnących:

Wilżyna. Do *strąkowych* też należą: **Czułek, Akacja** i wiele krzewów ogrodowych.

7. Bardzo łatwo poznać można rośliny **wargowe** (*Labiatae*) po szczególnej budowie kwiatu (fig. 587), którego korona ma kształt pyszczka o dwóch wargach; cztery pręciki ukryte są w górnej wardze; z tych dwa są krótsze, dwa inne dłuższe (t. zw. *dwusilne*); słupek wystaje z kwiatka długą szyjką. Łodygę mają czworograniastą, liście naprzeciwległe. Należą tu przeważnie zioła aromatyczne jak: **Mięta, Szałwia, Macierzanka** i t. d. z innych **Jasnota**.



Fig. 594. Kwiat motylkowatych: w górze, widziany z boku; niżej pręciki i słupek po oddaleniu płatków i kielicha.

U *wargowych* płatki koronowe zrosnięte są w jedną całość. Rośliny takie nazywamy **zrostopłatkowymi**.

8. Do działu *zrostopłatkowych* należy rodzina **Psiankowatych** (*Solanaceae*), obejmująca wiele roślin trujących: **Tytuń, Bieluń,**

Lulek, Wilczojagoda, Psianka; także niektóre użyteczne: **Kartofel, Pomidor.**

9. Zupełnie odrębną budowę kwiatów mają rośliny **złożone** (*Compositae*). To, co zwykle nazywamy kwiatem tych roślin, jest całym kwiatostanem, zwanym *główką* lub *koszyczkiem* (fig. 595). Przyglądając się bliżej, zauważymy, iż



Fig. 595. Główna część kwiatostanu złożonego (stokrotki).




Fig. 596. Pojedyncze kwiatki z główki stokrotki, C—rurkowy, B—języczkowy.

kwiat złożonych składa się z wielkiej ilości drobnych kwiatków, osadzonych na wspólnym osadniku i otoczonych wspólną zieloną *kielichokrywą*. Kwiatki te są albo wszystkie jednakowe (np. u **Cykorji**) albo też środkowe kwiatki mają kształt **rurkowy**, brzeżne zaś są **języczkowe** często odmiennie zabarwione i tworzą promienie otaczające główkę. Za przykład służyć mogą: **Stokrotka** (fig. 595 i 596), **Chryzantyna, Słonecznik**. Prócz tych, należą tu jeszcze: **Krokosz, Wrotycz, Nieśmiertelnik, Mniszek, Chaber, Rumianek** i t. d.

Zbieranie roślin i układanie zielnika.

347. Do zbierania roślin potrzebne są: puszka blaszana na pasku, łyżka żelazna do odkopywania, mocny scyzoryk, szczypczyki, szkło powiększające i cienka igła wprawiona w drewnianą rączkę. Prócz tego trzeba mieć wielką ilość bibuły i prasę, która w najprostszej formie składa się z dwóch gładkich i mocnych desek; pomiędzy te deski kładzie się rośliny, ściska się je sznurkiem lub przykładą się na wierzch kamieniami.

Przy zbieraniu, rośliny niezbyt wielkie należy wykopywać z korzeniem i kłaść do puszki w ten sposób, aby korzenie wszystkich roślin obrócone były w jedną stronę. Małe roślinki należy poprzednio zawijać w bibułę; z wielkich ziół krzewów lub drzew, bierze się gałązka z liśćmi i kwiatami.

Kładąc rośliny pod prasę, należy postąpić w ten sposób: zbyt grube korzenie: cebule, bulwy, również jak i główki kwiatowe należy przecinać na połowy, z których jedną się zasusza. Kwiatostany zbyt obfite należy przerzedzać, t. j. poobrywać niektóre kwiatki tak, aby nigdzie nie przypadało więcej nad dwa kwiaty, leżące jeden na drugim. Położywszy roślinę na bibule, trzeba jej liście rozłożyć i przykryć drugim arkuszem bibuły: liście grube i soczyste dobrze jest przekładać osobnymi kawałkami bibuły, niezbędne jest takie przekładanie w miejscach, gdzie łodyga, liście lub kwiaty stykają się z sobą. Jeśli pojedyncze części, np. korzenie są bardzo grube, to na cieńsze miejsca nakłada się tyle bibuły, aby się zrównała z grubszymi. W większych kwiatach należy jeszcze położyć cieńszą bibułę pod pręciki i słupki, aby ochronić płatki kwiatów od plam, które powstają od odcisnięcia pręcików. Układać należy kwiaty tak, aby jednej były obrócone stroną wewnętrzną, drugie zewnętrzną, trzecie boczną.

Pod prasę kładzie się jednocześnie 15—20 arkuszy z roślinami, przekładając je kilkoma próżnemi arkuszami bibuły, ażeby wilgoć miała gdzie wsiąkać. Wszystko to ściska się śrubą i wystawia w suchem miejscu. Im szybciej wysychają rośliny, tem lepiej się zachowują; dobrze jest więc umieścić prasę koło pieca. Co kilka dni potrzeba rośliny przekładać usuwając próżne arkusze wilgotnej bibuły i zastępując je suchemi. Im dalej posuwa się wysychanie, tem silniej powinniśmy ściskać prasę.

Bardzo soczyste rośliny zachowują przez długi czas świeżość; często rosną w bibule, wysiewają nasiona i t. p. Aby temu zapobiedz, dobrze jest przed układaniem do suszenia zanurzyć je we wrzącą wodę.

Gdy po upływie 8 — 16 dni rośliny wyschną zupełnie, przekładamy je na arkusze białego papieru, do którego można je przymocować cienkimi paseczkami papierowymi albo przyszyć niemi; potem umieszcza się napis, w którym prócz nazwy rośliny i rodziny, do której należy, pisze się miejsce i czas znalezienia. Pojedyncze arkusze z roślinami układamy według rodzajów i rodzin.

Prócz zielnika zawierającego całe rośliny lub znaczniejsze ich części, można tworzyć zbiory szczegółowe: owoców, nasion, liści, kwiatów, pączków zebranych w zimie (w tym celu odcinają się gałązki na 3 — 4 cale długie z krzewów i drzew), wreszcie okazy drewna rozmaitych drzew i krzewów.











KRÓLESTWO MINERAŁÓW.

348. Królestwo mineralne nazywamy zwykle nieżywym; istotnie też twory jego pozbawione są tych cech, które każą nam nazywać żywymi rośliny i zwierzęta. Myliłby się wszakże, ktoby przypuszczał, iż królestwo mineralne pozbawione jest wszelkich zmian; i tu dają się widzieć ciągle przeobrażenia: powstawanie nowych skał i minerałów, rozkład istniejących, przemiana jednych w drugie. Cały ruch ten, acz powolny i dla oka niewidzialny, trwa ustawicznie.

Ażeby zrozumieć to powolne i utajone życie nieżywych ciał kopalnych, powinniśmy zwrócić uwagę na niektóre zjawiska, dające się codzień dostrzedz w życiu potocznym.

Już we wstępie tej książki widzieliśmy, jak z roztworu soli kuchennej lub ałunu, tworzą się w miarę powolnego parowania wody, **kryształy** i jak kryształy te, będąc zanurzone w stężonym roztworze tej samej soli, rosną stopniowo. Moglibyśmy zrobić doświadczenie odwrotne: jeśli do mocnego roztworu soli, w którym urósł już znaczny kryształ, dolejemy wody, zauważymy, że kryształ zacznie powoli topnieć, aż zniknie zupełnie. Nastąpiło tu *rozpuszczenie soli*. Z roztworu takiego możemy powtórnie otrzymać kryształy — jeśli go odparujemy na ogniu do odpowiedniej gęstości. Możemy w ten sposób kilkakrotnie rozpuścić i *wykrystalizować* sól, a otrzymamy ją zawsze jednakową.

Niektóre ciała możemy roztopić na ogniu. Weźmy np. trochę siarki i stopmy ją w tygielku porcelanowym, zakrywając nakrywką, aby się nie zapaliła. Skoro odejmiemy lampkę, siarka zacznie zastygać. Poczekajmy, zanim utworzy



się na powierzchni dosyć gruba skorupa, i przebiwszy ją, wylejmy ciekłą jeszcze siarkę z wnętrza. Jeśli teraz wyjmemy z tygielka kawałki pozostałej na ściankach skrzepłej siarki, zauważymy, że kawałki te utworzone są z drobnych kryształów.

Tę własność ma bardzo dużo ciał w przyrodzie, które gdy ze stanu ciekłego, rozpuszczonego lub roztopionego przechodzą w stały (twardy), przyjmują postać **kryształów**.

Kształty kryształów bywają bardzo rozmaite, proste i złożone, gdyż jedne z nich łączą się z drugimi. Najważniejszymi są następujące: sześcián (fig. 597), ośmiościan (fig. 598), słup czworoboczny (fig. 599), ostrosłup i słup sześcioboczny (fig. 600), rombościan (fig. 601).

349. Przemiany, o któ- Fig. 597. Sześcián. Fig. 598. Ośmiościan.







Fig. 599. Słup czworoboczny.

Fig. 600. Ostrosłup i słup sześcioboczny.

Fig. 601. Rombościan.

rych mówiliśmy, np. rozpuszczenie, krystalizacja nie zmieniają samego ciała, lecz tylko stan jego. Siarka roztopiona jest zawsze siarką i wraca do pierwotnej formy po ostygnięciu. Sól rozpuszczona nie przestaje być solą; dosyć jest wodę odparować, aby ją otrzymać napowrót. Przemiany te nazywamy **fizycznymi**.

Są wszakże inne przemiany, w których samo ciało zmienia się nie do poznania. Jeżeli np. podpalimy siarkę to płonie ona niebieskim płomykiem, wydzielając silną woń. Woń ta jest właściwą gazowi, który przy tem powstaje w postaci dymu. Po upływie pewnego czasu siarka spali się całkowicie: nic po niej nie zostanie, prócz woni w pokoju, świadczącej o tem, że gaz, na który siarka się zamieniła, rozszedł

się w powietrzu. Moglibyśmy go zebrać do klosza i zbadać jego własności. Uczynili to uczeni, a badanie takie przekonało, że podczas palenia się, siarka łączy się z gazem — **tlenem**, znajdującym się w powietrzu. Powstający przez to połączenie nowy gaz nazywa się **dwutlenkiem siarki**. Można go znowu rozdzielić na siarkę i tlen czyli *rozłożyć*; nie idzie to wszakże tak łatwo, jak otrzymanie soli z roztworu.

Jeżeli żelazo leży przez dłuższy czas w powietrzu wilgotnem, to pokrywa się warstwą czerwonawej rdzy. Badanie rdzy przekonało, że składa się ona z połączenia żelaza z tym samym tlenem. Wygląd jej nic a nic nie przypomina ani żelaza ani tlenu. Pierwsze jest metalem, drugi — gazem bezbarwnym; rdza zaś ma wygląd ziemisty. Możemy zrobić takie doświadczenie: trochę opilek żelaznych (które można dostać u ślusarza) zmieszajmy z równą ilością prosz-




Fig. 602. Podnoszenie się wody pod kloszem przy paleniu.

ku siarki i ogrzejmy tę mieszaninę w tygielku glinianym do czerwoności. Po ostygnięciu stopionej masy dostaniemy z tygielka czarną kruchą substancję, nie podobną ani do żelaza, ani do siarki. Jest to połączenie obu, t. zw. **siarek** czyli **siarczyk żelaza**. Przemiany tylko co opisane nazywamy **chemicznymi**.

350. Wszelkie wogóle palenie się, jest **łączeniem się z tlenem**; tlen bowiem ma tę własność, że łatwo łączy się z innymi ciałami,

a przy tem połączeniu wytwarza się ciepło. Łatwo się przekonać, że przy paleniu się znika coś z powietrza. Weźmy głęboki spodek i nalejmy nań wodę (fig. 602). Połóżmy na wodę mały kawałeczek drzewa lub korek, a na nim kawałeczek zwiniętej bibuły napojonej spirytusem. Zapalmy spirytus i szybko nakryjmy płomień kloszem lub szklanką tak, aby brzegi jej zanurzyły się w wodzie. Zauważymy, że woda w szklance podniesie się a płomień niebawem zgaśnie. Woda zajęła teraz miejsce tego gazu, który podtrzymywał palenie, łącząc się ze spirytusem. Pozostał inny gaz — azot

(i niektóre inne jeszcze), który nie łączy się tak łatwo jak tlen i dlatego nie podtrzymuje ognia.

W powietrzu tlen jest rozrzedzony azotem i innymi gazami, nie działa więc tak mocno jak tlen czysty. Możemy wszakże otrzymać i czysty tlen, a doświadczenie to posłuży nam za przykład *rozkładu* chemicznego. W aptekach można dostać czerwonego proszku, zwanego **tlenkiem rtęci**. Nasypmy trochę tego proszku do rurki, o jednym końcu zalutowanym (t. zw. *próbówki*) i ogrzejmy ją na lampie (fig. 603). Po upływie pewnego czasu zauważymy, że ponad ogrzaną częścią rurki utworzyło się lustro z błyszczących kropelek **rtęci**. Jeżeli teraz wprowadzimy do rurki tylko tlejącą zapałkę, wybuchnie ona jasnym płomieniem. Tlenek rtęci (który jest niejako rdzą rtęciową) rozłożył się od ciepła na rtęć (żywe srebro) i tlen, który znajduje się w rurce i podsyca płomień, silnie łącząc się z tlejącym węgielkiem. Połączenie, które przy tem powstaje, nazywa się **kwasem węglowym**. Znajduje się jego zawsze pewna (choć bardzo drobna) ilość w powietrzu. Tworzy się też ustawnie przy oddychaniu zwierząt; oddychanie bowiem jest także powolnem paleniem się ciała, którego składowe części łączą się z tlenem, a powstający przy tem kwas węglowy wydziela się z oddechem.

Nie wszystkie ciała dają się rozłożyć tak, jak tlenek rtęci. Między ciałami przyrody są takie, których żadnymi sposobami rozłożyć się nie udało. Do takich należą: tlen, siarka, żelazo, rtęć, azot i t. d. Takie ciała nazywamy **prostymi** czyli **pierwiastkami**; te zaś, które dają się rozłożyć na ciała proste, nazywamy **złożonymi** lub **związkami chemicznymi**, powstają one bowiem z połączenia czyli związania się z sobą prostych. Pierwiastków, znanych obecnie, jest siedmdziesiąt.



Fig. 603. Tlejąca drzazga rozpala się w tlenie.

351. Przebiegniemy w krótkości całą historję życia ziemi, ciągnącego się przez miliony lat. Naprzód wszakże poznać winniśmy jej budowę obecną, oraz części z których się składa.

Nie głęboko wkopał się człowiek w ziemię: najgłębsze kopalnie nie przenoszą dwóch kilometrów, co stanowi mniej niż $\frac{1}{3000}$ część odległości od powierzchni do środka kuli ziemskiej. Mało więc wiemy pewnego o jej budowie. Z tego wszakże, co widzimy, możemy wysnuć niektóre wnioski bardzo prawdopodobne.

Tak naprzód, zauważono już dawno, że im więcej spuszcza się w głąb kopalni, tem robi się cieplej. Obliczono według tego podwyższenia ciepłoty (gdyby było stałe i jednakowe), że już na głębokości kilkudziesięciu kilometrów, żar byłby tak wielki, iż żadne ze znanych nam ciał nie mogłoby się utrzymać w stanie stałym. Przypuszczają więc,

że w tej głębokości wszystko już jest stopione i że całe wnętrze kuli ziemskiej jest utworzone z **rozżarzonej płynnej masy**, podobnej do roztopionego surowca lub stali, a otoczonej cienką stosunkowo **skorupą zastygłą**.

Za tem przypuszczeniem przemawiają i **wulkany**: są to bowiem szczeliny (zwykle mieszczące się w szczycie niewysokich gór), przez które od czasu do czasu wypływa **rozżarzona masa** czyli **lava**. Przypuszczają więc, że szczeliny te przebijają całą grubość skorupy




Fig. 604. Budowa kuli ziemskiej według wyobrażeń geologów: A — krater wulkanu, B—lava na zboczach góry, C—warstwy skorupy ziemskiej, D—roztopiona masa wnętrza.

ziemskiej, dosięgając płynnego jej wnętrza i że lava nie jest niczem innem, jak tylko ową masą rozżarzoną, wypływającą przez te otwory.

Przeciwko temu przypuszczeniu czyniono wszakże poważne zarzuty. Wiadomo, że ciała, które topią się w pewnej ciepłocie, pod zwykłym ciśnieniem powietrza, mogą być ogrzane nierównie silniej bez niego, aby się roztopiły, jeśli je poddać bardzo silnemu ciśnieniu. Ponieważ zaś ciśnienie,

pod którem znajduje się wewnątrz ziemi, wskutek ciśnienia na nie warstw skorupy, jest olbrzymie, więc pomimo ogromnego żaru, może to wewnątrz nie być roztopionem. Skoro jednak ciśnienie to w jakimkolwiek miejscu zmniejsza się, wskutek utworzenia się szczeliny, masa topi się natychmiast i wypływa w postaci lawy.

Jakkolwiekbyśmy wyobrażamy sobie zwykle, że kula ziemską utworzyła się z rozżarzonej płynnej masy, która niegdyś podobną była do słońca, wskutek stopniowego ostygania powierzchnia jej stwardniała i utworzyła ową skorupę; wewnątrz zaś dotąd jest rozżarzone, ale stopniowo bardzo powolnie ostyga.

352. Badaniu naszemu jest zatem dostępną sama tylko skorupa, i to jej najbardziej powierzchowne warstwy.

Wszystko, co w tych warstwach znajdujemy; należy do królestwa mineralnego czyli kopalnego. Wszystkie utwory znajdujące w skorupie ziemskiej, nazywamy **minerałami** albo **skałami**.

Minerały są utworami jednorodnymi; t. j. takimi, których każdy ułamek ma jednakowy skład chemiczny; przytem najczęściej mają postać krystaliczną. Za przykład służyć mogą: kryształ górny, siarka kopalna, węgiel kamienny i t. p.

Skałami zwiemy utwory, które powstały z rozmaitych minerałów, najczęściej z ich drobnych ułamków lub okruszyn, spojonych jakimkolwiek lepiszczem. Tak np. **granit** składa się z drobnych kawałeczków kwarcu, miki i szpatu polnego; **piaskowiec** — z ziarn piasku; **łupki** — z drobnutkich ziarn gliny i t. d. Skały więc nie są jednorodne, gdyż każdy ich kawałeczek zwykle ma skład odmienny. Ze skał składa się głównie skorupa ziemską; tworzą one zwykle ogromne pokłady, podczas gdy minerały spotykają się pojedynczo lub też tworzą niewielkie żyły między skałami (jak np. rudy, węgiel kamienny); rzadko zaś większe pokłady, jak sól kamienna w Wieliczce.

353. Stosownie do sposobu powstawania, dzielimy **skały** na **wodne**, **ogniowe**, **przeobrażone** czyli **metamorficzne** i **organiczne**.

Skały wodne (fig. 607) utworzyły się przez osadzanie się z wody, jak już wspominaliśmy, np. ujścia rzek; a ponieważ osadzanie to odbywa się warstwa za warstwą, przez długi szereg lat, więc mają one budowę warstwowatą. Jeśli podczas osadzania się tych warstw pomiędzy piaskiem lub gliną

znalazły się jakieś szczątki zwierząt lub roślin, np. muszle, kości, gałązki i liście drzew, to zachowują się ich odciski lub szczątki (fig. 605 i 606). Skały wodne mogą więc zawierać ślady lub szczątki istot żywych i przechowują nam po-



Fig. 605. Odcisk rośliny na węglu.



Fig. 606. Wapień muszlowy.

stać tworów dawno zaginionych (**wapnie, gips, piaskowce**) (fig. 607) i t. d.

Skały ogniowe powstają przez zastyganie roztopionej masy i mają dlatego budowę krystaliczną. Nie mogą one zawierać oczywiście żadnych szczątków organizmów, gdyż straszny żar, w którym skały te powstały, musiałby je zniweczyć. Należą tu: **bazalt** (fig. 608) **granit**, **porfir** i t. d.

Skały przeobrażone czyli **metamorficzne** powstały ze skał osadowych wskutek działania na nie



Fig. 607. Pokłady piaskowca.



Fig. 608. Słupy bazaltowe.

żaru; znajdujemy je zawsze w sąsiedztwie ze skałami ogniwymi, np. z żyłami granitu (fig. 609). Wiemy, że żyły te powstały wskutek napełnienia szczelin masą roztopioną;

łatwo więc zrozumiemy, że części skał osadowych najbliższe żyły, tworzące brzegi szczeliny, uległy pod wpływem żaru przeobrażeniu, podczas gdy dalsze zachowały swój charakter pierwotny. Pod wpływem tego żaru skały osadowe ulegają rozmiękczeniu; dlatego też nie znajdujemy w nich żadnych szczątków organicznych, natomiast przybierają one budowę drobno-krystaliczną, jaką widzimy np. w marmurze.

Wreszcie **skalami organicznymi** nazywamy te, które powstały ze szczątków roślin lub zwierząt kopalnych. Do takich należą wapień muszlowy (fig. 606) kreda (fig. 379) i t. p.

354. Całą historję skorupy ziemskiej dzielią geologowie na kilka **okresów**, które znow dzielą się na **formacje**, te zaś na **piętra**. Rozumie się, że okresy te są bez porównania dłuższe niż jakikolwiek bądź okres historii rodzaju ludzkiego; długość ich bowiem liczy się na setki tysięcy, a nawet miliony lat.




Fig. 609. Żyły granitu (a) w masie gnejsu (gn) na przykładzie Wrath w Szkocji. Roztopiona masa, która przy zastyganiu dała granit, wdzierając się do warstw osadowych, przekształciła je na metamorficzny gnejs.

Okres pierwotny obejmuje skały pozbawione skamieniałości, a więc skały ogniowe i metamorficzne. Pierwsze z nich powstały przez zastyganie powierzchni rozżarzonej masy kuli ziemskiej. Nie może w nich być oczywiście żadnych śladów życia organicznego, którego nie było też w owym czasie na ziemi. Skały tego okresu dzielimy na **dawniejsze** czyli **ziarnkowato-krystaliczne**, do których należą **granity**, **sjenity** i **porfiry**—i skały **najmłodsze** czyli **łupkowo-krystaliczne**, obejmujące **gnejs** i **łupki krystaliczne**, należące do skał metamorficznych.

Dalej idzie okres **pierwszorzędowy** obejmujący formacje: **sylurską**, **dewońską** i **węglową**. Tu ukazują się już ślady życia, naprzód w postaci najniższych istot **numulitów** (fig.

610), należących do pierwotniaków; dalej występują obficie polipy, skorupiaki i olbrzymie mięczaki, wśród których znane pospolicie **amonity** (fig. 611), dosięgają wielkości koła młyńskiego. Towarzyszą





Fig. 610. Numulity.

Fig. 611. Amonit.

Fig. 612. Belemnit.

im **belemnity** (fig. 612) i inne głowonogi. Wreszcie ukazują się pierwsze kręgowce—**ryby**.

Podobnież stopniowanie daje się widzieć i w roślinach. Z początku ukazują się najniższe — **wodorosty**; dalej idą



Fig. 613. Las z formacji węglowej.

skrzypy i widłaki, które zwłaszcza w formacji węglowej przybierają szczególne rozpowszechnienie i dosięgają ogromnej wielkości. Towarzyszą im **paprocie** (fig. 613). Nareszcie ukazują się pierwsze drzewa nasienne — **sagowce**.

Okres drugorzędowy obejmuje formacje: **trjasową**, **jurajską** i **kredową**. Tu widzimy już wyższe formy życia. Ukazują się olbrzymie potwory, pośrednie pomiędzy rybami, płazami a jaszczurkami, jak **Ichtjozaurus** (fig. 614) i **Plezjozaurus** (fig. 615); następnie istoty łączące cechy ptaków i jaszczurek, jak **Pterodaktylus** (fig. 616).



Fig. 614. Ichthyosaurus.



Fig. 615. Plezjozaurus.

Okres trzeciorzędowy dzieli się na formacje: **eo-ceniczną**, **mioce-niczną** i **plioceni-czną**. Zwierzęta tu są już bardziej zbliżone kształtami do obecnych; znajdujemy tu kości olbrzymich *nosorożców* i *mastodontów*, liczne owady przechowane są w kawałkach *bursztynu* (Tab. XVII fig. 9), który jest skamieniałą żywicą drzew dawnych. W końcu tego okresu znajdujemy pierwsze szczątki człowieka.



Fig. 616. Pterodaktylus.




Fig. 617. Mamut.

Okres czwartorzędowy jest ku nam najbliższy. Zwierzęta i rośliny doń należące są już bardzo podobne do dzisiejszych, tylko zwykle znacznie większe, jak np. **Mamut** (fig. 617) czyli **śłoń czwartorzędowy**; **niedźwiedź jaskiniowy**, **jeleń**, **koń**.



Fig. 618. Narzędzia krzemienne wyrabiane przez człowieka pierwotnego.

Szczątki człowieka spotykają się coraz częściej, a dowodzą, że żył w jaskiniach, walcząc z dzikimi zwierzętami; robił sobie najprostsze narzędzia z kamienia i kości zwierząt

(fig. 618). Ogromne śmietniska, znajduwane w jaskiniach, zawierają szczątki pierwotnej kuchni człowieka z owego okresu. Cały ten okres dzieli się na **diluvium** (warstwy *potopowe*) i **aluvium** *napiływowe* czyli najnowsze. Do tego ostatniego należą warstwy piasku i gliny, które widzimy na brzegach



Fig. 619. Lodowiec.

rzek, a które jeszcze nie miały czasu przekształcić się w spójne skały. Do okresu czwartorzędowego należą olbrzymie **głazy**, które spotykamy rozrzucone na polach w naszym kraju. Przybyły one razem z **lodowcami** z Europy północnej, Finlandji i Szwecji. Wtedy lodowce te (fig. 619) ciągnęły się na ogromnej przestrzeni (*okres lodowaty*). Lodowce takie dziś znajdujemy tylko na wysokich

górach; powstają one z nawpół rozmiękłego śniegu. Dawniej były rozszerzone nawet na równinach.

355. Przez cały ten wielowiekowy czas historii powierzchni ziemi, zmieniły się na niej nie tylko rozmaite kształty życia. Gdy jedne zwierzęta i rośliny ustępowały miejsce innym, zmieniały się także kształty lądów i mórz. Jedne części świata wskutek stopniowego wklęsania się skorupy ziemskiej, zapadały się powoli w ciągu tysiącleci pod wodę, inne wynosiły się z dna morskiego nad jego powierzchnię, tworząc nowe lądy. Wody rzeczne rozmywały góry i unosząc ich szczątki w postaci żwiru, piasku i mułu, osadzały je w morzu: w ten sposób wznosiły się stopniowo nowe lądy, tworzyły się nowe skały z okruszków dawnych.

Po tych skałach, po ich warstwach leżących na sobie, wyczytuje geolog historję ziemi i oblicza jej wiek, a szczątki zwierząt i roślin dopomagają mu w tej pracy.

356. Przystąpmy teraz do przeglądu najważniejszych minerałów, które znajdujemy w ziemi, a z których utworzone są rozmaite skały.

Najbardziej rozpowszechnionymi na powierzchni ziemi są te minerały, w których skład wchodzi **krzemionka** — znana każdemu, kto miał w ręku krzemień lub kryształ górny. Jest to połączenie pierwiastku *krzemu* z *tlenem* — gazem znajdującym się w powietrzu, którym oddychamy. Rozróżniamy

minerały składające się z czystej lub prawie czystej krzemionki i takie, w których jest ona połączona z innymi pierwiastkami lub związkami chemicznymi (**krzemiany**).

Z czystej krzemionki złożone są następujące minerały:

Kwarc, którego najczystszą formę przedstawia **kryształ górny** (*Tab. XVII, fig. 10*) i (*fig. 620*); spotyka się on bardzo często w kryształach — słupach sześciobocznych, rombościanami zakończonych.

Odmianami kwarcu, różniącemi się przeważnie tylko tem, że wskutek nieznacznej domieszki rozmaitych związków che-



Fig. 620. Kryształ górny.



Fig. 621. Agat.

micznych (przeważnie metali: żelaza i manganu), przybierają one rozmaite zabarwienia, są:

Ametyst w prześlicznych jasno-fioletowych kryształach. **Kwarc zadymiony** w ogromnych kryształach ciemno-brunatnych, jakby dymem okopconych.

Nawpół krystaliczna krzemionka tworzy **Chalcedony** półprzezryste; **Agaty** (*Tab. XVII, fig. 3*) i (*fig. 621*), rozmaicie zabarwione, złożone są z niekrystalicznej krzemionki, podobnie **jaspisy**.

Opal i **krzemień** są niekrystaliczną krzemionką. **Piasek** jest drobnym, sproszkowanym kwarcem.

Wśród **krzemianów** czyli połączeń krzemionki, najważniejsze miejsce zajmuje **szpat polny** (*Tab. XVII, fig. 5*), który prócz krzemionki zawiera niektóre metale (potas, wapień i magn). Prócz zwykłego szpatu polnego, mającego rozmaite barwy: białą, zieloną, czerwoną lub szarą, należy tu czarny **labrador** o wspaniałych połyskach tęczowych.

Mika powszechnie znana ze swojej łupliwości na cienkie plasterki, jest również związkim krzemionkowym. Zbliżone są do niej **talk** i **chloryt**, również łatwo łupliwe. **Kamień mydlany** (*Tab. XVII, fig. 7*) używa się w proszku dla ułatwienia wkładania rękawiczek i obuwia.

Azbest składa się z drobnych włóknistych i giętkich kryształów, z których, jak z włókien, robią tkaniny ogniotrwałe.

Granat (*Tab. XVII, fig. 8*) jest bardzo pięknie krystalizującym związkim krzemionkowym, którego ładniejsze okazy szlifowane używają się jako drogie kamienie.

Leucyt (*Tab. XVII, fig. 17*) należy również do krzemianów.

357. Do gromady **drogich kamieni** zaliczamy minerały, odznaczające się właściwym blaskiem i twardością. Należą tu



Fig. 622. Djament
nieoszlifowany.



Fig. 623.
Djamenty oszlifowane czyli brylanty.



pewne odmiany **korundu** — minerału bardzo twardego, który w pospolitszej formie zmielony na proszek, używa się do polerowania *właściwych drogich kamieni*, a także i **djamentów**.

Do *drogich kamieni* należą: **Rubin**, prześlicznej karminowej barwy. **Szafiry**, niebieskie lub żółtawe. **Topaz**, żółty albo czerwonawy, bardzo przejrzysty. **Smaragd** (*Tab. XVII, fig. 16*), pięknej zielonej barwy, jest odmianą **berylu**, którego inna mniej piękna ale także dosyć kosztowna odmiana nazywa się **akwamaryną** (woda morska): ma ona postać zielonkawych słupów sześciobocznych.

Djament (*fig. 622 i 623*) jest czystym skrystalizowanym węglem. Naturalnie djamenty nie mają tego pięknego blasku ani gry kolorów, której nabywają dopiero po oszlifowaniu, to jest jako *brylanty*. Djament jest najtwardszym ze wszystkich minerałów; rysuje on wszystkie inne, ale przez

żaden nie może być porysowany. Twardość ta jest przyczyną, że go niezmiernie trudno oszlifować.

358. Inną odmianą węgla jest **grafit**, czarny, miękki minerał, używany do robienia ołówków. Przypuszczają, iż powstał w bardzo odległych epokach ze szczątków zwęglonych drobnych organizmów.

Niewątpliwie organicznego pochodzenia jest **węgiel kamienny** (Tab. XVII, fig. 11), którego pokłady powstały z olbrzymich lasów, o czym świadczą obficie znajdujące się w nim odciski i szczątki roślinne. Do minerałów organicznego pochodzenia należą, prócz węgla kamiennego, **asfalt**, rodzaj żywicy kopalnej i wymieniony już **burztyń** (Tab. XVII, fig. 9), znajdujący się przeważnie u wybrzeży morza Bałtyckiego.

Co do **oleju skalnego**, wypływającego w niektórych miejscowościach z ziemi (np. w Galicji, w Ameryce, na Kaukazie), niema pewności, czy jest organicznego pochodzenia, czyli też mineralnego. W celu otrzymania oleju skalnego, w miejscowościach, gdzie znajdują się źródła, świdrują otwór w ziemi, przy pomocy olbrzymich, bardzo długich świrdrów, wewnątrz wydrążonych. Skoro otwór dojdzie do źródła, olej czyli ropa wytryska do góry w postaci fontanny (fig. 624). Z ropy tej otrzymują *naftę*, *benzynę*, *parafinę* i inne substancje.




Fig. 624. Źródło wytryskujące ropy naftowej.

359. Rozmaite **gliny** są połączeniem z tlenem glinu czyli **aluminium**—owego lekkiego, srebrzystego metalu, używanego dziś na rozmaite wyroby. Najczystsza glina czyli **kaolin** jest zupełnie biała i używa się na wyrób porcelany. Inne gatunki są zabarwione przez domieszkę żelaza lub innych minerałów.

Obsydjan jest rodzajem szkła naturalnego, powstającego przez stopienie w wulkanach krzemionki z gliną i innymi minerałami.

Pumeks jest zastygłą pianą lawy. Jestto szklista masa, która stała się porowatą wskutek bąbli gazu, znajdujących się w niej przy zastyganiu.

360. Bardzo liczne są minerały **wapniowe**. Zwłaszcza

zaś **węglany wapnia**, t. j. połączenie metalu wapnia z kwasem węglowym, są obficie rozrzucone na powierzchni kuli ziemskiej.

Szpat wapienny czyli **kalcyt** i **aragonit** są to dwa krystaliczne węglany wapnia różniące się postacią swoich kryształów.




Fig. 625. Szpat islandzki.

Pierwszy spotyka się w ogromnych kryształach rombościennych i używa się do przyrządów optycznych, zwłaszcza jako **szpat islandzki** czyli **wapień dwójłomny**, który jest przezroczysty, i ma własność podwójnego załamania

światła, tak, iż przedmioty przezeń widziane, dwóją się (fig. 625). Węglanem wapnia są także: drobno-krystaliczny **marmur**; **kamień litograficzny** osadowego pochodzenia używany do litografji; **kreda** utworzona z pancerzy drobnych istotek organicznych (otwornic); **muszlowiec** utworzony z muszel; **stalaktyty**, powstające przez osadzenie się wapna z roztworu, który powoli kapie ze sklepienia grotu lub szczeliny. W ten sposób tworzą się całe słupy (fig 627), których dolny stożek nazywa się **stalagmitem**, górny zaś **stalaktytem** (Na fig. 2, Tab. XVII widzimy ułamek takiego osadzonego wapna).

Połączenie wapnia z kwasem siarczanym tworzy znany powszechnie **gips** lub też włóknisto - krystaliczny **selenit**, używany na wyroby ozdobne.



Fig. 626. Wnętrze kopalni w Wieliczce.

Szpat topliwy (Tab. XVII fig. 7) czyli **fluoryt** jest połączeniem wapnia z innym pierwiastkiem, fluorem. Tworzy on piękne kryształy żółte, różowe lub fioletowe.

361. **Solami** wogóle nazywamy **związki metalów z kwasami**. Do rozpuszczalnych w wodzie soli należą:

Sól kamienna, krystalizująca w sześciianach (fig. 628). Ołbrzymie jej pokłady, słynne od wieków, znajdują się w Wieliczce (fig. 626). Prócz tego spotyka się sól rozpuszczona

w wodzie w źródłach słonych i w morzach. *Sól kopalną* otrzymują przez wyłamywanie jej pokładów w kopalniach. *Sól zaś źródeł słonych* lub z wody morskiej otrzymuje się przez odparowanie z niej wody. Początkowo puszczają wodę




Fig. 627. Stalaktyty i stalagmity.

słoną na **tężnie** (fig. 628); są to ogromne budowle wypełnione chróstem i suchymi gałązkami. Woda słona pompowana do gór w dziurkowate koryta, sączy się przez ten chróst na

dół i w drodze powoli się ulatnia, tak, że zanim przejdzie na dół, roztwór soli staje się znacznie mocniejszy. Po kilkakrotnem przepuszczeniu przez tężnię, gęsty już roztwór odparowuje się ostatecznie w kotłach.

Ałun (fig. 629) jest związkiem, w którego skład wchodzi: glin, kwas siarczany i potas.

Modry kamień jest związkiem kwasu siarczanego i miedzi.




Fig. 628. Tężnie.




Fig. 629. Kryształy ałunu.

Saletra składa się z kwasu azotnego i potasu (*zwyczajna*) lub sodu (*saletra chilijska*). Krystalizuje w słupach czworobocznych. Sole te obok wielu innych znajdują się bądź w ziemi, w postaci pokładów, bądź rozpuszczone w wodach.

362. Do **pierwiastków chemicznych** zaliczamy takie ciała, które nie mogą być na inne rozłożone. Należą tu wszystkie **metale** naturalne (nie splawy) i cały szereg innych ciał, które nazywamy **metaloidami**.

Z **metaloidów**, prócz wymienionego już węgla, w stanie wolnym spotyka się **siarka rodzima** w postaci ładnych kryształów żółtego koloru. Także **antymon** i **arsen**.

Metale znajdujące się w przyrodzie *w stanie wolnym* (nie połączone z innymi pierwiastkami) nazywamy **rodzimiemi**. Połączone z innymi ciałami (najczęściej z tlenem) tworzą **rudy**, z których je wydobywać potrzeba drogą chemicznej przeróbki i wytopienia. Rudy, w których metal połączony jest z tlenem, nazywamy **utlenionemi**. Rudy, w których metal połączony jest z siarką, nazywamy **siarkami** lub **błyszczami**.

363. W stanie wolnym znajdują się następujące metale:

Złoto rodzime spotyka się bądź w postaci kryształów, bądź blaszek i grudek, zwykle wpojone w jakimkolwiek mineralu, najczęściej w kwarcu (*Tab. XVIII, fig. 4*). Aby wy-

dobyć takie złoto (t. zw. złoto rudne), minerałów poddają działaniu maszyn, które go z początku drobia, a później rozcierają na proszek. Z proszku tego otrzymują złoto, działając nań rtęcią, która je rozpuszcza, tworząc **amalgamat**: albo też rozpuszczają złoto w t. zw. *wodzie królewskiej* (mieszanina kwasu azotnego z solnym) jedynym kwasie, który działa na złoto. Częściej wszakże otrzymują złoto przez przemysł **piasków złotodajnych**. Piaski te powstały wskutek naturalnego rozproszkowania minerałów, zawierających złoto. Złoto w piasku znajduje się w postaci drobnego proszku. Aby oddzielić piasek złotodajny, wysypują go na maszyny do przemylwania, w których prąd wody unosi piasek stosunkowo lżejszy; ciężkie zaś złoto zatrzymuje się w urządzeniach w tym celu żłobkach. W piaskach złotodajnych spotykają się od czasu do czasu większe grudki złota, t. zw. **samorodki**, ważące niekiedy po kilka lub kilkadziesiąt funtów.

Platyna ma barwę szaro-srebrzystą; jest to metal nieładny, lecz posiadający nieocenione własności, gdyż będąc znacznie tańszy od złota, jest od niego twardszy i również nie przystępny działaniu kwasów (prócz wody królewskiej, a przysięm nadzwyczajnie trudno-topliwy. Używa się więc przeważnie na naczynia chemiczne i inne wyroby, wymagające tych własności. Znajduje się na Uralu i w Ameryce, w postaci ziarn i grudek.

Srebro rodzime znajduje się w postaci bardzo pięknych kryształów drzewiastych.

Rtęć w postaci kropel lub całych źródeł spotyka się w szczelinach ziemi.

Miedź rodzima spotyka się w kryształach rozmaitej postaci lub w ziarnach (fig. 630).



Fig. 630. Miedź rodzima.

Żelazo z powodu iż łatwo *utlenia* się, t. j. łączy się z tlenem powietrza, rzadko spotyka się w stanie wolnym. Najczęściej znajduje się jako takie w **meteorytach** lub **aerolitach** (fig. 631), t. j. kamieniach spadających z powietrza (t. zw. *gwiazdy spadające*), które są najczęściej złożone z czystego żalaza. Przypuszczają,

iż są to drobne ułamki jakiejś rozprysłej planety, krążące w przestrzeni, a spadające na ziemię, gdy ziemia w obiegu dookoła słońca zbliża się do nich. Meteoryty osiągają niekiedy olbrzymiej wagi, przenoszącej 7000 funtów.

364. Inne metale, tak jak miedź i żelazo, które tylko w niewielkiej ilości spotykają się jako metale rodzime, otrzymuje się z rud.

Najważniejsze rudy utlenione żelaza są: **magnetyt** czyli **magnes naturalny**, najczystsza z rud żelaznych zawiera na 100 części— 72 części żelaza a 28 tlenu. Posiada on własności magnetyczne. Kryształy magnetytu mają postać ośmiościanów regularnych. W Skandynawji znajdują się całe góry magnetytu, również i w Ameryce Północnej. Otrzymuje się z niego najlepsza stal.



Fig. 631. Część odpolerowanego przecięcia meteorytu, składającego się z żelaza krystalicznego.

Czerwony tlenek żelaza zawiera 70 części żelaza i 30 tlenu na 100 części rudy. Ma postać krystaliczną, jest również doskonałą rudą żelazną.

Brunatna ruda żelazna należy do pospolitszych; zawiera do 60 części żelaza na 100. Z niej to przyrządzają najwięcej żelaza dobrego gatunku.

Ruda błotna jest tlenkiem czyli rdzą żelaza, zmieszanym z ziemią; zawiera daleko mniejszy procent żelaza.

365. Z rud miedzianych utlenionych, wymienimy **czerwoną rudę miedzianą**, z której otrzymują po części miedź. Zawiera 88 części miedzi i 12 tlenu na 100.

Bardzo piękny minerał, mniej używany jako ruda do wytapiania miedzi, lecz poszukiwany na rozmaite wyroby, stanowi **malachit** (*Tab. XVIII, fig. 12*). Jest to węglan miedzi, t. j. połączenie jej z kwasem węglowym. Robią z niego przedmioty drobne, jak: spinki, broszki i t. d.; oraz większe: przyciski, niekiedy całe stoły i kolumny.

Na *fig. 15* tej samej tablicy widzimy t. zw. **kwiat kobaltowy**, który jest połączeniem metalu kobaltu z kwasem fosfornym.

Ruda cynowa utleniona czyli **kamień cynowy** spotyka się w brunatno-czarnych słupach kwadratowych. Składa się z 79 części cyny i 21 części tlenu. Jest to prawie jedyna ruda, z której otrzymuje się cyna.

366. Rudy, zawierające siarkę, mniej są przydatne dla otrzymania metali, gdyż siarkę trudno oddzielić zupełnie, a domieszka tego pierwiastku niekorzystnie oddziałuje na własności metalu. Dlatego też do wytapiania metali używa się tylko siarków tych metali, których rudy utlenione są rzadkie.

Błyszcz ołowiany czyli **siarek ołowiu** jest główną rudą, z której otrzymuje się ołów; ma on również postać krystaliczną sześcianów i biały srebrzysty kolor. Zawiera zwykle trochę srebra, które się z niego otrzymuje, jeśli zawartość jest dosyć znaczna. Główna produkcja ołowiu znajduje się w Anglii, także w Hiszpanji i Ameryce.

Siarek cynku używa się w nowszych czasach do otrzymania cynku. Główną zaś rudą, z której cynk się otrzymuje, jest **galman** czyli **szpat cynkowy**.

Piryt czyli **siarek żelaza** spotyka się w sześcianach o blasku metalowym, złocistego koloru, używa się do fabrykacji kwasu siarczanego.

Główną rudą, z której dobywa się miedź, jest **siarek miedzi**, krystaliczny, jasno-żółtawej barwy. Zawiera 34 części miedzi na 36 siarki i 30 żelaza.

Realgar (*Tab. XVIII, fig. 1*) jest siarkiem arsenu; drugi siarek arsenu, żółty, nazywa się **auripigment**.

Cynober—czerwony minerał, krystaliczny i ciężki, składa się z rtęci i siarki; jest główną rudą, z której otrzymują rtęć.

Wspomnieć jeszcze wypada o szarym krystalicznym **błyszczu antymonowym** czyli **siarku antymonu**, który używa się w aptekach.

367. Raz utworzone minerały lub skały nie zostają wiecznie niezmiennymi. W skorupie ziemi odbywają się nieustannie przemiany.

Wilgoć łącznie z kwasem węglowym powietrza oddziałuje na niektóre skały, powodując ich powolny rozkład czyli *wietrzenie*, wskutek którego rozsypują się one, tworząc glinę i piasek. Woda deszczowa wypłukuje z nich części rozpuszczalne i unosi je z sobą, sącząc się w głąb ziemi do źródeł, stamtąd do rzek, te zaś niosą je do morza. Odbywające się powoli w skorupie ziemskiej przemiany chemiczne powodują przeobrażenia jednych minerałów na drugie. Tak np. ruda żelazna w sąsiedztwie z gipsem i substancjami organicznymi, przekształca się na błyszczący żółty **piryt** i t. d.

Woda źródłana, zawierająca rozpuszczalne *sole wapienne*, utrzymuje je w roztworze, dopóki, idąc w głębokich warstwach ziemi, zawiera dosyć kwasu węglowego; skoro zaś wydostając się na powierzchnię, traci ten gaz, wapno osadza się bądź w formie kryształów—jeśli osadzanie odbywało się bardzo powolnie, tworząc **szpat wapienny** lub **aragonit**, bądź w postaci warstw bezpostaciowych, jakie widzimy na okrytych wapnem owocach i innych przedmiotach, przywożonych z Karlsbadu. W podobnyż sposób z *roztworów krzemionki* powstały: **kwarce**, **kryształ górny**, **krzemień**, **chalcedon**, **opal**, **ametysty** (jeśli krzemionka była zabarwiona domieszką manganu) i cały szereg innych minerałów.

Wylewająca się ze szczelin wulkanów lawa, zastygając, tworzy rozmaite skały i minerały (**tufy**, **bazalty** i t. p.), a znajdujące się w sąsiedztwie skały i minerały ulegają pod wpływem żaru rozmaitym przeobrażeniom. W ten sposób z pokładów wapnia powstały **marmury**.

Mało tego: istoty żywe—zwierzęta i rośliny przyczyniają się także do utworzenia skał i minerałów; olbrzymie pokłady kredy powstały z drobnych, mikroskopowych muszelek organizmów niższych, które poznaliśmy jako **otwornice**; są skały wapienne złożone z samych muszel mięczaków, spójnych rozpuszczonem wapnem jakby cementem; **korale** budują w oczach naszych całe wyspy. Rośliny, całe lasy zasypane piaskiem, przywalone ciężarem leżących na nich warstw ziemi, ulegają powolnemu przeobrażeniu na węgiel kamienny, wśród którego pokładów znajdujemy szczątki ich liści, odciski kory i t. d. Całe ich pnienie ulegają także stopniowemu przeobrażeniu; roztwór krzemionki wsiąkając w nie, zastępuje, cząsteczka za cząsteczką, masę drzewną osadzoną krzemionką, a w ten sposób powtarza drzewo skamieniałe bardzo dokładnie nie tylko kształt zewnętrzny ale i budowę drobnowidzową pierwotnej rośliny. Nie tylko te drobne, niedostrzegalne dla oka powolne przemiany odbywają się w skorupie ziemskiej; niekiedy całe warstwy skał zostają podniesione w górę, połamane lub wygięte przez siły wybuchów podziemnych; całe stożki są usypane z wyrzuconych przez wulkany kamieni i popiołu.

To znowuż rozmaite wody rzeki i źródła, lub też uderzające o brzeg morski fale podmywają powoli skały, które utraciwszy należyłą podporę, spadają i zasypują doliny okruciami; lodowce (fig. 619) w górach rozsadzają skały, odłamując z nich olbrzymie głazy, które następnie przesuwają się

razem ze spęczającą powoli masą lodu. Dalej u ujścia rzeki, gdzie w rozszerzonym jej korycie prąd jest osłabiony, osadza się żwir, piasek i muł, które unosił bystry bieg wody, tworzą się warstwy piasku i żwiru, które z biegiem czasu, spojone lepiszczem odpowiednim, pod wpływem ciśnienia warstw na nich leżących, zmieniają się na twarde skały. Tak powstają **piaskowce, konglomeraty i łupki** rozmaite. Słowem, i w królestwie mineralnem odbywa się wciąż szereg przemian; niema tu martwoty i rzecz można, że skorupa ziemska żyje swoim odrębnym życiem, ma swoje dzieje. A dzieje te odczytuje z jej kamiennych kart badawczy wzrok geologa, do którego zwrócone są następujące słowa poety:

Od Humboldta weź klucze na te alfabety
I stań się biografem naszego planety;
Niech cię nie trwoży zrudne latopistwo świata;
Z warstw ziemi, jak ze zmarszczków policzysz jej lata;
A gdy w czasach i czynach zdarzy się zagadka,
Poradzisz się mamuta, naocznego świadka;
Zbudzisz na skamieniałym uśpionego cedrze,
W imię Bojana wstanie i paszczę rozedrze,
Ze snów czterdziesto-wiecznych ten przeszłości goniec
Przetrze oczy; obwieści swój żywot i koniec.
Wieść nowa, jako cudo, a jako świat stara,
Prawdziwa jak rachunek i dziwna jak mara!...

O zbieraniu minerałów.

368. Do zbierania minerałów potrzebny jest dobry stalowy młotek i dłuto, któremi posługujemy się, aby odłamywać kawałki minerałów lub skał i wydobywać skamieniałości. Znalezione okazy składamy do torby podróżnej lub do prostego worka. Najwłaściwszem miejscem do zbierania minerałów są okolice górskie; niemniej można coś znaleźć i w łomach kamieni na brzegach rzek, w przecięciach zrobionych dla kolei i t. p.—Ale tylko wtedy możemy spodziewać się dobrych wyników wycieczki, jeśli przystępujemy do niej, obeznani poprzednio z głównymi częściami mineralogji.

Nie powinniśmy też uganiać się za samemi tylko rzadkościami, lecz zbierać wszystko, co znajdujemy w okolicy i co należy do naszego przedmiotu. Większe kawałki minerałów zawijamy w papier, drobne i rzadsze, a zwłaszcza łamliwe kryształy obwijamy w watę i składamy do osobnego pudełeczka. Przyniósłszy je do domu oczyszczamy suchą szczotką, a gdzie można—wodą; wybieramy lepsze okazy, starając się o to, aby zachować o ile możności jednostajną ich wielkość. Skamieniałości oddzielamy ostrożnie dłutem od otaczającej je masy skały. Każdy minerał wkłada się do osobnego pudełeczka z tektury, do którego wkładamy również kartkę z nazwą minerału i z napisem, gdzie został znaleziony.

Co do określania minerałów, to zaczynający najlepiej uczyni, jeśli poprosi o to doświadczonego mineraloga, albowiem rozróżnienie ich wymaga znajomości chemji.

SKOROWIDZ.

SPIS NAZW POLSKICH.

KRÓLESTWO ZWIERZĄT.

	str.		str.		str.
Admirał	194	Bezlutki	133	Chrościki	208
Aksolotl	159	Bezzębne	57	Chrząszcze	179
Akwarjum	172	Białawiec	193	Ciele morskie	80
Albatros	136	Białorzytka	101	Ciernik pospolity	162
Albinos	57	Białozor	93	Cierniopłetwe	161
Alka północna	134	Biedronka dwukrop-		Cietrzew	120
Alki	134	kowa	184	Cyrulik	162
Alpaka	74	„ siedmiokrop-		Cytrynek	193
Ameba	236	kowa	184	Czajka	128
Amerykanie	13	Biegowiec łucznik	183	Czapla jedwabista	131
Anakonda	150	Bielak	57	„ siwa	130
Antropologja	15	Biernatek pustelnik	221	Czerwce	207
Antylopa Gnu	70	Bizon amerykański	66	Czerwiec koszenila	207
Apollo	193	Błonkoskrzydłe	185	Czerwonak	132
Ara	97	Błotniak stawowy	226	Człowiek	7
Arabowie	14	Bobak	51	Czwororękie	15
Atol	233	Bocian biały	131	„	205
		„ czarny	131	Czyżyk	107
Babirusa	79	Bogatek olbrzym	180	Ćma rolnicza	199
Bankiwy	123	Bolimuszka	204		
Baran	67	Borowiec zawisak	196	Daniel	71
Barczatka	198	Borsuk	44	Delfin	84
Bawoły	65	Boża krówka	184	„ szablgrzbiet	84
Bawół pizmowy	65	Bóbr	52	Dingo	38
„ pospolity	65	Brodzące	127	Diugoń	86
Bażant srebrny	122	Brytany	37	Długogłowe	15
„ złocisty	122	Brzegówka	117	Długoskrzydłe	136
„ Argus	122	Brzuchopęzły	226	Dorsz	166
Bąk	131	Buansu	38	Drapieżne	29
Bąk zwyczajny	204			Drewniak	214
Bekas dubelt	128	Charty	37	Drętwa	171
Berkut	92	Chomik	55	Dromader	73
Bezlotek olbrzymi	133	Chrabąszcze	179	Drop	129

	str.		str.		str.
Drozd śpiewak	104	Gołąb skalny	118	Jelonek	179
Drozd	104	„ wędrowny	119	Jemiołuska	109
Drwal	182	Gołębie	118	Jerzyk	117
Dryle	23	Gołębi-ogon	196	Jesiotr wschodni	170
Dudek	114	Goryl	16	„ zachodni	170
Dukatnik	193	Grabarz niemiecki	178	Jeż	28
Dwukopytowe	62	„ pospolity	178	Jeż morski	230
Dwurękie	7	Gregaryny	236	Jeżowiec pospolity	230
Dwuskrzydłe	202	Gronostaj	43	Jeżozwierze	56
Dydelfy	49	Gryzonie	50	Jętki	209
Dzierlatka śmieciucha	104	Gryzuń topolowy	195		
Dzierzba właściwa	100	Grzbietoród	157	Kaberu	38
Dzięciół pstry	98	Grzebiące	120	Kaczenica	221
„ średni	98	Grzebień wielki	229	Kaczka domowa	141
„ zielony	98	Grzechotnik Durissu	152	„ dzika	141
Dzięciółek	98	Gwiazda morska	231	„ edredonowa	142
Dzik	78			Kaczkonos	59
Dzwoniec	107	Hamici	14	Kafrowie	10
Dżdżownica zwyczaj.	222	Hijena centkowana	34	Kajman	145
		„ przegowana	34	Kakadu	96
Emu	126	Hipopotam	77	„ o żółtym dziobie	96
Eskimos	11	Homar	219	„ różowe	97
		Hotentoci	10	Kałużnik czarny	177
Filoksera	207			Kameleon	147
Flondra	169	Ibis brunatny	132	Kanarek	108
Foki	80	„ czczony	132	Kangur	48
Foki uszate	81	Ichneumon	153	Kania właściwa	92
Fregata	139	Iglica	169	Kantaryda lekarska	181
		Indo-europejskie ludy	13	Karaluch	213
Gałasówka dębowa	191	Indusi	13	Karaluch olbrzymi	213
Gawjal	145	Indyk	124	Karaś	164
Gawron	111			Karp	164
Gazella	70	Jaguar	32	Kaszalot	84
Gąbki	232 i 235	Jak	64	Kawka	112
Gąsieniczniki	191	Jako	97	Kazuar helmiasty	127
Gąsiorek	100	Jamochłonne	232	Kasawiec cesarski	178
Gekko fatdzisty	142	Jantyna krucha	227	„ kosmaty	178
Gęś dzika	141	Jarząbek	120	Ki	97
„ swojska	141	Jaskółka brzegówka	117	Kieszeniec	220
„ zimowa	141	„ dymówka	116	Kilki	165
Gibbony	21	„ morska	136	Kiwi	127
Gież bydlęcy	204	„ oknówka	117	Kleszcz	218
„ koński	204	Jastrząb	91	Kleszczotek papie-	
„ owczy	204	Jaszczurka murowa	146	rowy	217
Gil	108	„ zielona	146	Kobuz	93
Glista ludzka	223	„ zwyczajna	146	Koczkodany	22
„ ziemna	222	„ żyworodna	146	Kukoszka wodna	130
Głownogie	225	Jaszczurki	146	Kolibry	114
Głuptaki	140	Jednokopytowe	69	Kołatek	183
Głuszc	120	Jedwabnik	197	Komar pospolity	203
Gołąb grzywacz	118	Jeleń	71	Kondor	90
„ siniak	118			Koń	60

	str.		str.		str.
Koń arabski	61	Kury kochinchińskie	123	Madryl	23
„ rzeźny	77	Kwagga	62	Maorysi	12
Kopciuszka	103	Kwiatowiec	233	Marabut	132
Koral biały	233	Kwiczol	104	Mątwą	225
Korale	232	Kwieciak jabłkowiec	182	Meduzy	232
Koralowiec czerwony	233			Menura pyszna	115
Koralowina	233	Lama	73	Merynos	68
Kormoran	138	Lampart	33	Mewa morska	138
Kornik drukarz	182	Latarnik europejski	207	„ olbrzymia	137
Korzenionózki	237	„ surynamski	206	„ srebrzysta	138
Kosarz	217	Legwan	148	„ śmieszka	138
Kot domowy	33	Lelek	116	Mewy	137
„ dziki	33	Leming	54	Miecznik	164
Kostera	169	Lemur	25	Miedzianka	149
Kotowce	21	Leniowiec	58	Miernik pstrokaty	199
Koty	30	Leszcz	164	Mięczaki	225
Kowalik	109	Lew	30	Miękkopłetwe	164
Koza angorska	69	„ morski	81	Minog morski	172
„ domowa	68	Likaon	38	„ rzeźny	172
Kozica	69	Lilja morska	231	Mitra biskupia	227
Kozieł	68	Liljowce	231	Młot	171
Kozieł skalny	68	Lin	164	Modliszka kosmata	213
Kozioróg rycerz	183	Lis	39	Modraczek niebieski	194
Kozy angorskie	68	Lori	25	Moliki	218
„ kaszmirskie	68			Mongołowie	11
Krab wielobarwny	220	Łabędź biały	141	Mora czerwona	199
Kraska	114	„ czarny	141	„ niebieska	199
Kretomysz	29	„ krzykliwy	141	Mors	80
„ zębiatek	29	Łania	71	Moskity	203
Krety	27	Łaska	43	Motyle	192
Krewetka	219	Łasze	42	„ drobne	200
Krocionogi	214	Łomignatek ławulec	196	„ienne	193
Krocionóg pospolity	214	Łątka wielka	210	„ nocne	197
Krogulec	91	Łosoś	167	„ wieczorne	195
Krokodyl	145	Łoś	71	Mól jabłoniak	200
Krokodyl nilowy	145	Łuskowiec	59	„ kożusznik	200
Krowa morska	86	Łuszczaki	106	„ sukiennik	200
Królik	57	Lyska	130	„ ziarnik	200
„ angorski	57			Mrówki	188
Krótkogłowe	15	Madrepóra	233	„ czarne	191
Krówka	179	Magot	21	„ czerwone	191
Kruk	110	Maik pospolity	181	„ drobne	191
Krzyżak	215	Makako	25	„ leśne	191
Krzyżodzioby	108	Maki latające	25	Mrówkojad	58
Kuguar	31	Makolągwa	108	Mrówkolew	208
Kukułka	98	Makrela właściwa	163	Mszyce	207
Kulik morski	128	Malajczyce	12	Mucha domowa	203
Kumka	157	Małpozwierze	24	„ hiszpańska	181
Kuny	42	Małpy	15	„ plująca	204
Kura domowa	123	Małże	228	„ tse-tse	204
Kuropatwa	121	Mamut	76	„ złocista	204
Kury brahmaputra	123	Manat	86	Mucholówka szara	109

	str.		str.		str.
Muł	61	Ośmionogi	226	Piórolotek	200
Mustang	60	Ośmiornica	226	Piórówka czerwona	233
Mysi królik	103	Otrupek	178	Piskorz	154
Mysz domowa	54	Otwornice	237	Piton	150
„ drobna	54	Owadożerne	27	Piżmowiec	72
„ polna	54	Owady	175	Pleszka	103
Myszołów	92	„ dwuskrzydłe	202	Pliszka siwa	100
Myszy	54	„ półpokrywe	205	„ żółta	100
		„ prostoskrzydłe	211	Pluskolec	206
		„ tęgopokrywe	176	Pluskwa roślinna	205
Nartnik błotny	206	„ żyłkoskrzydłe	208	„ zwyczajna	205
„ stawowy	206	Owca	67	Pluszcz	102
Narwał	83			Plaszczki	170
Negritosi	11	Padalec	148	Plawikonik	169
Negrowie	9	Pagur szeroki	220	Plazy	143
Niedźwiadek europ.	217	Pająk domowy	216	Pietwonogie	80
Niedźwiadki	217	Pająki	215	Płoszycza pospolita	206
Niedźwiedzie	45	„ właściwe	215	Pływak obrzeżony	177
Niedźwiedziówka	196	Pancernik	58	„ wielki	177
Niedźwiedź biały	46	Pantera	33	Pochworogie	63
„ brunatny	46	Papuasi	10	Podróżec	228
„ czarny	47	Papuga	97	Pokrzewka czarno-	
„ morski	81	Papugoryb	162	łbięta	102
„ szary	47	Papużki	97	Polatucha	51
Nietoperze	26	Parskacz	162	Polinezyjczycy	12
Nitkowiec podskórny	224	Pasikonik zielony	212	Polipy	232
Nocnica	199	Paw	124	Popielice	50
Nornice	54	Pawik dzienny	194	Posiewnica	141
Nosorożec afrykański	76	„ nocny	195	Pójdźka	95
„ indyjski	76	Pawjany	22	Półksiężyc	162
„ jawański	76	Paź królowej	193	Prażma zębacz	162
Nubijczycy	14	Pchły	204	Proteusz	159
Nury	133	Pekari	79	Prusak	213
Nużeniec	218	Pelikan	140	Prządka pierścienio-	
		Perkoz czubaty	135	wata	197
Odgietek	229	Perlica	123	„ sosnowka	198
Ogołatniak	199	Perłopławka	229	„ wędrowna	198
Ogoniaste	158	Perłowiec cesarek	195	Przepiórka	121
Okularnik	152	Petrel lodowy	136	Przeziernik	196
Okuń	161	Piaskowiec leśny	177	Pstrąg	167
Omarlice	178	„ mieszaniec	176	Psy	34
Omulek jadalny	228	„ polny	177	„ z góry Ś. Bernarda	36
„ rzeczny	228	Pierwotniaki	236	Pszczola	186
Opossum	49	Pies domowy	34	Pszczółowiec	181
Orangutan	19	Piesiec	41	Ptaki	87
Orłosęp	91	Piewik mannowy	206	„ biegające	124
Orzechowce	182	Pijawka końska	223	„ blaszkodziobe	140
Orzeł białogłowy	92	„ lekarska	222	„ brodzące	127
„ przedni	93	Pilchard	165	„ brodzące wła-	
„ rybotów	92	Piła	171	ściwe	130
Osa pospolita	188	Pingwin	133	„ długoskrzydłe	136
Osieł	61			„ drapieżne	89
Ostryga jadalna	229				

	str.		str.		str.
Ptaki łączące	96	Salangana	117	Srokosz	99
„ pływające	133	Sandacz	162	Ssące	7
„ podkasałe	127	Sarna	71	Sterle	170
„ rudłonogie	138	Schodówka cenna	227	Stonoga	221
„ szczudłowate	130	„ pospolita	227	Stożek marmurowy	227
„ śpiewające	99	Sekretarz	153	„ różowy	227
Ptasznik	216	„ węzojad	90	Strąkowce	181
Puhacz	94	Semici	13	Strętwa	167
Pustułka	93	Sępy	89	Struś afrykański	124
Puszczyk	94	Siewka	128	Strzykwy	231
Pyszałek	199	Sikora bogata	105	Stułbia zielona	235
Pyton	150	„ czubata	106	Sum rzeczny	166
		„ lazuruwa	106	Surukuku	152
		„ modra	106	Suseł	52
Radiolaria	237	„ ogonatka	106	Synogarlica	118
Rajskie ptaki	109	„ sosnówka	106	Szachownica	195
Rak rzeczny	219	„ uboga	106	Szakał	39
Rasa kaukaska	12	Skalnik	195	Szarańcza wędrowną	211
„ mongolska	11	Skałotocz palczak	229	Szczupak	165
„ murzyńska	9	Skarp	169	Szczur domowy	55
Rea	126	Skolopendra	214	„ wędrowný	55
Rekin	170	Skorek	213	Szczury	55
Renifer	72	Skorupiaki	219	Szczeżuja	229
Robaki	222	Skowronek polny	104	Szczygieł	107
Rohatyniec garbarz	180	Skójka malarska	228	Szczypawka fioletow.	177
Ropucha szara	157	„ perłorodna	228	„ skórna	177
„ zielona	157	Skórnik słoniniec	179	„ złotniczek	177
Rosomak	45	Skrzeki ogoniaste	151	Szerszeń	188
Rozgwiazda czerw.	231	Skrzydłak	227	Szkarłupnie	230
Rozgwiazdy	231	Słonecznica	237	Szop	45
Rozkolec drobny	227	Słoniki	181	Szpak	101
Roztocze	217	Słonka	129	Szprot	165
Rozwielitki	221	„ topolowiec	183	Szympanś	19
Rudzik	103	Słoń	74	Ścierwojad	90
Rurkowiec	223	„ afrykański	74	Śledzie	164
Rusałka mała	194	„ indyjski	74	Ślimak maskowiec	226
„ osetek	194	„ morski	82	„ ogrodowy	226
„ większa	194	Słowik	102	Ślinik	228
Rybojeż	169	Sluchotka brodaw-	227	Śliz	164
Rybołówka zwycz.	138	kowata	227	Śmierdziel	44
Ryby	160	Smok latający	147	Śniednik	229
„ chrząstkowate	170	Soból	43	Świdrak okrętowy	229
„ cierniopłetwe	161	Sokoł łowczy	93	Świeciel	184
„ kostne	161	„ rarog	93	Świerszcz domowy	212
„ kostofuskie	170	„ wędrowný	93	„ polny	212
„ kręgoustę	172	Sowa rdzawa	94	Świerzbowiec	218
„ latające	165	„ uszata leśna	95	Świetlik	180
„ miękkopłetwe	164	Sójka	110	Świnia angielska	78
„ poprzecznowste	170	Sówka	95	„ domowa	78
Ryjówka domowa	29	Sprężyk zbożowy	184	„ piżmowa	79
		Sprężyki	184	Świnka morska	56
Salamandra olbrzym.	158	Sroka	113		
„ plamista	158				

	str.		str.		str.
Tapir amerykański	77	Węgorz	167	Zacios	180
Tarantula	216	„ morski	167	Zając	56
Tarpany	60	Węże	149	Zajączek morski	227
Tasiemiec	224	Wężojad	92	Zakonniczka wielko-	
Tasmańczycy	9	Wężowce	231	głowa	132
Tchórz	43	Wężowidła	231	Zebu	64
Terarjum	153	Wielbłąd dwugarbny	73	Zebra	61
Termity	210	„ jednogarbny	73	Ziemnowodne	155
Tęczyk zdradliwy	177	Wielokopytowe	74	Zięba	107
Topik	216	Wieloryb grenlandzki	84	„ alpejska	107
Troć	167	„ północny	85	Zimorodek	113
Trupia główka	195	Wieloryby	83	Złota rybka	164
Truteń	186	„ roślinożerne	86	Złotka kolorado	183
Trychina	223	Wiewiórka	50	Złotki	183
Tryton mniejszy	158	Wikłacz	106	Zmierzchnice ostro-	
„ większy	158	Wilga	101	mleczone	195
Trzmiel ogrodowy	188	Wilk	38	Zwijacze	181
„ ziemny	188	„ torbacz	49	Żaba lądowa	156
Trznadel	105	Wirczyki	237	„ wodna	156
Trzpiennik	192	Wiwera zybeta	42	Żabka drzewna	156
Tukan	97	Wodolazy	37	Żaby	155
Tumak	42	Wodopójka czerwo-		Żalobnik	194
Tuńczyk	163	na	218	Żarłacz	170
Tur	64	Wolek palmowy	182	Żeglarek	193
Turkawka	118	„ zbożowy	182	Żeglarek	225
Turkuć	212	Wombat	49	Żmija	151
Tygrys	31	Wonnica piżmowa	183	„ piaskowa	152
		Workowate	48	Żołna	98
Ukwiasty	233	Wół	63	Żółw błotny	144
		Wrona	111	„ jadalny	144
		Wroniec	111	„ słoniowy	143
Wałkarz lipczyk	180	Wróbel domowy	106	„ szyldekretowy	144
Wampir	26	„ towarzyski	107	Żoraw	129
Ważka spłaszczona	209	Wszy	208	„ afrykański	130
Ważki	209	Wydra	43	Żubr europejski	65
Wąż dusiciel	150	Wyjce	24	Żuk	179
„ Eskulapa	150	Wymoczki	236	Żyrafa	72
„ koralowy	149	Wyz	170	Żywłogi	232
„ wodny	149	Wyżły	37	Żyworodka pospolita	227

KRÓLESTWO ROŚLINNE.

	str.		str.		str.
Agrest	268	Babka	300	Baobab	264
Akacja	324	Baldaszkowate	323	Barszcz pospolity	300
Anyż	282	Bambusy	309	Bawełniany krzew	289
Arbuzy	286	Banan	276 i 322	Berberys	270
		Bananowate	322	Bez czarny	269

	str.		str.		str.
Bez perski	270	Czosnek	285 i 322	Gruszki ulęgałki	245
Bezkwiatowe	238 i 309	Czułek	317 i 324	Gryka	294
Biedzeniec	282			Grzyb prawdziwy	312
Bieluń	325	Dąb	248	Grzybień biały	304
Bieluńdziedzierzawa	296	„ korkowy	250 i 293	Grzybnia	313
Blekot	324	„ szypułkowy	249	Grzyby	239 i 311
„ ogrodowy	295	„ zwyczajny	249		
Bławatek	303	Dereń świda	270	Herbacyany krzew	271
Borowik	312	„ właściwy	270	Hijacynt	286 i 322
Borówka czerwona	269	Dmuchawiec	300		
Bób	285 i 324	Dracena	263	Jabłczaki	244
Bratki	304	Drjakiew	299	Jabłoń	245 i 322
Brukiew	323	Drożdże	313	Jalowiec	258
Brzanka Tymotka	308	Drżączka średnia	308	Jarzębina	323
Brodawnik mleczny	300	Dwuliścieniowe	243 i 323	Jaskier	323
Brukiew	283	Dwusilne	324	Jaskier ostry	294
Brzoskwinia	247	Dynia	287	Jaskótcze ziele	303 i 323
Brzost	252	Dyniowate	287	Jaskrowate	323
Brzoza	251	Dziewanna pospolita	302	Jaskry	300
„ płacząca	251	Dzwonki	299	Jasnota	325
Buk	250			Jasnota biała	301
Burak cukrowy	284 i 289	Esparseta	243 i 324	Jawor	256
Bursztówki	245			Jednoliścieniowe	243,
		Fasola	285 i 324		285 i 322
Cebula	285 i 322	Figowe drzewo	263	Jesion	252
Cedr libański	259	Figowiec	276	Jeżyna	268 i 323
Cedry	263	„ elastyczny	277	Jęczmień	307
Chaber modry	303 i 325	Figus	277	Jodła	256
Chlebowe drzewo	276	Fijolek wonny	299		
Chmiel	291	Fikus	277	Kaczeniec	323
Chrobotekrenożywny	310			„ błotny	300
Chryzantyna	300 i 325	Glistownik	303 i 323	Kakaowiec	279
Chrzan	283	Głownia	313	Kaktusy	316
Ciemiernik	323	Głóg	269 i 323	Kalafjor	283
„ czarny	295	Gorczyca	283 i 323	Kalarepa	283 i 323
„ czerwony	295	Goryczka	299	Kalina	271
„ zielony	295	Goździkowiec korzen.	277	Kalwile	245
Ciemierzycy	322	Grab	250	Kapusta	282 i 323
„ biała	297	Granaty	245	„ brukselska	283
„ czarna	297	Grażel żółty	304	„ głowiasta	283
Cis	259	Groch	285 i 324	„ kolorowa	283
Cyborowate	322	Groszek	324	Kartofle	280
Cykorja	292 i 325	Grusza	245	Kasztan dziki	255
Cykuta	295	Gruszka	323	„ jadalny	256
Cynamonowiec cej-		Gruszk bergamoty	245	Kawony	287
loński	279	„ bery	245	Kawowe drzewo	278
Cyprys	259	„ bonkrety	245	Kąkol	304
Cytryny	245	„ duanny	245	Klon	252
Czarna jagoda	269	„ duszessy	245	„ cukrowy	290
Czeremcha	247	„ kalebasy	245	Kmin	300 i 324
Czereśnia	246	„ panny	245	Kminek	282
Czerwieniec centurja	298	„ sapieżanki	245	Kokosznic	294

	str.		str.		str.
Kolendra	324	Meszek	310	Paproć słodyszka	309
Komonica różkowata	294	Męczenica	315	Pastewne	293
Koniczyna 300 i	324	Mięta	325	Pestkowce	244
„ biała	293	Migdał	323	Pieczarka	311
„ cielista	293	Miodunka lekarska	298	Pieprz czarny	277
„ czerwona	293	Mleczodrzew gujańs.	276	Pieprznik	312
Konopie 289 i	291	Mniszek	325	Piętruszka 282 i	324
Konwalijska	298 i 322	„ lekarski	300	Pięciornik wzniesiony	298
Konwalia	298 i 322	Modrak	303	Pigwa 245 i	323
Koper 282 i	324	Modrzew	258	Plechowe	238
Korniszony	287	Morela 247 i	323	Pleśnie	312
Koroniarka	316	„ brzoskwinia	247	Plucnica islandzka	311
Korzonki owsiane	286	„ czerwona	247	Płonnik	310
Koziorożec siewny	293	„ wczesna	247	Podagrycznik posp.	300
Krokosz	325	„ zwyczajna	247	Podkolan	301
„ barwierski	293	Morszczyny	314	Podróżnik	292
Kruszyna	270	Motylikowate	324	Pokrzywa głucha	301
Krzyżowe	323	Muchołówka	319	„ parząca	303
Kukurydza	307	Muchomor	311	„ zwyczajna	303
Kwiatowe 282 i	338	Muchotrzew zwycz.	301	Pomarańcza	245
Lebiodka pospolita	301	Naczyniowe	238	Pomidor	281
Len 288 i	291	Nagonasienne	242	Porostnica 240 i	310
Leszczyna 248 i	291	Naparstnica	297	Porosty	240
Lilja	286	Narczyż	322	Porzecza czarna	267
„ wodna	304	Nerecznica samcza	310	„ czerwona	267
Liljowate	322	Niestrawa kupkowa	308	Poziomka 268 i	323
Lipa małolistna	252	Nieśmiertelnik 298 i	325	Prosianka cukrowa	291
„ wielkolistna	252	Niezapominajka	298	Proso zwyczajne	307
Lisica	312			Przęstka pospolita	304
Lisi ogon	308			Przylaszczka	323
Lucerna 293 i	324	Obrazki plamiste	299	„ gajowa	298
Lukrecja	292	Ogórki	287	Przytulja leśna	298
Lulek	325	Okrzemki	315	Psianka czarna	296
„ czarny	296	Okrzytonasienne	242	„ słodkogorz	296
Łopian mniejszy	302	Olcha	252	Psiankowate	325
„ większy	302	„ biała	253	Pszenica angielska	306
Macierzanka 301 i	325	Olejne	291	„ egipska	306
Mak	323	Oliwka	291	„ jara	306
„ ogrodowy	291	Oliwne drzewo	291	„ orkisz	306
„ polny	291	Orzech włoski	248	„ ozima	306
Makowate	323	Osina	253	„ polska	306
Malina 268 i	323	Ostróżka 303 i	323	„ sandomierka	306
Marchew 281 i	324	Owadożerne	318	„ zwyczajna	306
Marzanka wonna	298	Owies	307	Purchawka	311
Mchy liściaste 240 i	310	Palma cukrowa	290	Rajgras angielski	308
„ wątrobowce 240 i	310	„ daktylowa	275	„ francuski	308
„ właściwe	240	„ kokosowa	274	Rdze	239
Mech islandzki	311	Palmy 272 i	322	Rokiet	310
Melony	287	„ sagowe	275	Rolnica perz	308
		Paprocie	241	Rosiczka okragłolist.	318
				Różki	313

Róża	str. 323	Śliwka brunela	str. 247	Wiąz	str. 252
„ dzika	271	„ damascena	247	„ szypułkowy	252
Różowate	323	„ katarzynka	247	Wicina	255
Rumianek 303 i	325	„ lubaszka	247	Widlaki	241
Ruta murowa	309	„ mirabela	247	Wiechy	305
Rydz	311	„ morelowa	247	Wierzba biała	355
Ryż	307	„ renkloda	547	„ iwa	254
Rzepa 283 i	323	„ węgierka	247	„ płacząca	255
Rzepak 283 i	291	Śniec	313	Wiktorja	316
Rzeczucha	323	Świerk	257	Wilcza jagoda	325
„ łąkowa	301			„ „ właśc.	296
Rzęsa	305	Tarczownica	240	Wilczy pieprz czwo-	
Rzodkiew 284 i	341	Tarnina	269	rolistny	297
Rzodkiewka	284	Tasznik 202 i	323	Wilżyna	324
		Tojad	323	„ ciernista	303
Salsefja	286	„ mordownik	296	„ polna	302
Salata	286	„ wilczybój	296	Winorośl	266
Seler	282	Tonka wonna	308	Wiśnia 246 i	323
Skrzyp polny	309	Topola biała	254	„ pachnąca	247
Skrzypy	241	„ czarna	254	Wiśnie brunele	246
Słocza cukrowa	275	„ piramidalna	254	„ montmorency	246
Słonecznik	325	Torf	310	„ papieskie	246
Smardz jadalny	311	Torfowiec	310	„ paryskie	246
Smocze drzewo	263	Torfowiska	310	„ świętojanki	246
Soczewica	285	Trawa 305 i	322	Wodorosty 239 i	314
Soczewka	324	Trawy pastewne	308	Wrotycz	325
Sorgo	290	Truskawka	269	„ pospolita	302
Sosna	257	Trybula	324	Wrzos	299
„ amerykańska	259	„ leśna	300	Wyczyniec łąkowy	308
Sosnogron olbrzymi	263	Trzcina bambusowa	309	Wyka	324
Sporysz	313	„ cukrowa	290	„ siewna	294
Sromotnik smrodlivy	311	„ laskowa	309		
Stokrotka 300 i	325	„ zwyczajna	308	Zawilec	323
Storczyk	301	Trzmielina zwyczajn.	270	„ gajowy	299
„ plamisty	301	Tuja	259	Zbożowe	305
„ samczy	301	Tulipan 286 i	322	Zgasiewka zwyczajna	310
Storczykowate 315 i	331	Turzyca 304 i	322	Ziarnczak	305
Strąkowe 285 i	324	Tykwa	287	Ziemniak	280
Szafran 293 i	322	Tysiącznik	280	Zimowit	322
„ krokus	293	Tytuń 292 i	325	„ jesienny	297
Szalej 295 i	324			Złożone	325
Szałwja 300 i	325	Wahadlik	317	Zrosłopłatkowe	325
Szczawik	299	Wanilja	279		
Szczaw zwyczajny	301	Wargowe	324	Żmijowiec pospolity	302
Szczwół	324	Wawrzynek wilcze-		Zórawina	269
„ plamisty	295	tyko	297	Życica	297
Szparagi	286	Wątrobowce	240	„ owsowata	308
		Welwiczja	316	„ trwała	308
Śláz pospolity	302	Wełnianka 304 i	322	Żyto	305
Śledzionka zanokcica	309	Wiatropylne	322	„ jare	306
Śliwa 247 i	323	Wargowe	324	„ ozimina	306

KRÓLESTWO MINERAŁÓW I GIEOLOGJA.

	str.		str.		str.
Aerolity	345	Formacja najnowsza	339	Leucyt	340
Agaty	339	„ plioceniczna	337	Lodowce	338
Akwamaryna	340	„ sylurska	335		
Aluminium	341	„ trjasowa	336	Lupki	333, 335 i 349
Alluvium	337	„ węglowa	335	„ krystaliczne	337
Ałun	344	Formacje	335		
Amalgamat	345	„ napływowe	339	Magn	339
Ametyst	339 i 348	„ potowe	339	Magnes naturalny	340
Amonity	336			Magnetyt	346
Antymon	344	Galman	347	Malaehit	346
Aragonit	348	Gips	342	Mamut	337
Arsen	344	Glin	341	Marmur drobno-kry-	
Asfalt	341	Gliny	341	„ staliczny	344
Azbest	340	Głazy	338	Marmury	332, 342 i 348
Azot	331	Gneis	335	Metale	344
Auripigment	347	Grafit	343	„ rodzime	344
		Granat	340	Metaloidy	344
Bazalty	332 i 348	Granit	334 i 335	Meteority	345
Belemnity	336	Granity	335	Miedź rodzima	345
Beryl	340	Ichthiozaurus	337	Mika	330
Błyszczce	344			Minerały	335
Błyszcz antymonowy	347	Jaspisy	339	„ wapienne	343
„ ołowiany	347			Modry kamień	342
Brunatna ruda żelaz.	346	Kalcyt	342	Muszlowiec	342
Bursztyn	341	Kamień cynowy	348		
Brylant	340	„ litograficzny	342	Nafta	341
		„ modry	344	Niedźwiedź jaski-	
Chalceden	348	„ mydlany	339	„ niowy	337
Chalcedony	339	Kaolin	341	Numulity	335
Chloryt	339	Konglomeraty	349		
Ciała proste	331	Korund	340	Obsydjan	341
„ złożone	331	Kreda	342	Okres czwartorzęd.	337
Cynober	347	Kryształ górny	339 i 348	„ drugorzędowy	336
		Kryształy	328	„ lodowaty	338
Diluvium	337	Krzem	338	„ pierwotny	335
Djament	340	Krzemiany	339	„ pierwszorzę-	
Drogie kamienie	340	Krzemień	339 i 348	„ dowy	335
Dwutlenek siarki	330	Krzemionka	338	„ trzeciorzędowy	337
		Kwarc	339 i 348	Okresy	335
Fluoryt	344	„ zadymiony	339	Olej skalny	341
Formacja dewońska	335	Kwas węglowy	331	Opal	339 i 348
„ eoceniczna	337	Kwiat kobaltowy	346	Ostrośłup	329
„ jurajska	336			Ośmiościan	329
„ kredowa	336	Labrador	339		
„ mioceniczna	337	Lawa	332	Piasek	340

	str.		str.		str.
Piasek złotodajny	345	Siarczyk żelaza	330	Szpat cynkowy	347
Piaskowce	349	Siarek	330	„ islandzki	342
Piaskowiec	333	„ antymonu	347	„ polny	339
Pierwiastki	331	„ arsenu	349	„ topliwy	342
„ chemiczne	344	„ cynku	347	„ wapienny 333 i	348
Piętra	335	„ miedzi	347		
Piryty	347	„ żelaza	347	Talk	330
Platyna	345	Siarka rodzima	344	Tężnie	343
Plezjozaurus	337	Sjenity	335	Tlen	330
Porfiry	337	Skały	333	Tlenek rtęci	331
Potas	339	„ tępkowo-kry-		„ siarki	330
Przemiany chemiczne	330	„ staliczne	335	„ żelaza czer-	
„ fizyczne	329	„ metamorficzne	334	„ wony	346
Pteodaktylus	337	„ najmłodsze	337	Topaz	340
Pumeks	341	„ ogniowe	334	Tufy	348
		„ organiczne	335		
Realgar	347	„ przeobrażone	334	Utlenianie	345
Rombościan	329	„ wodne	333		
Rtęć	331 i 345	„ ziarnkowato-		Wapień	339
Rubin	340	„ krystaliczne	335	„ dwójłomny	342
Ruda błotna	348	Skorupa zastygła	332	Węgiel	342
„ brunatna żelazna	346	Słup czworoboczny	329	„ kamienny	341
„ cynowa utlenio-		„ sześcioboczny	329	Węglan miedzi	348
„ na	340	Sole	342	„ wapnia	341
„ czerwona mie-		„ wapienne	348	Wietrzenie	347
„ dziana	346	Sól kamienna	342	Wnętrze ziemi	333
Rudy	344 i 346	„ kopalna	343	Woda królewska	345
„ błyszczące	346	„ morska	343	Wulkany	332
„ siarkowe	346	„ źródłana	343		
„ utlenione	346	Srebro rodzime	345	Zbieranie minerałów	349
		Stal	346	Złoto rodzime	344
Saletra	344	Stalagmity	342	„ rudne	345
„ chilijska	344	Stalaktyty	342	Związki chemiczne	331
„ zwyczajna	344	Szafir	340		
Samordki	345	Sześcian	329	Żelazo	345
Selenit	342	Szmaragd	340	Żywe srebro	331

SPIS NAZW ŁACIŃSKICH.

KRÓLESTWO ZWIERZĄT.

	str.		str.		str.
Abramis brama	164	Acipencer Gulden-		Agrotis pronuba	199
Abraxas grosulariata	199	städti	170	Alauda arvensis	104
Acanthia lectulavia	205	„ huso	170	„ v. Galerita	
Acanthopteri	161	„ ruthenus	170	„ cristata	104
Acanthurus chirurgus	160	„ sturio	170	Alca arctica	134
Accipiter nisus	91	Actynia	233	Alcedo hispida	113
Acipencer	170	Aeschna grandis	210	Alces palmatus	71

	str.		str.		str.
Alligator lucius	145	Bos bubalus	65	Chelmo rostratus	162
Amblystoma mexicanum	159	„ grunniensis	64	„ imbricata	144
Ameba	236	„ indicus	64	Chelone esculenta	144
Ampellis garrula	109	„ moschatus	65	Chrysomela populi	183
Anas boschas	141	„ primigenius	64	Chrysomelideae	183
Anguilla	167	„ taurus	63	Chrysomitrys cardeul.	107
Anguis fragilis	148	Bostrichus typographus	182	Cicada	206
Anodonta	225	Botaurus stellaris	131	Cicindela campestris	177
Anser cinereus	141	Bubo maximus	94	„ hybrida	176
„ sepetum	141	Bufo cinereus	157	„ sylvatica	177
Antilope dorcas	70	„ viridis	157	Ciconia alba	131
„ rupicarpa	69			„ nigra	131
Aphis	207	Calandria granaria	182	Cinclus aquaticus	102
Apis mellifera	186	„ palmarum	182	Circaëtes gallicus	92
Aplysia depitans	227	Caleoptera	176	Cistudo lutaria	144
Aptenodytes patagonica	133	Calosoma sycaphautal	177	Clupea harengus	164
Apteryx australis	127	Cameleopardalis giraffa	72	„ kilo	165
Aquila fulva	93	Camelus bactrianus	73	„ pilchardus	165
Arachnoidea	215	„ dromedarius	73	„ sprotus	165
Arctia caja	196	Cancer pagurus	220	Clytus arcuatus	183
Arctomys marmota	51	Canidae	30	Cnethocampa processionea	138
Ardea cinerea	130	Canis aureus	39	Coccinella bipunctata	184
„ nivea	131	„ familiaris	34	„ septempunctata	184
Argonauta argo	225	„ lagopus	41	Coccus	207
Argus giganteus	122	„ lupus	38	„ caeti	207
Argynnis Paphia	195	„ vulpes	39	„ polonicus	207
Argyroneta	216	Capra hircus	68	Coelenterata	232
Arion empiricorum	228	„ ibex	68	Colias rhamni	193
Aromia moschata	183	Caprimulgus europeus	116	Columba livia	118
Arvicola	54	Carabus auratus	177	„ oenas	118
Ascaris lumbricoides	223	„ coriaceus	177	„ palumbus	118
Asio otus	95	„ violaceus	177	„ turtur	118
Astacus fluviatilis	219	Carassius auratus	164	Conus marmoreus	227
Asterias	231	„ vulgaris	164	Coracias garrula	114
Astur palumbarius	91	Carcharias melanopterus	170	Corallium nobilis rubrum	233
Atagen aquila	139	Casarius galeatus	127	Corvus corax	110
Auchenia alpaco	74	Castor fiber	52	„ cornix	111
„ lama	73	Catocala fraxini	199	„ frugilegus	111
		„ nupta	199	„ monedula	112
Balaena mysticetus	84	Cavia cobaya	56	Corymbites aeneus	180
Balaenoptera borealis	85	Cephalopoda	225	Coturnix communis	121
Batrachia	155	Cerambyx heros	188	Cricetus frumentarius	55
Bimana	7	Cercopithecus	21	Crithagra canaria	108
Blatta orientalis	213	Cervus capreolus	71	Crocodylus niloticus	145
Boa constrictor	150	„ dama	71	Crocoideae	231
Bombinator igneus	157	„ elaphus	71	Crotalus durissus	152
Bombus	188	Chameleo vulgaris	147	Crustacea	219
Bombyx mori	197	Charadrius pluvialis	128	Cuculus canorus	98
Bonasia betulina	120	Chelifer caneroides	217	Culex pipiens	203
Bos americanus	65				

	str.		str.		str.
Curculionideae	181	Felis leopardus	33	Hibernia defoliaria	199
Cyclostomi	182	" lynx	33	Hippopotamus am-	
Cygnus musicus	141	" onca	32	phibius	77
" olor	141	" pardus	33	Hirudo medicinalis	222
Cynips quercus folii	191	" tigris	31	Hirundo rustica	116
Cynocephalus	22	Filaria medinensis	224	" urbica	117
Cyprinus carpio	164	Foramniifera	237	Hister cadaverinus	178
Cypselus	117	Forficula auricularia	213	Holioëtus albicilla	92
Cystophora probosc. 82		Fringilla canaria	108	Holoturiae	231
		" carduelli	107	Horpestes ichneumon	42
Daphnia	221	" chloris	107	Hyaena crocuta	34
Dasytus peba	58	" coelebs	107	" striata	34
Deilephila euphorbiae	195	" linota	108	Hyaenidae	80
Delphinus	84	" nivalis	107	Hydra viridis	235
Dermestes lardarius	179	" spinus	107	Hydrometra paludom	
Dicotyles labiatus	79	Fringillidae	106	et locustris	206
" torquatus	79	Fulgora europea	207	Hydrophilus piceus	177
Didelphis virginiana	49	" laternaria	206	Hyla arborea	156
Diomedea exulans	136	Fulica atra	130	Hylaster ater	182
Diurna	193	Gadus morrhua	166	Hymenoptera	185
Dityscus latissimus	177	Galerita cristata	104	Hystrix cristata	56
" marginalis	177	Gallinula chloropus	130		
Draco volans	147	Gallus domesticus	123	Ibis aethiopica	132
		" ferrugineus	123	" falcinellus	132
Echinodermata	230	Ganoidei	170	Ichneumon	42
Echinus esculentus	230	Garrulus glandarius	110	Ichneumonidae	191
Ectopistes migratorius	119	Gasteropoda	226	Iguana tuberculata	148
Elateridae	184	Gasterosteus aculeat.	162	Insecta	175
Elephas africanus	74	Gastropucha pini	198	Inaus ecaudatus	21
" indicus	74	" Bombyx		Ixodes	218
Emberiza citrinella	105	naustria	197		
Emys europea	144	Gastrophilus equi	204	Janthina fragilis	227
Epeira diademata	215	Geotrupes stercorar.	179	Jullus fallax	214
Ephemera	209	" typhocus	179		
Equus asinus	61	Gorilla Gina	16	Lacerta agilis	146
" caballus	60	Grapsus varius	220	" muralis	146
" quagga	62	Grillus campestris	212	" viridis	146
" zebra	61	" domesticus	212	" vivipara	146
Erinaceus europaeus	28	Grus cinerea	129	Lachesis muta	152
Erithacus rubecula	108	" virgo	130	Lamellibranchiata	228
Esox lucius	165	Gryllotalpa europea	212	Lamelliostres	140
Euchroma gigantea	180	Gulo bolcatis	45	Lampyrissplendidula	180
Euscorpius europeus	217	Gymnotus electricus	167	Lanideae	99
Exocoetus	165	Gypaëtus barbatus	91	Lanius collurio	100
				" excubitor	100
Falco gyrfalco	93	Haematopus ostrea-		" minor	100
Felidae	50	lepus	128	Laridae	137
Felis catus	33	Haliotis tuberculata	227	Larus ridibundus	138
" concolor	31	Helix pomatia	226	Lasiocampa quercifol.	134
" domestica	33	Hemiptera	205	Laxia	108
" jubata	34	Heterocentrotus ma-		Lepas analifera	221
" leo	30	millatus	230	Lepidoptera	192

	str.		str.		str.
Leptoptillus crumenifer	132	Musca domestica	203	Parus major	105
Lepus cuniculus	57	„ vomitiva	204	Passer socius	107
„ timidus	56	Muscicapa grisola	109	„ domesticus	106
„ variabilis	57	Mustella canadensis	42	Pavo cristatus	124
Lestris catarractes	137	„ erminea	43	Pecten maximus	229
Libellula	209	„ foina	43	Pediculus	208
Limnaea stagnalis	226	„ martes	42	Pelecanus onocratulus	140
Litta caesia v. europ.	109	„ Putorius	43	Pelias berus	151
Locusta viridissima	212	„ sybellina	43	Pentacrinus	231
Lucanus cernus	179	„ vulgaris	43	Perca fluviatilis	161
Lucioperca sundra	162	Mycetes	24	Perdix cinerea	121
Lumbricus terrestris	222	Mygale avicularia	216	Petromyzon fluviatil.	172
Luscinia philomela	102	Myodes lemmus	54	„ marinus	172
Lutra vulgaris	43	Myrmecophaga jubata	58	Pferomys volans	51
Lycaena Argus	194	Myrmeleon formicar.	208	Phalacrocorax carbo	138
Lycaon pictus	38	Mytilus edulis	228	Phalangium	217
Lycosa tarantula	216	Naja	152	Phascolomys fossor	49
Lytta vesicatoria	181	Necrophorus german.	178	Phasianus colchicus	122
		„ respillo	178	„ nycthemer.	122
Macroglossa bomby-		Neophron perenopter	90	„ pictus	122
lifformis	196	Nepa cinerea	226	Phoca vitulina	80
„ stella	196	Nestor notabilis	97	Phoenicopterus roseus	132
Macropus giganteus	48	Neuroptera	208	Pholas dactylus	229
Madraepore	233	Nocturna	197	Phylloshoma spectrum	28
Maja margaritifera	228	Notonecta glanca	206	Phryganea	208
Malacoptera	164	Numida meleagris	123	Phylloxera rostratrix	207
Manis	59			Physeter macrocephal.	84
Mantis religiosa	213	Ocneria dispar	197	Physophora hydrosta-	
Melanagria galathea	195	Octopus	226	tica	235
Meleagrina margari-		Oniscus murarius	221	Pica rustica	113
tifera	229	Ophiura	231	Picus major	98
Meleagris gallopavo	123	Oriolus galbula	101	„ martius	98
Meles taxus	44	Ornithorhynchus pa-		„ medius	98
Meloe proscarabeus	181	radoxus	59	„ minor	98
Melolontha vulgaris	179	Orthoptera	211	„ viridis	98
Menura superba	115	Oryctes nasicornis	180	Pieris brassicae	193
Mephis Chinga	44	Ostrea edulis	229	Pipa americana	157
Microlepidoptera	200	Otaria jubata	81	Pithecius satyrus	19
Milvus ictinus	92	„ ursina	81	Platax teira	162
Miriapoda	209	Otis tarda	129	Platydictylus guttat.	148
Mitra episcopalis	227	Ovis aries	67	Plissolophus galeritus	96
Mollusca	225			Podiceps cristatus	135
Moma Orion	199	Pachytis migratorius	211	Polymmatu virgaur.	193
Monodon monoceros	83	Pagurus Bernhardus	221	Polyphylla fullo	180
Moschus moschiferus	72	Paludina vivipara	227	Pomatula rubra	233
Motacilla alba	100	Pandion haliaëtos	92	Pristis antiquorum	171
Murex tenissima	227	Papilio Machaon	193	Procyon lotor	45
Mus agrarius	54	„ Podalirius	193	Proteus anguis	159
„ musculus	54	Paradisea opoda	109	Protozoa	236
„ rattus	55	Parnasius Apollo	193	Psittacus erithacus	97
Musca caesar	204	Parus caudatus	106	Pterophorus peuta-	
				dactylus	200

	str.		str.		str.
<i>Pulex</i>	204	<i>Silurus glanis</i>	166	<i>Tinca sarcitella</i>	200
<i>Pyloshoma spectrum</i>	26	<i>Simia nemeus</i>	22	<i>Toredo navalis</i>	229
<i>Pyrrhula coccinea</i>	108	<i>Sirenica</i>	86	<i>Torpedo narce</i>	171
<i>Python molorus</i>	150	<i>Sirex gigas</i>	192	<i>Trichechus rosmarus</i>	82
„ <i>reticulatus</i>	150	<i>Sitta caesia v. europ.</i>	109	<i>Trichina spiralis</i>	223
		<i>Sittace</i>	97	<i>Trichodes apiarus</i>	181
<i>Radiolaria</i>	237	<i>Smerinthus ocellata</i>	195	<i>Triodopsis personata</i>	226
<i>Raja batis</i>	171	„ <i>populi</i>	195	<i>Triton cristatus</i>	158
<i>Ramphastus magni-</i>		<i>Somateria mollissima</i>	142	„ <i>punctatus</i>	158
<i>rostris</i>	97	<i>Sorex araneus</i>	29	<i>Troglodytes niger</i>	19
<i>Rana esculenta</i>	156	„ <i>pigmaeus</i>	29	„ <i>parvulus</i>	103
„ <i>temporaria</i>	156	<i>Spermophilus citillus</i>	52	<i>Tropicoris rufipes</i>	205
<i>Rangifer tarandus</i>	72	<i>Sphinx Acherontia</i>		<i>Tropidonotus natrix</i>	149
<i>Regulus cristatus</i>	102	<i>Atropos</i>	195	<i>Turdus musicus</i>	104
<i>Rhea americana</i>	126	„ <i>pinastri</i>	196	„ <i>pilaris</i>	104
<i>Rhinoceros africanus</i>	76	<i>Sphyrna zygaena</i>	171		
„ <i>indicus</i>	76	<i>Staphylinus casaereus</i>	178	<i>Unio pictorum</i>	228
„ <i>javanus</i>	76	„ <i>hirtus</i>	178	„ <i>margaritifera</i>	228
<i>Rhizopoda</i>	237	<i>Steganopodes</i>	138	<i>Upupa epops</i>	114
<i>Rhombus aculeatus</i>	169	<i>Sterna hirundo</i>	138	<i>Urodela</i>	155
<i>Ruticilla phoenicurus</i>	103	<i>Strix flammea</i>	94	<i>Ursidae</i>	30
„ <i>thytis</i>	103	<i>Strombus</i>	227	<i>Ursus americanus</i>	47
		<i>Struthio camelus</i>	125	„ <i>arctos</i>	46
<i>Salamandra maculata</i>	158	<i>Sturnus vulgaris</i>	101	„ <i>ferox</i>	47
<i>Salmo ferio</i>	167	<i>Sus scrofa</i>	78	„ <i>maritimus</i>	46
„ <i>salar</i>	167	„ „ <i>domestica</i>	78		
„ <i>trutta</i>	167	<i>Sylvia atricapilla</i>	102	<i>Vanellus cristatus</i>	128
<i>Sarcoptes scabiei</i>	218	<i>Syrnium aluco</i>	94	<i>Vanessa Antiopa</i>	194
<i>Sarcorhamphus gry-</i>				„ <i>Atalanta</i>	194
<i>phus</i>	90	<i>Tabanus bavinus</i>	204	„ <i>cardui</i>	194
<i>Satyra hermione</i>	195	<i>Taenia selium</i>	224	„ <i>Jo</i>	194
<i>Saxicola oenanthe</i>	101	<i>Talpa europaea</i>	27	„ <i>polychloros</i>	194
<i>Scalaria communis</i>	227	<i>Tapirus indicus</i>	77	„ <i>urticae</i>	194
„ <i>pretiosa</i>	227	<i>Tegenaria domestica</i>	216	<i>Vermes</i>	222
<i>Scarus scretensis</i>	162	<i>Tellina radiata</i>	229	<i>Vespa crabro</i>	188
<i>Sciurus vulgaris</i>	50	<i>Termes</i>	216	„ <i>vulgaris</i>	188
<i>Scolofax major</i>	128	<i>Testudo elephantopus</i>	143	<i>Vipera ammodytes</i>	152
„ <i>rusticola</i>	129	<i>Tetrao tetrix</i>	120	<i>Viverra zibetha</i>	42
<i>Scomber scomber</i>	163	„ <i>uogallus</i>	120	<i>Vorticella</i>	227
<i>Selachii</i>	170	<i>Thalassidroma pelag.</i>	136		
<i>Sepia officinalis</i>	225	<i>Thynnus vulgaris</i>	163	<i>Xiphias gladius</i>	164
<i>Serpentarius sekretar.</i>	90	<i>Tinca vulgaris</i>	164	<i>Zygaena filipendulae</i>	196
<i>Silpha</i>	178	„ <i>granella</i>	200		

KRÓLESTWO ROŚLINNE.

<i>Abies pectinata</i>	256	<i>Adansonia digitata</i>	264	<i>Aethusa Cynapium</i>	295.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	252	<i>Aegopodium poda-</i>		<i>Agaricus campestris</i>	311
<i>Aconitium lycocto-</i>		<i>graria</i>	300	„ <i>deliciosus</i>	311
<i>num</i>	296	<i>Aesculus Hippoca-</i>		„ <i>muscarius</i>	311
„ <i>Napellus</i>	296	<i>stanum</i>	255	<i>Agrostemma Gitago</i>	304

	str.		str.		str.
Algae	314	Cedrus libani	259	Fagus silvatica	250
Allium cepa	285	Centaurea cyanus	303	Ficus carica	278
„ sativum	285	Cetraria islandica	311	„ religiosa	277
Alnus glutinosa	252	Chelidonium majus	303	Fragaria vesca	268
„ incana	253	Chrysanthemum leucanthemum	300	Fraxinus excelsior	252
Alopecurus pratensis	308	Cichorium Intybus	292	Fucus	314
Alquae	305	Cicuta virosa	295	Galactodendron utile	276
Anemone nemerosa	299	Cladonia rangiferina	310	Gallium silvaticum	298
Anethum graveolens	282	Claviceps purpurea	313	Gentiana verna	299
Anthoxanthum odoratum	308	Cochlearia armoracea	283	Glycyrrhiza glabra	292
Anthriscus silvestris	300	Cocos nucifera	274	Gnaphallium dioicum	298
Apium	282	Coffea arabica	278	Gossypium herbac.	280
Arenga saccharifera	275	Colchicum autumnale	297	Helleborus niger	295
Arrenatherum avenaceum	308	Compositae	325	„ purpurasc.	295
Artocarpus incisa	276	Conium maculatum	295	„ viridis	295
Arum maculatum	299	Convalaria majalis	298	Hepatica triloba	298
Arundo donax	309	Cornus mas	270	Heracleum barbatum	300
Asparagus	286	„ sanguinea	270	Hippuris vulgaris	304
Asplenium Ruta muraria	309	Corylus Avellana	248	Hordeum	307
Asperula odorata	298	Crataegus Oxyacant.	269	Humulus lupulus	291
Atropa belladonna	296	Crocus sativus	293	Hyoscyamus niger	296
Avena sativa	307	„ vernus	293	Hypnum	310
Bambusa arundinacea	309	Cruciferae	323	Juglans regio	248
Bellis perennis	300	Cupressus sempervirens	259	Juniperus communis	258
Beta vulgaris	284	Conamomum zeylanicum	279	Labiatae	324
Betula alba	251	Cyperaceae	322	Lactuca	286
Berberis vulgaris	270	Dactylis glomerata	308	Lamium album	301
Boletus edulis	312	Daphne mesereum	297	Lappa major	302
Brassica napus	283	Datura stramonium	296	„ minor	302
„ oleracea	282	Daucus carota	281	Earix europea	258
Briza media	308	Delphinium consolida	303	Leguminosae	324
Caltha palustris	300	Desmodium gyrans	317	Lemna	305
Calluna vulgaris	299	Diatomaceae	315	Licopodium	238
Campanula	299	Digitalis purpurea	297	Lihaceae	322
Cannabis sativa	289	Dionea muscipula	319	Linum sativum	288
Cantharellus cibarius	312	Dracena Draco	263	Lolium perenne	308
Capsella bursa pastoris	301	Drosera	318	„ temulentum	297
Cardamine pratensis	301	„ longifolia	318	Lotus corniculatus	294
Carex	304	„ rotundifolia	318	Lycoperdon	311
Carpinus Betulus	250	Echium vulgare	302	Majanthemum bifol.	298
Carthamus tinctorius	293	Equisetum arvense	309	Malva rotundifolia	302
Carum carvi	300	Eriophorum	304	Marchantia polymorp.	310
Caryophyllum aromaticum	277	Eryonimus europeus	270	Matricaria chamomil.	303
Cartame vulgaris	240	Ervum lens	285	Medicago sativa	293
Castanea vulgaris	256	Fagopyrum esculent.	294	Mimosa pudica	317
				Mnium	310
				Morchella esculenta	311

Musa	276	Potentilla Tormentil.	298	Stellaria media	301
Musaceae	322	Prunus Armeniana	247	Syringa vulgaris	270
Myosotis silvatica	298	„ avium	246	Tanacetum vulgare	302
Nephrodium Filix		„ cerasus	248	Taraxacum officinale	300
mas	310	„ domestica	247	Taxus baccata	259
Nicotiana tabacum	292	„ instituta	247	Thea chinensis	278
Nuphar luteum	304	„ Mahaleb	247	Theobroma cacao	279
Nymphaea alba	304	„ padus	247	Thuja	259
		„ spinosa	269	Thymus serpyllum	301
Olea europea	291	Pteris quilina	310	Tilia	251
Ononis arvensis	302	Pulmonaria officinal.	298	„ parvifolia	252
„ spinosa	302	Pyrus communis	245	Tilletia caries	313
Orchidae	322	„ malus	245	Trifolium	300
Orchis	301	Quercus	248	„ incarnatum	293
„ maculata	301	„ pedunculata	249	„ pratense	293
„ morio	301	„ Robur	249	„ repens	293
Origanum vulgare	301	Ranunculaceae	322	Triticum repens	308
Oriza sativa	307	Ranunculus	300	„ Speta	306
Oxalis acetosella	299	„ scellaratus	294	„ vulgare	306
		Rapa	283	Ulmus	252
Panicum miliaceum	307	Raphanus sativus	284	„ campestris	252
PapaVer rhocas	291	Rhamnus frangula	270	„ effusa	252
„ somniferum	291	Ribes grossularia	268	„ suberosa	252
PapaVeraceae	323	„ rubrum	267	Umbelliferae	323
Papillionaceae	324	Rosa canina	271	Urtica dioica	303
Paris quadrifolia	297	Rubus Ineus	268	„ urens	303
Passiflora coerulea	315	Rumex acetosa	301	Ustilago carbo	303
Persica vulgaris	247	Saccharomyces cerev.	313	Vaccinium Myrtillus	269
Phallus impudicus	311	Sagus rumphii	275	Vanilla planifolia	279
Phleum pratense	308	Salix alba	255	Verbascum nigrum	302
Phoenix dactylifera	275	„ babylonica	255	Veratrum album	297
Phoseolus vulgaris	285	„ caprea	254	„ nigrum	297
Phragmites commun.	308	Salvia	306	Viburnum opulus	271
Picea excelsa	257	Sambucus nigra	269	Vicia faba	285
Pimpinella	282	Scabiosa	299	„ sativa	294
Pinus silvestris	257	Secale cereale	305	Victoria regia	316
„ strobis	259	„ cornutum	313	Viola odorata	299
Piper nigrum	277	Sinapis nigra	283	„ tricolor	304
Pisum sativum	285	Solaneae	324	Vitis vinifera	266
Plantago	300	Solanum Gulcamara	296		
Platanus	256	„ Lycopersic.	281	Wellingtonia gigan-	
Polypodium vulgare	309	„ nigrum	296	tea	263
Polytrichum comm.	310	„ tuberosum	280	Welwitschia mirabil.	316
Populus alba	254	Sorgho saccharatum	291		
„ nigra	254	Sphagnum	310	Zea Mays	307
„ pyramidalis	254				
„ tremula	253				

SPIS ROZDZIAŁÓW.

	<i>Str.</i>
Trzy królestwa	1
KRÓLESTWO ZWIERZĄT.	5
Typ I. Zwierzęta kręgowie	7
<i>Klasa I. Ssące</i>	7
Dwurękie (Człowiek)	7
Małpy czyli czwororękie	15
Małpozwierze	24
Nietoperze	26
Owadożerne.	27
Drapieżne	29
Workowate	48
Gryzonie	50
Bezzębne czyli szczerbate	57
Zwierzęta kopytowe	59
„ jednokopytowe	59
„ dwukopytowe czyli	
przeżuwające	62
„ wielokopytowe	74
Płetwonogie.	80
Wieloryby czyli Walenie	83
<i>Klasa II. Ptaki</i>	87
Drapieżne	89
Łażące czyli dwuparzysto-pal-	
cove	96
Śpiewające	99
Gołębie	118
Grzebiące	120
Biegające	124
Podkasałe czyli brodzące	127
Pływające czyli płetwonogie . .	133
<i>Klasa III. Płazy</i>	143
Żółwie	143
Krokodyle	145
Jaszczurki	146
Węże	149
Terarjum	153
<i>Klasa IV. Ziemnowodne czyli</i>	
<i>Skrzeki</i>	155
Żaby	155
Ogoniaste	158
<i>Klasa V. Ryby</i>	160
Ryby kostne	161
Cierniopłetwe	161
Miękkopłetwe	164
Ryby chrząstkowate	170
Kostoluskie	170

	<i>Str.</i>
Poprzecznouste.	170
Kregouste	172
Akwarijum	172
Typ II Stawonogie	175
<i>Klasa I. Owady.</i>	175
Tęgopokrywe	176
Wskazówki do łowienia i prze-	
chowywania chrząszczy	184
Blonkoskrzydłe.	185
Łuskoskrzydłe czyli motyle	192
Zbieranie, hodowla i preparo-	
wanie motyliów	201
Dwuskrzydłe	202
Pópkokrywe.	205
Żyłkoskrzydłe	208
Prostoskrzydłe	211
<i>Klasa II. Krocionogi</i>	214
<i>Klasa III. Pająki</i>	215
<i>Klasa IV. Skorupiaki.</i>	219
Typ III. Robaki.	222
Typ IV. Mięczaki	225
Typ V. Szkarłupnie	230
Typ VI. Jamochłonne.	232
Typ VII. Pierwotniaki.	236
KRÓLESTWO ROŚLINNE.	238
I. Drzewa owocowe	243
II. „ leśne	248
III. „ olbrzymie	259
IV. Krzewy leśne i ogrodowe	266
V. Drzewa i krzewy stref	
gorących	272
VI. Rośliny warzywne	280
VII. „ przemysłowe	288
VIII. „ pastewne	293
IX. „ trujące	294
X. Niektóre zioła krajowe	297
XI. Trawy	305
XII. Rośliny bezkwiatowe	309
„ niezwykłe	315
Kwiaty i owady.	319
Niektóre rodziny roślin	321
Zbieranie roślin i układanie	
zielnika	325
KRÓLESTWO MINERAŁÓW	328
O zbieraniu minerałów.	349

